



# ﴿ الأهداف >

# في نهاية دراسة الطالب لباب العناصر الانتقالية ينبغي أن يكون قادرًا على أن :

- يتعرف عناصر السلسلة الانتقالية الأولى.
- يتعرف الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى.
  - يكتب التركيب الإلكتروني لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى.
- يفسر سهولة أكسدة أيون الحديد (II) إلى أيون الحديد (III) وصعوبة ذلك في أيون المنجنيز.
  - يحدد حالات التأكسد للعناصر.
    - يعرف العنصر الانتقالي.
  - يتعرف خواص العناصر الانتقالية.
- يفسر التدرج في بعض خواص عناصر السلسلة الانتقالية الأولى بزيادة أعدادها الذرية.
- يحدد المواد الديامغناطيسية والبارامغناطيسية من التركيب الإلكتروني
   للعنصر الانتقالي،
  - يوضح العلاقة بين ألوان أيونات العناصر الانتقالية وتركيبها الإلكتروني.
    - يشرح سبب استخدام عناصر السلسلة الانتقالية الأولى كعوامل حفز.
      - يتعرف خامات الحديد.
    - يتعرف عملية استخلاص الحديد من خاماته داخل الأفران المختلفة.
      - يتعرف السبانك وأنواعها.
      - يعدد استخدامات السبائك.
      - يتعرف خواص الحديد وأكاسيده.

#### Transition Elements

#### المتناهير الإنالقالية


درسنا في الصف الثاني عناصر الفئة (8) وعناصر الفئية (P) اللتين تقعا على جانبي الجدول الدوري الطويل - وسنتناول في هذا الجال دراسة العناصر الانتقالية التي تحتل المنطقة الوسطى في هذا الجدول بين هاتين الفئتين. وتشتمل هذه النطقة على أكثر من (6) عنصرًا أي أكثر من نصف عدد العناصر العروفة.

وتنقسم العناصر الانتقالية إلى قسمين رئيسيين، هما :

- Main transition elements الرئيسية
- العناصر الانتقالية الداخلية Inner transition elements
  - وسوف يكتفى بدراسة العناصر الانتقالية الرئيسية.

#### العناصر الانطالية الرئيسية أو عناصر الفنة (c)

يتتابع في العناصر الانتقالية الرئيسية امتالاء المستوى الفرعي (b) الذي يتسع لعشرة الكترونات، لذا فهي تتكون من عشرة أعمدة رأسية - يبدأ العمود الأول منها بعناصر يكون تركيبها الإلكتروني " (n - 1) d ns" شم يتتابع امتالاء المستوى الفرعي (b) حتى نصل إلى العمود الأخير ويكون لعناصره التركيب الإلكتروني " ns" (n - 1) d ns"). وهذه الأعمدة من يسار إلى يمين الإخير ويكون لعناصره التركيب الإلكتروني " ns" (b) VIB (c) VIB (d) VIB (d) (l) وهذه الأعمدة من يسار إلى يمين الجدول الدوري هي عبارة عن المجموعات الله (l) (lib (d) VIB (d) (lib (d)









# BOSISM EMSM LAWN

#### First transition series: السلسلة الانتقالية الأولى -١

بزيادة العدد الـذرى يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعس (3d) وتقع في الـدورة الرابعة بعد الكالسـيوم وتشمل عشرة عناصر تبدأ بعنصر السكانديوم Sc ( 45° , 3d′ ) وتنتهي بعنصر الخارصين Zn ( 48° , 3d′ ) وتنتهي بعنصر الخارصين Zn ( 48° , 3d′ )

#### Y- السلسلة الإنتقالية الثانية: Second transition series

بزيادة العدد الذرى يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي (4d) وتقع في الدورة الخامسة وتشمل عشرة عناصر تبدأ بعنصر اليتريوم Y و (5s² , 4d¹) وتنتهى بعنصر الكادميوم Cd , 2d¹) عناصر تبدأ بعنصر الكادميوم كا

#### Third transition series : السلسلة الإنقالية الثالثة الانقالية الثالثة الانتقالية الثالثة التالثة التا

بزيادة العدد الدرى يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي (5d) وتقع في الدورة السادسية وتشمل عشرة عناصر تبدأ بعنصر اللانثانيوم الله (أ6s² , 5d¹) وتنتهى بعنصر الزنبق Hg إلى (6s² , 5d¹)

#### Fourth transition series إسلسلة الانتقالية الرابعة:

بزيادة العدد الذرى يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي (6d) وتقع في الدورة السابعة.

#### السلسلة الانتقالية الأولى: First transition series

تشتمل هذه السلسلة على عشرة عناصر هي الأسكانديوم (Sc) والتيتانيوم (Ti) والفانديوم (V) والكروم (Cr) والمنجنيز (Mn) والحديد (Fc) والكوبلت (Co) والنيكل (Ni) والنحاس (Cu) والخارصين (Zn).

Zn	Cu	Ni	Co	Fe	Mn	Cr	V	Ti	Sc	المنصي
0.0078	0.0068	0.0089	0.003	6.3	0.11	0.014	0.02	0.66	0.0026	ا/ بالإون

ويبين الجدول السابق النسبة المنوية بالوزن لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى في القشرة الأرضية ورغم أن عناصر السلسلة الانتقالية الأولى مجتمعة يكون حوالي 7% من وزن القشرة الأرضية إلا أن أهميتها الاقتصادية كبيرة والتي نعرضها فيما يلي :

- ١- السكالليرم: يوجد بكميات صغيرة جدًا موزعة على نطاق واسع من القشرة الأرضية وعند إضافة نسبة ضنيلة منه إلى الألومنيوم تتكون سبيكة، تمتاز بخفتها وشدة صلابتها، لذا تستخدم في صناعة طائرات الميج القاتلة . كما إنه يضاف إلى مصابيح أبخرة الزئبق لإنتاج ضوء عالى الكفاءة، يشبه ضوء الشمس، لذا تستخدم هذه الصابيح في التصوير التلفزيوني أثناء الليل.
- النينانيوة: عنصر شديد الصلابة كالصلب Sice، ولكنه أقل منه كثافة. وتستخدم سبائكه مع الألومنيوم في صناعة الطائبرات والمركبات الفضائية لأنه يحافظ على متانته في درجات الحرارة الرتفعة في الوقت النذي تنخفض فيه متائلة الألومنيوم، كما يستخدم في عمليات زراعة الأستان والمفاصل الصناعية، لأن الجسم لا يلفظه ولا يسبب أي نوع من التسمم. ومن مركبات التيتانيوم الشائعة، ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO.) الذي يدخل في تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس، حيث ( عكل ١ - ٣) يسخم التعاديم تعمل دقائقه النانوية على منع وصول الأشعة فوق البنضجية للجلد.



في عمليات وراعة الأسال

- القائديوم: عند إضافة نسبة ضنيلة منه إلى الصلب، تتكون سبيكة تتميز بقساوة عالية وقدرة كبيرة على
   مقاومة التأكل لذا يستخدم في صناعة زنبركات السيارات. ومن مركباته خامس أكسيد الفائديوم , V<sub>2</sub>O الذي
   يستخدم كصبغ في صناعة السيراميك والزجاج، وكعامل حفاز في صناعة المغناطيسات فائقة التوصيل.
- الكروم: عنصر على درجة عالية من النشاط الكيميائي لكنه يقاوم فعل العوامل الجوية. ويرجع سبب ذلك إلى تكون طبقة من الأكسيد على سطحه ويكون حجم جزينات الأكسيد المتكون أكبر من حجم ذرات العنصر نفسه مما يعطى سطحًا غير مساميًا من طبقة الأكسيد تمنع استمرار تفاعل الكروم مع أكسجين الجو. ويستخدم الكروم في طلاء العادن ودباغة الجلود.

ومن مركبات الكروم الشائعة أكسيد الكروم (III) الذي يستخدم في عمل الأصباغ وثاني كرومات البوتاسيوم K,Cr,O, التي تستخدم كمادة مؤكسدة

- التجهيز: لا يستخدم المنجنيز وهو في حالته النقية لهشاشته الشديدة، لذا يستخدم دائمًا في صورة سبائك أو مركبات. وتستخدم سبائك الحديد مع المنجنيز في صناعة خطوط السكك الحديدية، لأنها أصلب من الصلب وتستخدم سبائك الأومنيوم مع المنجنيز في صناعة عبوات الشروبات الغازية Drinks أصلب من الصلب وتستخدم سبائك الألومنيوم مع المنجنيز في صناعة عبوات الشروبات الغازية Cans دايم في المنافق ومن مركبات المنجنيز الهامة ، ثاني أكسيد المنجنيز MnO وهو عامل مؤكسد قوى ويستخدم في صناعة العمود الجاف وبرمنجنات البوتاسيوم (شلال KMnO) كمادة مؤكسدة ومطهرة وكبريتات المنجنيز MnSO إلى المنجنيز MnSO كمبيد للفطريات.
- اخديد: يستخدم في الخرسانات المسلحة وأبراج الكهرباء والسكاكين ومواسير البنادق والمدافع والأدوات الجراحية، كما يستخدم كعامل حفاز في صناعة غاز النشادر بطريقة (هابر بوش) وفي تحويل الغاز الثانى (خليط من الهيدروجين وأول أكسيد الكربون) إلى وقود سائل بطريقة (فيشر ترويش).
- الكوبلت: يشبه الكوبلت الحديد في أن كلاهما قابل للتمغنط ويستخدما في صناعة المغناطيسات وكذلك
   في البطاريات الجافة في السيارات الحديثة .

وللكوبلت اثنا عشر نظيرًا مشعًا أهمها الكوبلت 60 الذي تمتاز أشعة جاما الصادرة منه بقدرة عالية على النفاذ لذا يستخدم في عمليات حفظ المواد الغذائية وفي التأكد من جودة المنتجات حيث يكشف عن مواقع الشقوق ولحام الوصلات، ويستخدم في الطب في الكشف عن الأورام الخبيثة وعلاجها.

- النيكل: يستخدم النيكل في صناعة بطاريات النيكل كادميوم القابلة لإعادة الشحن، تتميز سبائك النيكل مع الصلب بالصلابة ومقاومة الصدأ ومقاومة الأحماض، وتستخدم سبائك النيكل والكروم في ملفات التسخين والأضران الكهربيسة، لأنها تضاوم التأكل حتى وهي مسخنة لدرجة الاحمرار وتطلى معادن كثيرة بالنيكل ليحميها من الأكسدة والتأكل ويعطيها شكلًا أفضل. كما يستخدم النيكل المجزأ في عمليات هدرجة الزيوت.
- النحاس: يعتبر النحاس تاريخيًا أول فلز عرفه الإنسان وتعرف سبيكته مع القصدير باسم البرونز، والنحاس موصل جيد للكهرباء، لذا يستخدم في صناعة الكابلات الكهربية وسبانك العملات المعدنية . ومن مركبات النحاس الشهيرة كبريتات النحاس [CuSO] الذي يستخدم كمبيد حشري وكمبيد للفطريات في عمليات تنقية مياه الشرب. ويستخدم محلول فهلنج وهو من مركبات النحاس في الكشف عن سكر الجلوكوز، حيث يتحول من اللون الأزرق إلى اللون البرتقالي.
- ١ اخارصين: تتركز معظم استخدامات الخارصين في جلفنة باقى الفلزات، لحمايتها من الصدأ. ومن مركبات الخارسين
   الشهيرة، أكسيد الخارصين ZnO الـنى يدخـل في صناعة الدهانـات والطاط ومستحضـرات التجميـل ومركب
   كبريتيد الخارصين ZnS الذي يستخدم في صناعة الطلائات المضيئة وشاشات الأشعة السينية.





# GONSAN EMBAN LAWAN

التركيب الإلكتروني وحالات التأكسد :

يوضح الجدول الأتى التركيب الإلكتروني لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى وحالات التأكسد المختلفة لهاو حالات تأكسدها الشائعة.

يعض المركبات	حالات التأكسد والشالعة منها	التركيب الإلكترولي	الجبرعة	years
Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3	[Ar], 4s², 3d¹	IIIB	Se
TiO <sub>2</sub> , Ti <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , TiO	4,3,2	[Ar], 4s <sup>2</sup> , 3d <sup>2</sup>	IVB	ı.Ti
$V_2O_5$ , $VO_2$ , $V_2O_5$ , $VO$	3,4,3,2	[Ar], 4s <sup>2</sup> , 3d <sup>3</sup>	VB	<sub>m</sub> V
$CrO_3$ , $Cr_2O_3$ , $CrO$	6,3,2	[Ar], 4s1, 3d5	VIB	<sub>2</sub> Cr
MnO <sub>2</sub> , Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , MnO KMnO <sub>4</sub> , K <sub>2</sub> MnO <sub>4</sub>	,4,3,2 7,6	[Ar], 4s <sup>2</sup> , 3d <sup>5</sup>	VIIB	₃sMn
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , FeO	3).2	[Ar], 4s <sup>2</sup> , 3d <sup>6</sup>		Fe
[CoF <sub>6</sub> ] <sup>2-</sup> , CoCl <sub>3</sub> , CoCl <sub>2</sub>	4,3,(2)	[Ar], 4s <sup>2</sup> , 3d <sup>7</sup>	VIII	<sub>27</sub> Co
NiO <sub>2</sub> , Ni <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , NiO	4,3,2	[Ar], 4s <sup>2</sup> , 3d <sup>8</sup>		, Ni
CuO , Cu <sub>2</sub> O	2,1	[Ar], 4s1, 3d10	IB	<sub>20</sub> Cu
ZnO	(2)	[Ar], 4s <sup>2</sup> , 3d <sup>10</sup>	IIB	<sub>Je</sub> Za

(الجدول للإطلاع فقط)

#### ويلاحظ من الجدول ما يلي :

- ١- تقع عناصر الجموعة الانتقالية الأولى في الدورة الرابعة بعد الكالسيوم وتركيبه الإلكتروني Ca: [Ar], 4s² ويبدأ بعد ذلك امتلاء الأوربيتالات الخمسة للمستوى الفرعي (3d) بإلكترون مفرد وفي كل أوربيتال بالتتابع حتى نصل إلى المتجنيز (3d²) ثم يتوالي بعد ذلك ازدواج إلكترونين في كل أوربيتال حتى نصل إلى الخارصين (3d²) (قاعدة هوند).
- ٧- يشذعن التركيب الإلكتروني المتوقع عنصران هما الكروم Cr<sub>20</sub> (4s<sup>1</sup>,3d<sup>5</sup>) وكذلك عنصر النحاس Cu<sub>20</sub> (0s<sup>1</sup>,3d<sup>10</sup>) وكذلك عنصر النحاس نجد أن المستوى حيث نجد في ذرة الكروم أن المستوين الفرعيين 3d , 4s نصف ممتلئين ، في ذرة النحاس نجد أن المستوى الفرعي 4s نصف ممتلئ والمستوى الفرعي 3d تام الامتلاء ويفسر ذلك بأن الذرة تكون أقل طاقة أي أكثر الستقرارًا عندما يكون المستوى الفرعي نصف ممتلئ (d<sup>5</sup>) أو تام الامتلاء (d<sup>10</sup>) ويلاحظ أن الامتلاء الكامل أو النصفي للمستوى الفرعي، ليس هو العامل الوحيد لثبات التركيب الإلكتروني للعنصر في المركب.

تدريب

الذا يسهل تأكسد أيون الحديد (II) إلى أيون الحديد (III) .

بينما يصعب تأكسد أبون المنجنيز (11) إلى أبون المنجنيز (111) ؟

الحسل

التركيب الإلكتروني لذرة الحديد هو 3d° و4s°, 4s°, 3d° إ.

أيون الحديد (III) أكثر استقرارًا لأن المستوى الفرعي 3d نصف ممتلئ (d5) لذا يسير التفاعل في اتجاه تكوين التركيب الأكثر استقرارًا.

Mn<sup>2+</sup>: [Ar], 3d<sup>5</sup> → Mn<sup>3+</sup>: [Ar], 3d<sup>4</sup>

يلاحفظ أن المستوى القرعي 3d في أينون "Mn" نصف ممتلئ (ds) لمذا فهو أكثر استقرارًا من أيون "Mn وتصعب عملية الأكسدة.

- 48- تعطى جميع عناصر السلسلة الانتقالية الأولى حالة التأكسد (2+) وذلك بفقد إلكتروني المستوى الفرعي 48
   (ما عدا السكانديوم) وفي حالات التأكسد الأعلى تفقد إلكترونات من المستوى الفرعي 3d
- 4- تزداد حالات التأكسد من عنصر السكانديوم حتى تصل إلى أقصى قيمة لها في عنصر المنجنيز (7+)
   الذي يقع في المجموعة السابعة (B). ثم تبدأ في التناقص بعد ذلك حتى نصل إلى حالة التأكسد (2+)
   في عنصر الخارسين ويقع في المجموعة الثانية (B) ومن ذلك يتضح أن أعلى عدد تأكسد لأي عنصر لا يتعدى رقم المجموعة التي ينتمي إليها ما عدا عناصر المجموعة B وهي النحاس والفضة والذهب.
- ٥- تتميز العناصر الانتقالية بتعدد حالات تأكسدها بينما لا نلاحظ هذه الظاهرة في الفلزات المثلة التي غالبًا ما يكون لها حالة تأكسد واحدة ويفسر ذلك أن الإلكترونات المفقودة من الذرة عند تأكسد العناصر الانتقالية تخرج من المستوى الفرعي 48 ثم المستوى الفرعي القريب منه في الطاقة 3d بالتتابع لذا نجد طاقات التأين المتالية لذرة الفلز الانتقالي تزداد بتدرج واضح كما يتبين من جهود تأين الفانديوم مقدرة بالكيلوجول/ مول في حالات التأكسد المتتالية.

V (4s <sup>2</sup> , 3d <sup>3</sup> )	648	V+	1364	V2+	2858	V <sup>3+</sup>	4643	V**	6523	V5+
(4s <sup>2</sup> , 3d <sup>3</sup> )	kl/mol	(4s1, 3d3)	kJ/mol	(3d3)	kJ/mol	(3d <sup>2</sup> )	LI-mol	(3d1)	kJ/mol	(3d°)



# GOTON EMON LAWN

أما في الفلزات المثلة مثل الصوديوم والماغنسيوم والألومنيوم فنجد أن الزيادة في جهد التأين الثاني في حالة الصوديوم والثانث في حالة الألومنيوم كبيرة جدًا وذلك لأنه يتسبب في كسر مستوى طاقة مكتمل لذا فلا يمكن الحصول على "Na" أو "Mg أو Al بالتفاعل الكيميائي العادي.

# تطيق:

$$Al^0 \xrightarrow{578 \text{ kJ/mol}} Al^{1+} \xrightarrow{1811 \text{ kJ/mol}} Al^{2+} \xrightarrow{2745 \text{ kJ/mol}} Al^{3+} \xrightarrow{11540 \text{ kJ/mol}} Al^{4+}$$
 $(2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^1) (2s^2, 2p^6, 3s^2) (2s^2, 2p^6, 3s^1) (2s^2, 2p^6) (2s^2, 2p^5)$ 

 آ بعد استعراضنا لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى وتركيبها الإلكتروني وحالات تأكسدها يمكننا الأن أن نصل إلى تعريف للعناصر الانتقالية بوجه عام كما يلي :

### العنصر الانتقالي:

هو العنصر الذي تكون فيه الأوربيتالات d أو f مشغولة ولكنها غير ممتلئة سواء في الحالة النرية أو في أي حالة من حالات تأكسده.

### تدریب ۱

هل تعتبر فلزات العملة Coinage metals وهي النحاس والفضة والذهب عناصر انتقالية علمًا بأن التركيب الإلكتروني لأوربيتالاتها الخارجية هو :

$${}_{29}\text{Cu }(4s^{+},3d^{10}) - {}_{47}\text{Ag }(5s^{+},4d^{10}) - {}_{79}\text{Au }(6s^{+},5d^{10})$$

الحسق:

يتضح أن المستوى الفرعي (d) للفلزات الثلاثة ممتلئ بالإلكترونات (dº) في الحالة الذرية ولكن عندما تكون في حالة تأكسد (+2) أو (dº) إذن فهي عناصر انتقالية.

# تدریب ۲

هل تعتبر فلزات الحارصين والكادميوم والزئبق عناصر انتقالية علمًا بأن التركيب الإلكتروني لأوربيتالاتها الحارجية هو: «Zn (4s², 3d¹¹¹) - <sub>so</sub>Cd (5s², 4d¹º) - <sub>so</sub>Hg (6s², 5d¹¹¹)

# الحسل:

يتضح أن المستوى الفرعي (d) للفلزات الثلاثة ممتلئ بالإلكترونات (d) سواء في الحالة الذرية أو في حالة التأكسيد (2+) ليذا لا تعتبر هذه الفلزات انتقالية لأنها تكون ممتلئة المستوى الفرعسي (d) في الحالة الذرية وفي الحالة المتأينة.

### الحواص العامة لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى:

يوضح الجدول التالى بعض البيانات الخاصة بعناصر هذه الجموعة والتي يمكن الخروج منها بالخصائص العامة التي تتميز بها هذه العناصر فيما يلي : [الجدول الأطلاع فتحد]

درخة الغليان ۲(:	درجة الانصهار اث	auS) grom	ا بصف قطر الدوة أ	ALSO (IL., ii	العنصر
3900	1397	3.10	1.44	45.0	اسكانديوم Sc
3130	1680	4.42	1.32	47.9	تيانيوم Ti
3530	1710	6.07	1.22	51.0	فالديوم ٧
2480	1890	7.19	1.17	52.0	کـــروم Cr
2087	1247	7.21	1.17	54.9	منجنيسز Mn
2800	1528	7.87	1.16	55.9	Fe عديد
3520	1490	8.70	1.16	58.9	کسربلت Co
2800	1492	8.90	1.15	58.7	نيسكل Ni
2582	1083	8.92	1.17	63.5	لحاس Cu

- الكملة اللوية: تزداد الكتلة النرية بالتدريج بزيادة العدد النرى ويشذ عن ذلك النيكل ويرجع ذلك لوجود
   خمسة نظائر مستقرة للنيكل المتوسط الحسابي لها 58.70
- ٢- نصف قطر اللّرة: يلاحظ أن أنصاف الأقطار الذرية لا تتغير كثيرًا عند انتقالنا عبر السلسلة الانتقالية
   الأولى كما يلاحظ الثبات النسبي لنصف القطر من الكروم إلى النحاس، ويرجع ذلك إلى عاملين
   متعاكسين:
- ( i ) العامل الأول ويعمل على نقص نصف قطر النرة بزيادة العدد النرى حيث تزداد شحنة النواة الفعالة
  لهنده العناصر وكذلك يزداد عدد الكترونات النرة من الاسكانديوم إلى النحاس فيـزداد جذب النواة
  للالكترونات ويعمل على نقص في نصف قطر الذرة.
- (ب) العامل الثانى ويعمل على زيادة نصف قطر النرة وهو تزايد عدد الكترونات المستوى الفرعى 3d فتزداد قوى التنافر بينها. ونتيجة لتأثير هذين العاملين المتعاكسين نلاحظ الثبات النسبي في أنصاف أقطار هذه العناصر، وهذا يفسر سبب استخدام هذه العناصر في إنتاج السبائك.
  - ٣- الخاصية الفلزية : تظهر الخاصية الفلزية بوضوح بين عناصر هذه السلسلة ويتضح ذلك فيما يلي :
    - ( أ ) جميعها فلزات صلبة تمتاز باللمعان والبريق وجودة التوصيل للحرارة والكهرباء.
- (ب) لها درجات انصهار وغليان مرتفعة ويعزى ذلك إلى الترابط القوى بين النرات والذي يتضمن اشتراك
   إلكترونات 3d ، 4s في هذا الترابط.





# GOTON ENGN LAW

- (ج.) معظمها فلزات ذات كثافة عالية وتزداد الكثافة عبر السلسلة بزيادة العدد النرى لأن الحجم النرى
  لهنده العناصر ثابت تقريبًا وعلى ذلك فالعامل الذي يؤثر في الزيادة التدريجية في الكثافة هو
  زيادة الكتلة النربة.
- أخواص المناطبية: كان لدراسة الخواص المغناطيسية الفضل الكبيرةي فهمنا لكيمياء العناصر الانتقالية.
   وهناك أنواع مختلفة من الخواص المغناطيسية نستعرض منها نوعان :
- (أ) الخاصية البارامخاطيسية: وتظهر هذه الخاصية في الأيونات أو النزات أو الجزيئات التي يكون فيها أوربيتالات تشغلها الكترونيات مفردة (أ) وكما نعرف ينشأ عن غزل الإلكترون المفرد حول محوره مجال مغناطيسي يتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي.

وتعرف المادة البار امعناطيسية: بأنها المادة التي تنجذب نحو المجال المغناطيسي نتيجة لوجود الكترونات مضردة - وتتناسب قوى الجذب المغناطيسي هي المواد البار امغناطيسية مع عدد الإلكترونات المفردة ومعظم مركبات العناصر الانتقالية مواد بارامغناطيسية.

(ب) الخاصية الديامغناطيسية Diamagnetism : وتنشأ هذه الخاصية في المواد التي تكون الإلكترونات في جميع أوربيتا لاتها(d) في حالة ازدواج (أ) فيكون عزمها المغناطيسي يساوي صفرًا لأن كل إلكترونين مزدوجين يعملان في انجاهين متضادين.

المَّـادة الديامغناطيسيـة: هي المّـادة التي تتناهر مع المجال الغناطيسـي نتيجـة لوجود جميـع الكتروناتها في حالة ازدواج.

تدريب

أى المواد الآفية ديامغناطيسي وأيها بارامغناطيسي : ذرة الخارصين ("Zn (d") ، أيون النحاس (H) (d") ،

کلورید الحدید (II) (do)

_		

الخاصية المغناطيسية	عدد الإلكترونات المفردة	التوزيع الإلكتروني لأوربيتالات d	الذرة أو الأيون
ديامغناطيسي	zero	1 1 1 1 1 1 d10	Zn
بارامغناطيسى	1	1 1 1 1 1 1 1 o	Cu <sup>2+</sup>
بارامغناطيسي	4	11 ↑ ↑ ↑ ↑ do	Fe <sup>2+</sup>

ويمكن عن طريق قياس وتقدير العزوم المغناطيسية للمادة تحديد عدد الإلكترونات المضردة ومن ثم تحديد التركيب الإلكتروني لأيون الفلز.



تدريب

رتب كاتيونات المركبات الآتية تصاعليًا، حسب عزمها المعناطيسي : FeCl, , Cu,Cl, , Cr,O, , TiO,


النشاط الخفيزى Catalytic activity: تعتبر الفلزات الانتقالية عواصل حضز مثالية، فالنيكل المجزأ
 يستخدم في عمليات هدرجة الزيوت والحديد المجزأ في تحضير غاز النشادر بطريقة هابر - بوش.

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \xrightarrow{500^{\circ}C/600 \text{ atm}} 2NH_{3(g)}$$

كما يستخدم خامس أكسيد الفائديوم . ٧٠ كعامل حفاز في تحضير حمض الكبريتيك بطريقة التلامس.

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \xrightarrow{V_2O_5} 2SO_{3(s)}$$

$$SO_{3(s)} + H_2O_{(\ell)} \longrightarrow H_2SO_{4(sq)}$$



اقاه سير النشاعل  $H_1O_1$  كعامل حفز في تشاعل انحلال  $MnO_2$  أثر

وترجع أهمية فلرزات السلسلة الانتقالية الأولى كعوامل حضر إلى استخدام الكترونات 48,3d فى تكويس روابط ببين الجزيئات المتفاعلة وذرات سطح الفلز مما يؤدى إلى تركيز هذه المتفاعلات على سطح الحافز وإلى أضعاف الرابطة فى الجزيئات المتفاعلة مما يقلل طاقة التنشيط ويساعد فى سرعة التفاعل.

الأبونيات الملونة Coloured ions : معظم مركبيات العناصير الانتقاليية ومحالياها المائية ملونة ويوضح
 الجدول التالي ألوان بعض الأبونات المتهدرية لفلزات السلسلة الانتقالية الأولى :

سول الزلتاني القطا)	عدد الكترونات (3d) في الأبورا	اللون	عدد إلكتر ونات (3d) في الأيون
أصفر	(3d <sup>5</sup> ) Fe <sup>3+</sup>	عديم اللون	(3d°) Se <sup>3+</sup>
أخضر	(3d°) Fe2+	ينفسجي محمر	(3d1) Ti <sup>3+</sup>
أحمر	(3d <sup>7</sup> ) Co <sup>2+</sup>	أزرق	(3d <sup>2</sup> ) V <sub>(aq)</sub> <sup>3</sup>
أخضر	(3d8) Ni2+ (aq)	اخضر	$(3d^3) Cr_{(m)}^{3+}$
أزرق	(3d9) Cu <sup>2+</sup>	بتقسجى	(3d4) Mn3+ (aq)
عديم اللون	$(3d^{10}) Zn^{2*}_{(aq)} Cu^*_{(aq)}$	أحمر (وردى)	(3d3) Mn2+ (aq)



## تفسير اللون في المواد:

من المعروف أن لـون المادة ينتج من امتصاص بعض هو تونات منطقة الضوء المرئى والذى تـراه العين هو محصلة مخلوط الألوان المتبقية (المنعكسة) فإذا امتصت المادة جميع ألوان الضوء المرئى (الأبيض) تظهر للعين سـوداء وإذا لم تمتص أيًا منها ظهرت بيضاء - وعندما تمتص المادة لونًا معينًا يظهر لونها باللون المتمم للمعين الجدول اللون الذى تمتصه المادة واللون المتمم لله (المنعكس) وهو الذى تراه به العين.

همثلا مركبات الكروم (III) تمتص اللون الأحمر لذا يظهر لونها باللون الأخضر.

ويوضح كل من الجدول والشكل التاليين أزواج الألوان المتتامة ،

YG Y	YO
G	0
BG	RO
В	R
W V	RV

اللون الشعم الذي تراه العن	اللوث الذي تحصه المادة
أصفر Y	بنفسجي ٧
بر تقالی O	ازرق B
أحمر R	أخضر G
ېنفسجى V	أصفر Y
أخضر G	R أحمر

# العلاقة بين ألوان أيونات العناصر الانتقالية وتركيبها الإلكتروني:

بمراجعة الجدول الذي يبين ألوان أيونات العناصر الانتقالية المتهدرتة نجد أن أيونات المناصر عبراجعة الجدول الذي يبين ألوان أيونات العناصر الانتقالية و  $(d^{10}) \, Cu^{1+} \, (d^{0}) \, Sc^{3+}$   $(d^{10}) \, Cu^{1+} \, (d^{0}) \, Sc^{3+}$  في تتميز إما باحتوانها على أوربيتالات d فارغة  $(d^{0}) \, d$  أو ممتلئة تمامًا  $(d^{10}) \, d$  من ذلك نستنتج أن اللون في أيونات العناصر الانتقالية يعزى إلى الامتلاء الجزئي  $(d^{10}) \, d$   $(d^{10}) \, d$  المتوى الضرعي  $(d^{10}) \, d$  أي لوجود إلكترونات منفردة في أوربيتالات  $(d^{10}) \, d$ 

Iron Italia

56Fe [Ar], 4s<sup>2</sup>, 3d<sup>6</sup>

يعتبر الحديد عصب الصناعات النقيلة. ويأتى ترتيب الحديد الرابع بين العناصر العروفة فى القشرة الأرضية بعد عناصر الأكسجين والسيليكون والألومنيوم حيث يكون %6.3 من وزن القشرة الأرضية وتزداد كميته تدريجيًا كلما اقتربنا من باطن الأرض. ولا يوجد الحديد بشكل حر إلا فى النيازك (% 90). ويوجد الحديد فى القشرة الأرضية على هيئة خامات طبيعية تحتوى على مختلف أكاسيد الحديد مختلطة بشوائب وتتحدد صلاحية خام الحديد للاستخلاص بنسبة الحديد فيه ويتركيب الشوائب المساحبة له ويوجود العناصر الضارة المختلطة معه مثل الكبريت والفوسفور والزرنيخ وغيرها. ويوضح الجدول الأتى أهم خامات الحديد التى تستخدم فى تصنيعه.

أماكن وجوده في مصر	تسنة الحديد في الخام	الخواص	الصبغة الكيمانية	الاسم الكينيالي	制制
الجزء الغربي لملينة أسوان – الواحات البحرية	50 - 60 %	- لونه أحمر داكن - سهل الاختزال	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	أكسيد الحديد (III)	الهيماتيت
الواحات البحرية	20 - 60 %	- أصفر اللون - سهل الاختزال	2Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . 3H <sub>2</sub> O	أكسيد الحديد (III) المتهدرت	الليمونيت
الصحراء الشرقية	45 - 70 %	- اسود اللون - له خواص مغناطيسية	Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	أكسيد الحديد المغداطيسي	المجتنيت
	30 - 42 %	- لونه رمادي مصفر - سهل الاختزال	FeCO <sub>3</sub>	كربونات الحديد (١١)	السيدريت

## استخلاص الحديد من حاماته:

أولًا ، تجهيز خامات الحديد ، تتم عمليات التجهيز عادةً لتحقيق ما يلي ،

# 1 - تحسين الخواص الفيزيائية والمكانيكية للخامات وتنضمن :

أ - عمليات التكسير ، بهدف الحصول على الحجم المناسب لعمليات الاختزال.

ب - عمليات التلبيسد ، تنتج عن عمليات التكسير والطحن وعن عمليات تنظيف غازات الأفران العاليسة كميسات هائلة من الخام الناعم الذي لا يمكن استخدامه في الأفران العالية مباشرة. لذا تخضع هذه الأحجسام الدقيقة للمعالجسة بفرض ربط وتجميع الحبيبات في أحجسام أكبر تكون متماثلة ومتجانسة وتسمى هذه العملية بالتلبيد.

ج - عمليات التركيز ؛ وهي العمليات التي تجرى بهدف زيادة نسبة الحديد وذلك بفصل الشوائب والمواد غير المرغوب فيها عن الخامات والتي تكون متحدة معها كيميائيًا أو مختلطة بها وتتم عمليات التركيز باستخدام خاصية التوتر السطحي أو الفصل المغناطيسي أو الكهربي.





# GONSON EMEN LAWY

# ٢ - تحسين الحواص الكيميائية:

التحميص

وتتم هذه العملية بتسخين الخام بشدة في الهواء وذلك بغرض :

(أ) تجفيف الخام و التخلص من الرطوبة و رفع نسبة الحديد في الخام.

$$2 \text{FeCO}_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} 2 \text{FeO}_{(s)} + 2 \text{CO}_{2(g)}$$
 $48.5\%$ 
 $2 \text{FeO}_{(s)} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(g)} \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}_2 \text{O}_{3(g)}$ 
 $2 \text{FeO}_{(s)} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(g)} \xrightarrow{\Delta} 2 \text{Fe}_2 \text{O}_{3(g)}$ 
 $2 \text{Fe}_2 \text{O}_3.3 \text{H}_2 \text{O}_{(g)} \xrightarrow{\Delta} 2 \text{Fe}_2 \text{O}_{3(g)} + 3 \text{H}_2 \text{O}_{(g)}$ 
 $2 \text{Fe}_2 \text{O}_{3(g)} \xrightarrow{\Delta} 40\%$ 

(ب) أكسدة بعض الشوائب مثل الكبريت و الفوسفور ،

$$S_{(s)} + O_{2_{(g)}} \xrightarrow{\Delta} SO_{2_{(g)}}$$

$$4P + 5O_{2_{(g)}} \xrightarrow{\Delta} 2P_2O_{5_{(g)}}$$

# حُنانيا ، اختزال خامات الحديد ،

يتم فى هذه المرحلة اخترال أكاسيد الحديد إلى حديد، بإحدى طريقتين تبعاً للعامل المختزل المستخدم.

(أ) الاختزال بغاز أول أكسيد الكربون الناتج من فحم الكوك، وتتم هذه العملية في الضرن العالى

$$C_{(x)} + O_{2(x)} \xrightarrow{\Delta} CO_{2(x)}$$

$$CO_{2(x)} + C_{(x)} \xrightarrow{\Delta} 2CO_{(x)}$$

$$3CO_{(x)} + Fe_2O_{3(x)} \xrightarrow{\Delta} 2Fe_{(x)} + 3CO_{2(x)}$$

(ب) الاختزال بخليط غازى أول أكسيد الكربون والهيدروجين (الغاز المائي) الناتجين من الغاز الطبيعي

(نسبة غاز الميثان CH فيه %93) وتتم هذه العملية في فرن مدركس.

$$2CH_{4_{10}} + CO_{2_{10}} + H_{2}O_{...} \xrightarrow{\Delta} 3CO_{...} + 5H_{2_{10}}$$

$$2Fe_{2}O_{3_{10}} + 3CO_{...} + 3H_{3_{10}} \xrightarrow{\Delta} 4Fe_{...} + 3CO_{3_{10}} + 3H_{2}O_{...}$$

# خالثاء انتاج الحديد ا

بعد عملية اختزال خامات الحديد في الفرن العالى أو فرن مدركس تأتى المرحلة الثالثة وهي انتاج الأنواع المختلفة من الحديد مثل الحديد الزهر أو الصلب.

# ≺Steel →

تعتمد صناعة الصلب على عمليتين أساسيتين هما:

- ١- التخلص من الشوائب الموجودة في الحديد الناتج من أفران الاختزال.
- ٢- إضافة بعض العناصر الى الحديد لتكسب الصلب الناتج الخواص المطلوبة للأغراض
   الصناعية .
  - \* وتتم صناعة الصلب باستخدام واحد من ثلاثة أنواع معروفة من الأفران هي؛
    - ١- المحولات الأكسجينية .
      - ٢- الفرن المفتوح .
      - ٣- الفرن الكهربائي .



# ح السبانك

السبيكة هي مايتكون عادة من فلزين أو أكثر مثل الحديد والكروم، الحديد والمنجنيز، الحديد والفائاديوم ، الحديد والنبكل، ويمكن أن تتكون من فلز وعناصر الافلزية مثل الكربون.

### تحضير السبائك ا

١- تحضر السبائك عادة بصهر الفلزات مع بعضها وترك المنصهر ليبرد تدريجياً.

٢- الترسيب الكهربي :


يمكن الحصول على السبائك بالترسيب الكهربي لفلزين أو أكثر في نفس الوقت ، مثل تغطية المقابض الحديدية بالنحاس الأصفر ( نحاس + خارصين ) وذلك بترسيبه كهربيا من محلول يحتوى أيونات النحاس والخارصين على هذه المقابض .

# أنواع السبائك :

### ١- السيائك السنبة :

يتكون أى فلز نقى - كالحديد - من شبكة بلورية من ذرات الفلز مرصوصة رصا محكما بينها مسافات بينية شكل (١-٥١) وعند الطرق يمكن أن تتحرك طبقة من ذرات الفلز فوق طبقة أخرى شكل (١-٥٠) ولكن إذا أدخل فلز آخر حجم ذراته أقل من حجم ذرات الفلز النقى في المسافات البينية للشبكة البللورية للفلز الأصلى، فإن ذلك يعوق إنزلاق الطبقات (شكل المائر بعض خواصه الفيزيائية الأخرى مثل : قابلية تأثر بعض خواصه الفيزيائية الأخرى مثل : قابلية الطرق والسحب ودرجات الإنصهار والتوصيل الكهربي والخواص المغناطيسية.

ويعرف مثل هذا النوع من السبائك باسم السبائك البينية ومن أمثلتها سبيكة الحديد والكربون (الحديد الصلب)



### ٢- السيانات الاستبدالية :

فى هذا النوع من السبائك تستبدل بعض ذرات الفلز الأصلى بذرات فلز أخر له نفس القطر والشكل البلورى والخواص الكيميائية مثل سبيكة (الحديد والكروم) فى الصلب الذى لايصداً وسبيكة (الذهب والنحاس)، وسبيكة (الحديد والنيكل).

# ٣- سيائك المركبات البينظارية:

فى هذا النوع من السبائك تتحد العناصر المكونة للسبيكة اتحادا كيميائيا فتتكون مركبات كيميائية، لاتخضع صيغتها الكيميائية لقوانين التكافؤ وهي مركبات صلبة تتكون من فلزات لا تقع فى مجموعة واحدة من الجدول الدورى، ومن أمثلتها سبيكة (الألومنيوم - النيكل) Ni, Al والمعروفة بإسم الديور ألومين وسبيكة (الرصاص - الذهب) Au, Pb

# خواص الحديد

ليس للحديد النقى أى أهمية صناعية فهو لين نسبيا ليس شديد الصلابة، يسهل تشكيله، قابل للسحب والطرق، له خواص مغناطيسية ينصهر عند 1538°C وكثافته 7.87g/cm³. وتعتمد الخواص الفيزيائية للحديد على نقائه وطبيعة الشوائب به، ويمكن إنتاج عدد هائل من أنواع الصلب وسبائك الحديد لها صفات عديدة تجعهل صالحة الاستخدامات كثيرة.



# الخواص الكيميائية ،

- بخلاف العناصر التي قبله في السلسلة الانتقالية الأولى لا يعطى الحديد حالة تأكسد تدل على خروج جميع الكترونات المستويين الفرعيين ( 48,3d) وهي ثمان الكترونات .

- جميع حالات التأكسد الأعلى من (3+) ليست ذا أهمية .
- له حالة تأكسد (2+) تقابل خروج الكترونى المستوى الفرعى (4s) وحالة تأكسد (3+)
   تقابل (3d<sup>5</sup>) نصف ممتلىء (حالة ثبات).

#### ١- تأشير الهواء ١

يتفاعل الحديد الساخن لدرجة الاحمرار مع الهواء أو الأكسجين ليعطى أكسيد حديد مغناطيسي

$$3\text{Fe}_{\text{\tiny (4)}} + 2\text{O}_{2_{\text{\tiny (4)}}} \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}_{3}\text{O}_{4_{\text{\tiny (4)}}}$$

## ٧- فعل بخار الماء ،

يتفاعل الحديد الساخن لدرجة الاحمرار (500°C) مع بخار الماء ليعطى أكسيد حديد مغناطيسي وهيدروجين.

$$3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{500^{\circ}\text{C}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_{2_{10}}$$

# ٢- مع اللا فالرات :

يتفاعل مع الكلور ويعطى كلوريد حديد (III) ويتحد مع الكبريت مكونا كبريتيد حديد (II)

$$2Fe_{\omega} + 3Cl_{2_{\omega}} \xrightarrow{\Delta} 2FeCl_{3_{\omega}}$$

$$Fe_{\omega} + S_{\omega} \xrightarrow{\Delta} FeS_{\omega}$$

### ا- مع الاحماض :

يذوب الحديد في الأحماض المعدنية المخففة ليعطى أملاح حديد (II) ولا يتكون أملاح الحديد (III) لأن الهيدروجين الناتج بختزلها .

$$Fe_{(a)}^{+} + H_2SO_{4_{(aq)}} \xrightarrow{dil.} FeSO_{4_{(aq)}}^{+} + H_{2_{(q)}}$$

$$Fe_{(a)}^{+} + 2HCl_{(aq)} \xrightarrow{dil.} FeCl_{2_{(aq)}}^{+} + H_{2_{(q)}}$$

- يتفاعل مع حمض الكبر يتيك المركز الساخن ليعطى كبريتات حديد (II) وكبريتات حديد(III) وثاني أكسيد الكبريت وماء .

$$3Fe + 8H_2SO_{4_{(\ell)}} \xrightarrow{Conc} FeSO_{4_{(kq)}} + Fe_2(SO_4)_{3_{(kq)}} + 4SO_2 + 8H_2O$$

- يسبب حمض النيتريك المركز خمولا ظاهريا للحديد لتكون طبقة رقيقة من الأكسيد على سطح الفلز تحميه من استمرار التفاعل، ويمكن إزالة هذه الطبقة بالحك أو باستخدام حمض الهيدرو كلوريك المخفف.

# ﴿ أكاسيد الحديد >

# ۱- أكسيد الحديد (II) FeO:

#### تحضيرده

• باختزال الأكاسيد الأعلى بالهيدروجين أو أول أكسيد الكربون . 
$$^{\circ}$$
  $^{\circ}$   $^$ 



# - خواصه :

- ١- مسحوق أسود لا يذوب في الماء .
- ٧- يتأكسد بسهولة في الهواء الساخن .

$$4 FeO_{\omega} + O_{2} \xrightarrow{\Delta} 2 Fe_{2}O_{3_{\omega}}$$

٣- يتفاعل مع الأحماض المعدنية المخففة منتجاً أملاح الحديد (II) والماء .

$$\text{FeO}_{\text{\tiny (a)}} + \text{H}_2\text{SO}_{4_{\text{\tiny (aq)}}} \longrightarrow \text{FeSO}_{4_{\text{\tiny (aq)}}} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$$

# \*- أكسيد الحديد (III) -\*

#### ه تحضير د ا

 ۱- عند إضافة محلول قلوى إلى محاليل أملاح الحديد (III) يترسب هيدروكسيد الحديد (III)(بنى محمر).

وعند تسخين الهيدروكسيد عند درجة أعلى من 200°c يتحول إلى أكسيد حديد (III)

$$FeCl_{3} + 3NH_4OH \longrightarrow Fe(OH)_{3} + 3NH_4Cl_{(aq)}$$

$$2Fe(OH)_{3} \xrightarrow{\tilde{U}^{a}} \frac{\tilde{U}^{a}}{200^{\circ}C} Fe_2O_3 + 3H_2O_{(a)}$$

عند تسخين كبريتات الحديد (II) ينتج أكسيد الحديد (III) .

$$2\text{FeSO}_{4_{00}} \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}_{2}\text{O}_{3_{00}} + \text{SO}_{2_{00}} + \text{SO}_{3_{00}}$$

#### . 02929 -

يوجد في الطبيعة في خام الهيماتيت.

#### - خواصه ،

- ١- لا يدوب في الماء .
- ٢- يستخدم كلون أحمر في الدهانات.
- ٣- يتفاعل مع الأحماض المعدنية المركزة الساخنة معطياً أملاح الحديد (III) والماء.

مثال :-

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow[\text{(a)]} \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$$

٣- الأكسيد الأسود ( أكسيد الحديد المغناطيسي) . Fe3O3

-1039-9-

يوجد في الطبيعة ويعرف بالجنيتيت، وهو أكسيد مختلط من أكسيدي حديد (II). وحديد (III).

- تحضير ١٥-

١- من الحديد المسخَّن لدرجة الأحمرار بفعل الهواء أو بخار الماء .

۲- باختزال أكسيد الحديد (III).

- خواسه،

١- مغناطيس قوي .

٢-يتفاعل مع الأحماض المركزة الساخنة معطيًا أملاح حديد (II) وحديد (III) مما
 يدل على أنه أكسيد مركب .

$$Fe_3O_4 + 4H_2SO_4 \xrightarrow{Conc.} FeSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + 4H_2O_{(f)}$$

$$\cdot \text{ FeSO_4 in } (III) \text{ are images to the property of th$$

$$2\text{Fe}_3\text{O}_{4} + \frac{1}{2} \text{ O}_{2} \xrightarrow{\Delta} 3\text{Fe}_2\text{O}_{3}$$



# GERICA ENGA CAMA

# √التقويم >

# السؤال الأول :

# اختر الأجابة الصحيحة من بين الأجابات التالية :

بت يعطى	١- عند تفاعل الحديد مع الكبري
ب- FeSO <sub>4</sub>	Fe2(SO4)3 -i
FeS -a	Fe <sub>2</sub> S <sub>3</sub> >
المخففة وينتج	٢- يذوب الحديد في الأحماض
ب- اکسید حدید(II)	i-أملاح حديد (II)
د-اکسید حدید(III)	ج- أملاح حديد (III)
بد مختلط لذلك عند تفاعله مع الأحماض المركزة	٣- أكسيد الحديد الأسود أكسي
****	الساخنة يعطى
ب-أملاح حديد (III)	أ- أملاح حديد (II)
د - أكسيد حديد (III)	جـ- (أ،ب) معا
مغناطیسی عند درجة من ℃700 -400 ينتج	٤- عند اختزال أكسيد الحديد ال
ب- FeO	Fe -i
FeSO <sub>4</sub> - a	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -ج
مخففة منتجا	٥- يتفاعل FeOمع الأحماض ال
ب - ملح الحديد (III) فقط	أ- ملح الحديد (II) فقط
د -ملح الحديد (III) وماء	ج-ملح الحديد (II) وماء
د (II) بنتج أكسيد حديد(III)، ثاني أكسيد الكبريت	٦- عند تسخين كبريتات حدي
ب- الماء	أ - الهيدروجين
د- كبريتيد الهيدروجين	ج- ثالث أكسيد الكبريت
	N. S

# (السؤال الثاني،

ج- المركبات البينظازية

# اختر من العمود (ب) التركيب الالكتروني لعناصر العمود (أ) ثم ما يناسبه من الاستخدامات من العمود(ج):

د- (أ، جـ) معا

(ج) الاستخدامات	(ب) التركيب الأنكتروني	(أ) العنصر
<ul> <li>ا_بستخدم أحد مركباته كمادة</li> <li>مؤكسدة ومطهرة</li> </ul>	[Ar] 3d <sup>10</sup> 4s <sup>1</sup> -i	۱- تیتانیوم ( <sub>22</sub> Ti)
II_يستخدم في هدرجة الزيوت III-يستخدم نظيره المشع (60)هي	[Ar] 3d <sup>7</sup> 4s <sup>2</sup>	۲- کروم ( <sub>24</sub> Cr)
عمليات حفظ الأغنية IV _ يستخدم في دباغة الجلود	[Ar] 3d <sup>2</sup> 4s <sup>2</sup>	۳- منجنیز ( <sub>25</sub> Mn)
<ul> <li>آستخدم سبائكه مع الأثومنيوم</li> <li>قررصناعة المركبات الفضائية</li> </ul>	[Ar] 3d <sup>8</sup> 4s <sup>2</sup> - s	€ كريات ( <sub>27</sub> Co) ع
VI _ يدخل في تركيب معلول فهاتج	[Ar] 3d <sup>5</sup> 4s <sup>1</sup>	ه- نيكل ( <sub>28</sub> Ni)
VII ديستخدم في صناعة زنبركات السيارات	[Ar] 3d <sup>5</sup> 4s <sup>2</sup> - 3	(Cu) (التحاس)



### RECEION EMON LAWN

# (السؤال الثالث ا

#### ماذا يحدث عند ا

- تسخین هیدروکسید حدید (III) إلی أعلی من ℃200°
  - تسخین کبریتات حدید (II) تسخینا شدیدا.
- تفاعل الهيماتيت مع حمض الكبريتيك المركز الساخن.
  - السخين أكسيد الحديد المغناطيسي بشدة في الهواء .
    - تسخین أوكسالات حدید (II) بمعزل عن الهواء .
      - اختزال أكسيد حديد(III) بالهيدروجين .

# (السؤال الرابع ا

أ- صنف ما يلى إلى مواد ديامقناطيسية ومواد بارا مقناطيسية ،

CoCl2 - Fe2 (SO4)3 - ZnSO4 - Cu(NO3)2- FeCl2

ب- صنف ما يلي إلى مواد ملوثة ومواد غيير ملوثة:


- ۱ أيون حديد (II) ٢ أيون حديد (III)
- \* أيون تيتانيوم (III) ٤- أيون سكانديوم (III)
  - ۵ أيون نحاس (II) ١- أيون خارسين (II)


# السؤال الخامس :

- وضح الدور الذي يقوم به كل من :
  - ١- فحم الكوك في الفرن العالى .
- ٢- الغاز الطبيعي في فرن مدركس .

# (السؤال السادس

### اكتب العادلات التي تعبر عن الخططات التالية ،





# السؤال السابع :

### علل اليأتي ،

- بشد عن التركيب الالكتروني المتوقع لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى كل من الكروم و النحاس.
  - من عم النشاط الكيميائي العالى للكروم إلا أنه يقاوم فعل العوامل الجوية .
    - تعتبر فلزات العملة (النحاس الفضة الذهب) عناصر إنتقالية .
  - النقص في الحجم الذرى خلال السلسلة الإنتقالية الأولى لايكون كبيراً.
  - ارتفاع درجات الإنصهار ودرجات الغليان لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى.
  - كثير من الفلزات الانتقالية ومركباتها تتجاذب مع الجال المغناطيسي الخارجي .
- عند تفاعل الحديد مع الأحماض المعدنية الخففة تنتج أملاح الحديد (II) وليس

# أملاح الحديد (III).

- 4 لايكون الإسكانديوم مركبات يكون عدد تأكسده فيها 4
  - أيونات +Zn2+ , Sc3+ غير ملونة.
  - كلوريد الحديد (III) مادة بارامغناطيسية.
  - ١١ يسبب حمض النيتريك المركز خمولا للحديد.
    - ۱۱ معظم العناصر الإنتقالية نشاط حفزى.





# الأهداف

# في نهاية دراسة الطالب لباب التحليل الكيميائي ينبغي أن يكون قادرًا على أن :

- يتذكر المفاهيم والقوانين السابق دراستها والمرتبطة بموضوعات باقى الأبواب.
  - يشرح مفهوم التحليل الكيميائي وأنواعه.
    - يتعرف أنواع التحليل الكمى الوصفي.
  - يكتسب مهارة الكشف عن بعض الشقوق الحامضية.
  - يكتسب مهارة الكشف عن بعض الشقوق القاعدية.
    - يتعرف أنواع التحليل الكمى الحجمي.
      - يتعرف أنواع التحليل الكمى الكتلى.
  - يجرى تجربة تعادل حمض قوى وقلوى قوى باستخدام دليل مناسب.
    - يقارن بين الأدلة الكيميائية واستخداماتها.
    - يكتسب مهارة الدقة في استخدام الأدوات المعملية.
    - يقدر أهمية «دراسة التحليل الكيميائي» للفرد والمجتمع.
    - يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو تكامل الرياضيات والعلوم معًا.



### تراكم معرفي

مراجعة المفاهيم والقوانين التي سبق دراستها في الصفين الأول والثاني الثانوي، ولها علاقة بياقي أبواب الكتاب.

\* المول هو كمية المادة التي تحتوى على عدد أقوجا درو من الجسيمات (جزيئات أو ذرات أو أيونات أو وحدات صيغة أو إلكترونات).

«يلزم 3 مول من الإنكترونات الختزال 1 مول من أيونات +Al3 لتكوين 1 مول من ذرات Al)»

\* الكتلة المولية (g) - مجموع الكتبل الذريبة للعناصير الداخلة في تركيب الجنزىء أو وحدة الصيغة، مقدرة بوحدة الجرام.

\* عدد الجزيئات - عدد مولات الجزيئات × عدد أقوجادرو (أو الذرات أو الأيونات) (أو النزات أو الأيونات) × 10<sup>23</sup> × 6.02

\* حجم الغاز (L/mol) 22.4 × (mol) عدد مو لات الغاز (L/mol) = عدد مو العار (عدم الغاز عدد مو العار الغاز (L/mol)

#### التحليل الكيميائي Chemical Analysis

يعتبر التحليل الكيميائي أحد فروع علم الكيمياء الهامة الذي ساهم بدور كبير في تقدم هذا العلم، كما لعب دورًا كبيرًا في تطور المجالات العلمية المختلفة مثل الطب، والزراعة والصناعات الغذائية والبيئية ... وغيرها.

فلسي عبال الطب: يعتمد تشخيص الأمراض على التحليل الكيميائي فتقدير نسب السكرو الزلال و البولينا و الكوليسترول وغيرها تسهل مهمة الطبيب في التشخيص و العالج، وكذلك تقدير كمية المكونات الفعالة في الدواء.

وفي الراعة: يعتمد تحسين خواص التربة وبالتالى المحاصيل على التحاليل الكيميائية التى التجرى على التحاليل الكيميائية التى تجرى على التربة لمعرفة خواصها، من حيث الحموضة والقاعدية، ونوع ونسب العناصر الموجودة بها، وبالتالى يمكن معالجتها بإضافة الأسمدة المناسبة.

رفي عال المناعة: لا توجد صناعة إلا وكان التحليل الكيميائي للخامات والمنتجات مستخدمًا فيها لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

ولي عال علمة البعة: معرفة و قياس محتوى المياه و الأغذية من الملوثات البيئية الضارة وكذلك نسب غازات أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت و أكاسيد النيتروجين في الجو.

وهناك من الأمثلة العديدة التي لا يتسع الجال لحصرها التي ققوم أساسًا على التحليل الكيميائي الذي يدرس التركيب الكيميائي للمواد

### أنواع التحليل الكيميائي:

لو أن لديك عينة من مادة ما يراد تحليلها كيميائيًا فيجب التعرف على نوع العناصر المكونة لها ونسبة كل عنصروكيف تترابط هذه العناصر مع بعضها إلى أن تصل إلى الصيغة الجزيئية للمادة، أو لمجموعة المركبات المكونة للمادة إن كانت مخلوطًا. ويتم التحليل الكيميائي للمادة بنوعين من التحليل ا

# العمليل الرصفي (الكيفي): - العمليل الرصفي (الكيفي):

يهدف إلى التعرف على مكونات المادة سواء كانت نقية (ملحًا بسيطًا) أو مخلوطًا من عدة مواد.

# Quantitative Analysis : التحليل الكمي - ٣

يهدف إلى تقدير نسبة كل مكون من الكونات الأساسية للمادة.

و لابد من إجراء عمليات التحليل الكيفى أو لا للتعرف على مكونات المادة حتى يمكن اختيار أنسب الطرق لتحليلها كميا.

# Qualitative Chemical Analysis (الكيفي أو النوعي) و Qualitative Chemical Analysis

ذكرنا أن التحليل الوصفى يهدف إلى التعرف على مكونات المادة سواء كانت مادة نقية أو مخلوطا من عدة مواد. فإذا كانت مادة نقية فإنه يمكن التعرف عليها من ثوابتها الفيزيائية مثل درجة الانصهار و درجة الغليان والكتلة المولية .. إلخ.

وإذا كانت مخلوطًا فيجب أو لا إجراء فصل المواد النقية كلِ على حدة ثم نكشف عنها بالطرق الكيميائية باستخدام الكواشف المناسبة.

وعلى ذلك فالتحليل الكيميائي الوصفى : عبارة عن سلسلة من التفاعلات المختارة المناسبة تجرى للكشف عن نوع المكونات الأساسية لمادة على أساس التغيرات الحادثة في هذه التفاعلات. ويضم التحليل الكيميائي الوصفى فرعين :





# Below Swew rame

### أ - تحليل المركبات العضوية :

يتم فيها الكشف عن العناصر والمجموعات الوظيفية الموجودة بغرض التعرف على المركب.

### ب- تحليل المركبات غير العضوية:

يتم فيها التعرف على الأيونات التي يتكون منها الركب غير العضوى، ويشمل الكشف عن الكاتيونات (الشق الحامضي).

وسنكتفى في دراسة التحليل الوصفي على الكشف عن الكاتيونات و الأنيونات في الركبات غير العضوية.

أ الكشف عن الأنيونات (الشق الحامضي)

يمكن تقسيم الأنيونات إلى ثالثة مجموعات لكل منها كاشف معين وهذه المجموعات هي :

- ١- مجموعة أنيونات حمض الهيدروكلوريك المخفف.
  - ٢- مجموعة أنيونات حمض الكبريتيك المركز.
  - ٣- مجموعة أنيونات محلول كلوريد الباريوم.

#### ١- مجموعة أنيونات حمض الهيدروكلوريك المخفف

وتشمل هذه المجموعة أنيونات الكربونات - CO<sup>3</sup> و البيكربونات -HCO<sup>3</sup> و الكبريتيت -S<sup>3</sup> و الكبريتيد S<sup>2</sup> و الثيوكبريتات -S<sup>3</sup> و الثيوكبريتات -S<sup>3</sup> و النيتريت -NO<sub>3</sub> و النيتريت -NO<sub>3</sub> و النيتريت -S<sup>3</sup> و النيتريت -S<sup>3</sup> و النيتريت -NO<sub>3</sub> و النيتريت -NO<sub>3</sub> و النيتريت -S<sup>3</sup> و الأحماض التي السيقة المناقبة الأنيونات و عند تفاعل الحمض مع أملاح هذه الأنيونات فإن الحمض الأكثر ثباتًا يطرد هذه الأحماض الأقل ثباتًا و السهلة التطاير أو الانحلال على هيئة غازات يمكن التعرف عليها بالكاشف المناسب و يفضل التسخين الهين الذي يساعد على طرد الغازات. و يوضح الجدول التالي النواتج الغازية الناتجة من فعل حمض الهيدروكلوريك المخفف على هذه الأنيونات و الكشف عنها.

#### ١ - عبموعة حمض الهيدروكلوريك المحقف:

التجرية الأساسية : الملح الصلب + حمض الهيدروكلوريك المخفف

تجارب تأكيدية للأنيون	الغاز الناتج والكشف عنه	رمزه	الأنيون
$\begin{array}{c} \text{MgCO}_{3(s)} + 2\text{HCI}_{(aq)} & \longrightarrow \\ \\ \text{MgCI}_{2(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} + \text{CO}_{2(g)} \end{array}$	$2NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$ يحدث فوران ويتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون الذى يعكر ماء الجير الرائق. $CO_{2(g)} + Ca(OH)_{2(aq)} $ $CaCO_{3(g)} + H_2O_{(l)}$ $CaCO_{3(g)} + H_2O_{(l)}$ $CaCO_{3(g)} + H_2O_{(l)}$ $CaCO_{3(g)} + H_2O_{(l)}$ $CacO_{3(g)} + U$ $CacO_{3(g)} +$	CO <sub>3</sub> <sup>2</sup> -	(١) الكربوتات

* محلول الملت + محلول كبريتات الماغنسيوم يتكون راسب أبيض بعد التسخين. 2NaHCO <sub>3(aq)</sub> + MgSO <sub>4(aq)</sub>	NaHCO <sub>3(s)</sub> + HCl <sub>(ap)</sub>	HCO <sub>3</sub>	(۲) البيكربونات
* محلول الملت + محلول نيترات الفضة  يتكون راسب أبيض يسود بالتسخين  Na <sub>2</sub> SO <sub>3(20)</sub> + 2AgNO <sub>3(20)</sub> Ag <sub>2</sub> SO <sub>3(2)</sub> + 2NaNO <sub>3(20)</sub>	$Na_{2}SO_{3(a)} + 2HCl_{(aq)}$ $\longrightarrow$ $2NaCl_{(aq)} + H_{2}O_{(\ell)} + SO_{2(g)}$ $y$	SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	(٣) الكيريتيت
* محلول الملح + محلول نيترات الفضة يتكون راسب أسود من كبريتيد الفضة ${\rm Na_2S_{(aq)}} + {\rm 2AgNO_{3(aq)}} + {\rm Ag_2S_{(s)}}$	$Na_{2}S_{(8)} + 2HCl_{(80)}$ $\longrightarrow$ $2NaCl_{(80)} + H_{2}S_{(8)}$ $2NaCl_{(80)} + H_{2}S_{(8)}$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$	S2-	(٤) الكيريتيد
* محلول الملت + محلول اليود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	$Na_{2}S_{2}O_{3(s)} + 2HCl_{(aq)}$ $\longrightarrow$ $2NaCl_{(aq)} + H_{2}O_{(\ell)} + SO_{2(g)} + S_{(s)}$ $y$	S <sub>2</sub> O <sup>2-</sup> <sub>3</sub>	(٥) الثيوكبريتات



# BOURN SURVEY CAME

$$NaNO_{2(s)} + HCl_{(aq)} \longrightarrow NaCl_{(aq)} + HNO_{2(aq)}$$

$$NaCl_{(aq)} + HNO_{2(aq)}$$

$$3HNO_{2(aq)} + 2KMnO_{4(aq)} + 3H_2SO_{4(aq)}$$

$$-5NaNO_{2(aq)} + K_2SO_{4(aq)}$$

$$+ 2MnSO_{4(aq)} + 3H_2O_{(f)}$$

$$+ 2MnSO_{4(aq)} + 3H_2O_{(f)}$$

$$+ 2MnSO_{4(aq)} + 3H_2O_{(f)}$$

$$+ 2MnSO_{4(aq)} + 3H_2O_{(f)}$$

$$-2NO_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2NO_{2(g)}$$

# ٧- مجموعة حمض الكبريتيك المركز

## « تشمل هذه المجموعة الأنيونات الأتية ،

$$(NO_{7}^{-})$$
 - البروميد (Br -) اليوديد (I-) النيترات (NO\_ $7$ )

يعتمد الكشف على أن حمض الكبريتيك المركز أكثر ثباتًا من الأحماض التى تشتق منها هذه الأنيونات. فعند إضافة حمض الكبريتيك المركز لأملاح هذه الأنيونات ثم التسخين تنفصل هذه الأحماض فى صورة غازية يمكن الكشف عنها بالكواشف المناسبة.

### \* التجربة الأساسية : الملح الصلب + حمض الكبريتيك المركز ثم التسخين إذا لزم الأمر :

* محلول الملح + محلول نيترات الفضة يتكون راسب أبيض من كلوريد الفضة يصير بنفسجيًا عند تعرضه للضوء - يذرب في محلول النشادر المركز.  NaCl <sub>(20)</sub> + AgNO <sub>3(20)</sub> + AgCl <sub>(20)</sub>	يتصاعد غاز كلوريد الهيدرو چين عديم اللون والذي يكون سحبًا بيضاء مع ساق زجاجية مبللة بمحلول النشادر. $\frac{\text{conc}/\Delta}{\text{Na}_{2}\text{SO}_{4(aq)} + 2\text{HCl}_{(g)}}$ HCl <sub>(g)</sub> + NH <sub>3(g)</sub> $\frac{\text{NH}_{4}\text{Cl}_{(g)}}{\text{NH}_{4}\text{Cl}_{(g)}}$	Cl⁻	(۱) الكلوريد
* محلول الملح + محلول نيترات الفضة يتكون راسب أبيض مصفر من بروميد الفضة يصبر داكنًا عند تعرضه للضوء ، ويذوب ببطء في محلول النشادر المركز.   NaBr <sub>(aq)</sub> + AgNO <sub>3(aq)</sub> + AgBr <sub>(s)</sub> NaNO <sub>3(aq)</sub> + AgBr <sub>(s)</sub>	يتصاعد غاز بروميد الهيدرو چين عديم اللون يتأكسد جزئيًا بفعل حمض الكريتيك و تنفصل أبخرة برتقالية حمراء من البروم تسبب إصفرار ورقة مبللة بمحلول النشا.	Br-	(۲) البروميد

* محلول الملح + محلول نيترات الفضة يتكون راسب أصفر من يوديد الفضة ،  لايذوب في محلول النشادر .  NaI <sub>(aq)</sub> + AgNO <sub>3(aq)</sub>	یتصاعد غاز یو دید الهیدرو چین عدیم اللون یتاکسد جزء منه بسرعة بواسطة حمض یتاکسد جزء منه بسرعة بواسطة حمض الکیریتیك و تنفصل منه أبخرة الیود تظهر بلونها البنفسجی عند التسخین و تسبب رُرقة و رقة مبللة بمحلول النشا. $ 2KI_{(s)} + H_{2}SO_{4(\ell)} \xrightarrow{conc/\Delta}                                    $	I-	(٣) اليوديد
* اختبار الحلقة البنية  علول ملح النيترات + محلول حديث  التحضير من كبريتات الحديد II + قطرات  من حمض الكبريتيك المركز تضاف بحرص  على السطح الداخلي لأنبوبة الاختبار  فتتكون حلقة بنية عند السطح الفاصل بين  الحمض ومحاليل التفاعل، تنزول بالرج أو  التسخين.  2NaNO <sub>3(aq)</sub> + 6FeSO <sub>4(aq)</sub> + 4H <sub>2</sub> SO <sub>4(l)</sub> conc 3Fe <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3(aq)</sub> + Na <sub>2</sub> SO <sub>4(aq)</sub> + 4H <sub>2</sub> O <sub>(l)</sub> + 2NO <sub>(a)</sub> FeSO <sub>4(aq)</sub> + NO <sub>(a)</sub> FeSO <sub>4(aq)</sub> + NO <sub>(a)</sub> FeSO <sub>4(aq)</sub> + NO <sub>(a)</sub>	و تزداد كثافة الأبخرة عند إضافة قليل من و تزداد كثافة الأبخرة عند إضافة قليل من خراطة النحاس. $\frac{\text{conc}/\Delta}{\text{Na}_2\text{SO}_{4(\ell)}}$ $\text{Na}_2\text{SO}_{4(ag)} + 2\text{HNO}_{3(\ell)}$	NO <sub>3</sub>	(٤) النيترات



# BURNEW SURW FAMA

### ٣- مجموعة محلول كلوريد الباريوم

 $(SO_4^{3-})$  و الكبريتات و الفوسفات ( $PO_4^{3-}$ ) و الكبريتات \*

أنيونات هذه المجموعة لا تتفاعل مع أيًا من حمض HCl المخفف أو حمض H, SO, المركز و لكن هذه الأنيونات تعطى محاليل أملاحها، راسبًا مع محلول كلوريد الباريوم BaCl, المركز و المركز

* محلول الملح + محلول نيترات الفضة يتكون راسب أصفر من فوسفات الفضة يذوب في كل من محلول النشادر وحمض النيتريك   Na <sub>3</sub> PO <sub>4(aq)</sub> + 3Ag NO <sub>3(aq)</sub> 3NaNO <sub>3(aq)</sub> + Ag <sub>3</sub> PO <sub>4(s)</sub>	* محلول الملح + محلول كلوريد الباريوم يتكون راسب أبيض من فوسفات الباريوم يذوب في حمض الهيدرو كلوريك المخفف.  2Na <sub>3</sub> PO <sub>4(2q)</sub> + 3BaCl <sub>2(2q)</sub> Ba <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2(5)</sub> + 6NaCl <sub>(2q)</sub>	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	(١) القوسقات
(II) * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* محلول الملح + محلول كلوريد الباريوم يتكون راسب أبيض من كبريتات الباريوم لا يذوب في حمض الهيدرو كلوريك المحفف. Na <sub>2</sub> SO <sub>4(ag)</sub> + BaCl <sub>2(ag)</sub> + BaSO <sub>4(s)</sub>	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	(۲)الكبريتات

# ب الكشف عن الشق القاعدى في الأملاح البسيطة

يعتبر الكشف عن الشق القاعدى أكثر تعقيدًا من الكشف عن الشق الحامضي و ذلك لكثرة عدد الشقوق القاعدية و للتداخل فيما بينها. علاوة على إمكانية وجود الشق الواحد في أكثر من حالة تأكسد.

وكما تقسم الشقوق الحامضية إلى عدة مجموعات، تقسم أيضًا الشقوق القاعدية إلى ست مجموعات تسمى المجموعات التحليلية ولكل مجموعة من الشقوق القاعدية كاشف معين يسمى بكاشف المجموعة ويعتمد هذا التقسيم على اختلاف ذوبان أملاح هذه الفلزات في الماء، فمثلاً كلوريدات فلزات المجموعة التحليلية الأولى وهي كلوريدات الفضة (I) والزئبق (I) والرصاص (II) شحيحة النوبان في الماء، لذا ترسب هذه الفلزات على هيئة كلوريدات بإضافة كاشف المجموعة وهو حمض الهيدروكلوريك المخفف. وسوف نتناول أمثلة من بعض هذه المجموعات التحليلية الست.

### المعموعة التحليلية الثانية:

يمكن ترسيب كاتيونات المجموعة التحليلية الثانية على هيئة كبريتيدات في الوسط الحامضي. ويتم ذلك بإذابة الملح في الماء وإضافة حمض هيدرو كلوريك مخفف ليصير المحلول حامضيًا ثم يمرر فيه غاز كبريتيد الهيدرو چين -أحد كاتيونات هذه المجموعة أيون النحاس (II).

# الكشف عن أيوث النحاس (II):

محلول ملح النحاس (II) + كاشف المجموعة ( $HCI + H_iS$ ) يتكون راسب أسود من كبريتيد النحاس (II) ينوب في حمض النيتريك الساخن.

$$CuSO_{4(aq)} + H_2S_{(g)} \longrightarrow H_2SO_{4(aq)} + CuS_{(s)}$$



# المجموعة التحليلة الثالثة :

ترسب كاتيونات هذه المجموعة على هيئة هيدروكسيدات بإضافة هيدروكسيد الأمونيوم وذلك عندما لا تكون مختلطة بكاتيونات أخرى. وسندرس من كاتيونات هذه المجموعة التحليلية كاتيونات الأثومنيوم والحديد (II)، والحديد (III).

التجربة الأساسية : محلول الملح + كاشف المجموعة (هيدروكسيد الأمونيوم).

تجارب تأكيدية	تفاعله مع كاشف المجموعة	الكاتيون
* $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 $	Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3(aq)</sub> + 6NH <sub>4</sub> OH <sub>(aq)</sub> 3(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4(aq)</sub> + 2Al(OH) <sub>3(s)</sub> يتكون راسب أبيض چيلاتيني من هيدرو كسيد الألومنيوم يذوب في الأحماض المخففة وفي محلول الصودا الكاوية.	الألومنيوم Al³+
* محلول الملح + محلول هيدرو كسيد الصوديوم يتكون راسب أبيض مخضر من هيدرو كسيد الحديد (II). Fe SO <sub>4(aq)</sub> + 2NaOH <sub>(aq)</sub> ———  Na <sub>2</sub> SO <sub>4(aq)</sub> + Fe(OH) <sub>2(s)</sub>	FeSO <sub>4(aq)</sub> + 2NH <sub>4</sub> OH <sub>(aq)</sub> (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4(aq)</sub> + Fe(OH) <sub>2(s)</sub> يتكون راسب أبيض يتحول إلى أبيض مخضر بالتعرض للهواء ويذوب في الأحماض.	(II) اخدید Fe <sup>2+</sup>
* محلول الملح + محلول هيدرو كسيد الصوديوم يتكون راسب بنى محمر من هيدرو كسيد الحديد (III). FeCl <sub>3(aq)</sub> + 3NaOH <sub>(aq)</sub> ————————————————————————————————————	FeCl <sub>3(aq)</sub> + 3NH <sub>4</sub> OH <sub>(aq)</sub> 3NH <sub>4</sub> Cl <sub>(aq)</sub> + Fe(OH) <sub>3(s)</sub> يتكون راسب چيلاتيني لونه بني محمر يذو ب في الأحماض.	الحديد (III) Fe <sup>3+</sup>



# GENOUS EVIOUS FAMILY

# المجموعة التحليلة الخامسة:

ترسب كاتيونات هذه المجموعة على هيئة كربونات بإضافة محلول كربونات الأمونيوم. وسوف ندرس من كاتيونات هذه المجموعة كاتيون الكالسيوم.

التجربة الأساسية ، محلول اللح + كاشف الجموعة (محلول كربونات الأمونيوم).

تجارب تأكيدية	تفاعله مع كاشف المجموعة	الكاتيون
(١) محلول الملح + حمض كبريتيك مخفف يتكون راسب أبيض من كبريتات الكالسيوم.	$\operatorname{Ca}\operatorname{Cl}_{2(\operatorname{aq})} + (\operatorname{NH}_4)_2\operatorname{CO}_{3(\operatorname{aq})}$ $\longrightarrow$ $2\operatorname{NH}_4\operatorname{Cl}_{(\operatorname{aq})} + \operatorname{Ca}\operatorname{CO}_{3(\operatorname{s})}$	
CaCl <sub>2(ag)</sub> + H <sub>2</sub> SO <sub>4(ag)</sub> 2HCl <sub>(ag)</sub> + CaSO <sub>4(s)</sub> : الكشف الجاف :  كاتيونات الكالسيوم المتطايرة تُكسب لهب بنزن لون أحمر طوبي.	یتکون راسب أبیض من کربونات الکالسیوم $یتکون راسب أبیض من کربونات الکالسیوم EO_2 یا EO_3 نقی الماء المحتوی علی EO_3 حمل EO_3 حمل EO_3 حمل EO_3 حمل EO_3$	الكالسيوم Ca <sup>2+</sup>

#### (ثانيا: التحليل الكمي : Quantitative analysisc

### ۱ - التحليل الحجمي : Volumetric Analysis

تعتمد هذه الطريقة على قياس حجوم المواد المراد تقديرها وفي هذا النوع من التحاليل فإن حجمًا معلومًا من المادة المراد تحديد تركيزها يضاف إليه محلول من مادة معلومة التركيز حتى يتم التفاعل الكامل بين المادتين . ويعرف المحلول معلوم التركيز بالمحلول القياسي . وتعرف عملية تعيين تركيز حمض أو (قاعدة) بمعلومية الحجم الملازم منه للتعادل مع قاعدة أو (حمض) معلوم الحجم والتركيز بالمعايرة

ولإختيار المحلول القياسى يجب معرفة التفاعل المناسب الذى يتم بين محلولي المادتين . وهذه التفاعلات قد تكون :

- (١)- تفاعلات تعادل و تستخدم في تقدير الأحماض والقواعد .
- (٢) تفاعلات أكسدة واختزال وتستخدم في تقدير المواد المؤكسدة والختزلة .
- (٣) تفاعلات الترسيب وتستخدم في تقدير المواد التي يمكن أن تعطى نواتج شحيحة
   الذوبان في الماء .

فإذا كانت المادة المراد تقديرها حامضًا يستخدم في المعايرة محلول قياسي من قلوى أو قاعدة (هيدروكسيد صوديوم أو كربونات صوديوم) وإذا كانت المادة المراد تقديرها ذات خصائص قاعدية يستخدم محلول قياسي معلوم التركيز من الحمض لمعايرتها وهكذا.


وللتعرف على نقطة نهاية التفاعل (End Point) وهى النقطة التى يتم عندها تمام تفاعل التعادل بين الحمض والقاعدة وتستخدم أدلة Indicators لتحديد نقطة نهاية التفاعل بتغير لونها بتغيير وسط التفاعل.



ويبين الجدول الأتي بعض الأدلة المستخدمة في تفاعلات التعادل شكل (٢ - ١) :

اللون في الوسط المتعادل	اللون في الوسط القاعدي	اللون في الوسط الحامضي	الدليل
برتقالى	أصقر	أحمر	الميثيل البرتقالي
عديم اللون	أحمر	عديم اللون	الفينولفثالين
أرجواني	أزرق	أحمر	عباد الشمس
أخضر فاتح	أزرق	أصفر	أزرق بروموثيمول





(شکل (۱ - ۲)

عملية المعايرة شکل (۲ - ۲)

ويمكن إيضاح ذلك في تقدير محلول من هيدروكسيد الصوديوم مجهول التركيز بالمعايرة مع محلول قياسي معلوم التركيز(0.1mol/L) من حمض الهيدروكلوريك حيث ينقل حجم معلوم ( 25m L ) من محلول القلوى إلى دورق مخروطي باستخدام ماصة ويضاف إليه قطرتين من محلول دليل مناسب (محلول عباد الشمس أو أزرق

بروموثيمول) وتمليّ السحاحة بالمحلول القياسي من حمض الهيدروكلوريك. يضاف محلول الحمض بالتدريج إلى الحلول القلوى شكل (٢-٢) حتى يتغير لون الدليل مشيراً إلى نهاية التفاعل (نقطة التعادل) الذي يمكن تمثيله على النحول التالي

$$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$$
 $(aq)$ 
 $(aq)$ 
 $(aq)$ 

فإذا كان حجم الحمض المضاف من السحاحة حتى نقطة نمام التفاعل هو 21mL

$$\frac{21 \times 0.1}{1000} = 2.1 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

وهذا يعنى أن عدد المولات من هيدروكسيد الصوديوم الموجودة في 25ml من المحلول

2.1 x 10<sup>-3</sup> mol. =

$$\frac{2.1 \times 10^{-3} \times 1000}{25}$$
 = 0.084 mol/L

وبالتالي فإن تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم = 0.084 mol/L وبالتالي فإن تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم =

$$\frac{M_a V_a}{n_a} = \frac{M_b V_b}{n_b}$$

(mol/L) = تركيز الحمض المستخدم =  $M_a$ 

 $^{(\mathbf{ml})}$  حجم الحمض المستخدم في المعايرة  $^{-}$ 

n = عدد المولات من الحمض في معادلة التفاعل المتزنة

(mol/L) = تركيز القلوى المستخدم =  $M_h$ 

(ml) حجم القلوى المستخدم في المعايرة  $V_{h}$ 

n = عدد المولات من القلوى في معادلة التفاعل المتزنة

الصوديوم الهيدروكلوريك

وفي المثال السابق فإن:

$$\frac{M_a V_a}{n_a} = \frac{M_b V_b}{n_b}$$
0-1 x21  $M_b x$  25

$$\frac{0 - 1 \times 21}{1} = \frac{M_b \times 25}{1}$$

$$M_b = \frac{21 \times 0.1}{25} = 0.084 \text{ mol/L}$$



### SPORTE MAJOR

مثال (١) :

أجريت معايرة  $20 \, \mathrm{ml}$  من محلول هيدروكسيد الكالسيوم  $[\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_2]$  باستخدام حمض هيدروكلوريك  $0.5 \, \mathrm{mol/L}$  وعند نمام التفاعل استهلك  $25 \, \mathrm{ml}$  من الحمض احسب التركيز المولاري لهيدروكسيد الكالسيوم  $(\mathrm{mol/L})$ 

الحل

$$2 ext{ HCl}_{\text{(aq)}}$$
 +  $Ca(OH)_{2_{\text{(aq)}}}$   $\longrightarrow$   $CaCl_{2_{\text{(aq)}}}$  +  $H_2O_{(\ell)}$ 
 $\frac{M_a V_a}{n_a} = \frac{M_b V_b}{n_b}$ 
 $\frac{0.5 ext{ x 25}}{2} = \frac{M_b ext{ x 20}}{1}$ 

 $M_{_{b}} = \frac{25 \times 0.5}{2 \times 20} = 0.3125 \text{ mol/L} = M_{_{b}}$  ترکیز هیدروکسید الکالسیوم

مثال (٢) :

مخلوط من مادة صُلبة يحتوى على هيدروكسيد الصوديوم وكلوريد الصوديوم . لزم لمعايرة  $0.1~{
m mol/L}$  منه حتى نمام التفاعل  $10~{
m ml}$  من حمض هيدروكلوريك  $0.1~{
m mol/L}$  . احسب النسبة المئوية لهيدروكسيد الصوديوم في المخلوط .

الحل

$$\frac{0.1 \times 10}{1000} = 0.001 \; ext{mol} = 0.0$$

#### Quantitative analysisc : ٢ - التحليل الكمي الكتلي ٢

يعتمد التحليل الكتلى على فصل المكون المراد تقديره . ثم تعيين كتلته وباستخدام الحساب الكيميائي يمكن حساب كميته . ويتم فصل هذا المكون بإحدى طريقتين :

أ- طريقة التطاير

ب- طريقة الترسيب

### (i) طريقة التطاير: Volatilization

تبنى هذه الطريقة على أساس تطاير العنصر أو المركب المراد تقديره وتجرى عملية التقدير أما بجمع المادة المتطايرة وتعيين كتلتها أو بتعيين مقدار النقص في كتلة المادة الأصلية .

#### مثال محلول:

إذا كانت كتلة عينة من ملح كلوريد الباريوم المتهدرت BaCl<sub>2</sub>.X H<sub>2</sub>O هي وسخنت تسخينًا شديدًا إلى أن ثبتت كتلتها فوجدت 2.2923 g احسب النسبة المئوية لماء التبلر من الكلوريد المتهدرت، ثم أوجد الصيغة الجزيئية للملح المتهدرت.

$$(O = 16, H=1, Cl = 35,5, Ba = 137)$$

#### الحل :

اى أن 2.2923 g كلوريد باريوم غير متهدرت ترتبط مع 0.398 g ماء تبلر

$$14.79\% = \frac{100 \times 0.398}{2.6903}$$
 = التبلر المنوية المحتلية المنوية المحتلية المتالية المتالية المحتلية المحت

ب الكتلة المولية 208 g/mol = (137+71) Ba Cl<sub>2</sub> ترتبط مع (س) جم ماء تبلر

$$36.114 \text{ g} = \frac{0.398 \times 208}{2.2923} = (كتلة ماء التبلر) عند نام التبلر) د. شاه التبلر عند عند التبلر عند$$

18 g/mol = (16x1) + (1x2) = الكتلة الجزيئية للماء = ...

mol 2.006 = 
$$\frac{36.114}{18}$$
 = التبلر = ثيئات ماء التبلر = ...

ن الصيغة الجزيئية لكلوريد الباريوم المتهدرت هي (BaCI, .2H,O)



# द्वाग्या द्वारिकास्य

#### Precipitation : (ب) طريقة الترسيب

و تعتمد هذه الطريقة على ترسيب العنصر أو المكون المراد تقديره على هيئة مركب نقي شحيح النوبان في الماء وذو تركيب كيميائي معروف وثابت .ويفصل هذا المركب عن المحلول بالترشيح على ورقة ترشيح عديمة الرماد (نوع من ورق الترشيح يحترق احتراقا كاملا ولا يترك أي رماد) .وتنقل ورقة الترشيح وعليها الراسب في بوتقة احتراق وتحرق تماما حتى تتطاير مكونات ورقة الترشيح ويبقى الراسب . ومن كتلة الراسب يمكن تحديد كتلة العنصر أو المركب . مثال ذلك ترسيب الباريوم على صورة كبريتات باريوم .

#### مثال محلول:

أضيف محلول كبريتات الصوديوم إلى محلول من كلوريد الباريوم حتى تمام ترسيب كبريتات الباريوم وتم فصل الراسب بالترشيح والتجفيف فوجد أن كتلته = 2 g .

احسب كتلة كلوريد الباريوم في المحلول.

$$(O = 16, S = 32, Cl = 35.5, Ba = 137)$$

#### الحل:

يجب كتابة معادلة التفاعل موزونة ثم تحسب الكتل المولية للمواد المطلوب إيجاد العلاقة بينها وهي هنا كلوريد وكبريتات الباريوم

Ba Cl<sub>2</sub> + Na<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> 
$$\longrightarrow$$
 Ba SO<sub>4</sub> + 2Na Cl
(1mol)
208g  $\longrightarrow$  233g

$$xg \longrightarrow 2g$$
1.785g =  $\frac{2 \times 208}{233}$  = (x) ختلة كلوريد الباريوم  $\therefore$ 

# ≺التقويم>

```
١ - وضح بالمادلات الرمزية المتزنة كيف تميز عمليا بين كل زوج من الأملاح الأتية:
                            أ - كبريتيت الصوديوم - كبريتات الصوديوم
                         ب - كلوريد حديد (III) - كلوريد الحديد (III)
                            ج - نيتريت الصوديوم - نيترات الصوديوم
                             د - كلوريد الصوديوم - كلوريد الألومنيوم
٢ - أذكر اسم وصيغة الشق الحامضي أو القاعدي الذي أعطى النتائج التالية عند
                                                            الكشف عنه:
         أ - محلول الملح + محلول هيدروكسيد الصوديوم تكون راسب أبيض مخضر
ب - محلول الملح + محلول كبريتات الماغنسيوم تكون راسب أبيض بعد التسخين
ج - محلول الملح + محلول نيترات الفضة تكون راسب أصفر لا يذوب في محلول النشادر
٣ - أذكر استخداما واحدا لكل من الكواشف التالية مع توضيح إجابتك بالمعادلات
                                                               الرمزية:
                                 أ - هيدروكسيد الأمونيوم
                ب - كلوريد الباريوم
                                          ج - نيترات الفضة
    د- برمنجنات البوتاسيوم المحمضة
                       ٤ - تخير رقم الإجابة الصحيحة في الحالات الأتية :
   أ - محلول الملح + محلول كلوريد الباريوم يتكون راسب أبيض لا يذوب في الأحماض :
                    أ-نيترات ب-فوسفات ج-كبريتات
    د.- نیتریت
                ب - محلول الملح + محلول أسيتات الرصاص (II) يتكون راسب أسود :
                  أ - كبريتات ب - نيترات جـ - فوسفات
    د-كبريتيد
            ج - محلول الملح + محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب بني محمر :
  أ - نحاس (II) ب - حديد (III) ج. - ألومنيوم د - حديد (II)
  د - الملح الصلب + حمض هيدروكلوريك يتصاعد غاز نفاذ الرائحة ويتكون راسب أصفر:
    أ - كبريتيد ب - كربونات ج - ثيو كبريتيت د - كبريتيت
              ٥ - علل ما يأتي موضحا إجابتك بالمعادلات الرمزية كلما أمكن :
أ - يظهر راسب أبيض جيلاتيني ثم يختفي عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم
```

بالتدريج لحلول كلوريد الألومنيوم.



### SPORT STUBION

ج - يزول اللون البنفسجى لمحلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك عند إضافة محلول نيتريت البوتاسيوم

د- تسود ورقة ترشيح مبللة بمحلول أستيات الرصاص (II) عند تعرضها لغاز كبريتيد
 الهيدروجين

ه - تتصاعد أبخرة بنفسجية عند تفاعل حمض الكبريتيك المركز مع يوديد البوتاسيوم والتسخين

٦- تخير من القسم (أ) المناسب لكل شق من القسم (ب) : عند إضافة محلول نيترات الفضة إلى محاليل بعض الأنيونات يتكون راسب :

(ب)	(i)
الفوسفات	١ – أسود لا يذوب في حمض النيتريك
البروميد	٢- أبيض لا يذوب في حمض النيتريك المخفف
الكلوريد	٣- أبيض مصفر لا يذوب في حمض النيتريك المخفف
الكبريتيد	٤- أصفر يذوب في حمض النيتريك المخفف
	٥- أصفر لا يذوب في حمض النيتريك المخفف

# ٧ - عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محاليل ثلاث أملاح من الكلوريدات يتكون في:

الأول: راسب أبيض جيلاتيني

الثاني: راسب بني محمر

الثالث: راسب أبيض مخضر

ثم أذكر الشق القاعدي للأملاح الثلاث وأكتب معادلات التفاعل

٨ - أضيف حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى ثلاث املاح صلبة فأمكن ملاحظة
 الظواهر الأتية علما بأن الأملاح الثلاث أملاح لفلز الصوديوم

الأول: تصاعد غاز نفاذ الرائحة يسبب إخضرار ورقة ترشيح مبللة بمحلول ثانى كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز

الثاني: تصاعد غاز عديم اللون يتحُّول قرب فوهة الأنبوبة إلى غاز بني محمر

الثالث: تصاعد غاز عديم اللون نفاذ الرائحة وتعلق مادة صفراء

أذكر الشق الحمضي للأملاح الثلاث وأكتب معادلات التفاعل

- 0.1 mol/L) مع حمض الكبريتيك (0.1 mol/L) مع حمض الكبريتيك (0.1 mol/L) فكان حجم الحمض المستهلك عند نقطة النهاية هي (8ml) . أحسب تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم .
- ۱۰ أحسب حجم حمض الهيدروكلوريك (0.1 mol/L) اللازم لمعايرة (20 ml) من محلول كربونات الصوديوم (0.5 mol/L) حتى تمام التفاعل .
- ۱۱ أوجد كتلة هيدروكسيد الصوديوم المذابة في (25ml) والتي تستهلك عند معايرة (15ml) من حمض الهيدروكلوريك (0.1mol/L)
- ١٢ أذيب 2 جرام من كلوريد الصوديوم (غير النقي) في الماء وأضيف إليه وفرة من نترات
   الفضة فترسب 4.628g من كلوريد الفضة . أحسب نسبة الكلور في العينة .







# الأهداف >

#### في نهاية دراسة الطالب لباب الاتزان الكيميائي ينبغي أن يكون قادراً على أن:

- يعرف النظام المتزن.
- يوضح العوامل التي تؤثر في معدل التفاعل الكيميائي.
  - يكتب نص قانون فعل الكتلة.
- يطبق قانون فعل الكتلة على التفاعلات المتزنة ويحسب ثابت الاتزان.
  - يعدد العوامل التي تؤثر على حالة الاتزان.
    - يكتب نص قاعدة لوشاتيلييه.
  - يجرى بعض الحسابات المتعلقة بالاتزان الكيميائي.
    - يوضح مفهوم الاتزان الأيوني.
    - يشرح تأين الماء والحاصل الأيوني للماء.
- يوضح مفهوم الأس الهيدروجيني «الرقم الهيدروجيني» ودلالته على المحاليل المائية.
  - يشرح مفهوم التميؤ «التحلل المائي» .
  - يوضح مفهوم حاصل الإذابة وتطبيقاته.
  - يجرى بعض الحسابات المتعلقة بالاتزان الكيميائي .
  - يقدر عظمة الخالق في الدقة المتناهية لخلق الكون.
    - يقدر جهود العلماء في تقدم علم الكيمياء.



### الاتزان الكيميائي Chemical Equilibrium

النظام المتزن هو نظام ساكن على المستوى المرئى و نظام ديناميكي على المستوى غير المرئي .

فإذا وضعت كمية من الماء في إناء مغلق على موقد نشاهد حدوث عمليتين متضادتين أو متعاكستين هما عمليتا التبخير والتكثيف، في بداية التسخين يكون معدل تبخير الماء هي العملية السائدة يصحبها زيادة في الضغط البخاري (هو ضغط بخار الماء الموجود في الهواء عند درجة حرارة معينة) وتستمر عملية التبخير حتى يتساوى الضغط البخاري مع ضغط بخار الماء المشبع (وهو أقصى ضغط لبخار الماء يمكن أن يتواجد في الهواء عند درجة حرارة معينة).

وبذلك تحدث حالة اتزان بين سرعة التبخير وسرعة التكثيف ويكون عندها عدد جزيئات الماء التي تتبخر مساو لعدد جزيئات البخار التي تتكثف.

وكما يحدث اتزان في الأنظمة الفيزيائية يحدث أيضا اتزان في العديد من التفاعلات الكيميائية و يمكن تقسيم التفاعلات الكيميائية إلى نوعين هما:

١- تفاعلات تامة (غير انعكاسية).

٢- تفاعلات انعكاسية .

### Complete Reactions التفاعلات التامة

فى هذا النوع تسير التفاعلات فى اتجاه واحد غالبا (الاتجاه الطردى تقريبا) حيث يصعب على المواد الناتجة التى تحتوى على غاز أو راسب أن تتحد مع بعضها مرة أخرى لتكوين المواد المتفاعلة فى نفس ظروف إجراء التفاعل.

ومن أمثلة التفاعلات التامة:

أ عند إضافة محلول كلوريد الصوديوم إلى محلول نترات الفضة نلاحظ تكون راسب أبيض من كلوريد الفضة.

$$NaCl$$
 +  $AgNO_{3(aq)}$  -  $NaNO_{3(aq)}$  +  $AgCl$  (s)

ب: اوضع شریط من الماغنسیوم فی محلول حمض هیدروکلوریك پتصاعد غاز
 الهیدروجین .

$$Mg_{(s)} + 2HC_{(sq)}^{\ell} \longrightarrow MgC_{(sq)}^{\ell} + H_2^{\dagger}$$

#### (٣) التفاعلات الإنعكاسية Reversible Reactions:

عند تعادل مول من حمض الخليك مع مول من الكحول الايثيلي فإن المتوقع من معادلة التفاعل الاتية تكون مول من الأستر (أسيتات الإيثيل) ومول من الماء.

$$CH_3COOH_{(aq)} + C_2H_5OH_{(aq)} \Longrightarrow CH_3COOC_2H_{(aq)} + H_2O_{(aq)}$$
 ماء (أستر) خلات الإيثيل كحول ايثيلي حمض خليك

وثكن إذا اختبرنا محلول التفاعل بورقة عياد الشمس زرقاء نجدها تحمر رغم أن المواد الناتجة من التفاعل متعادلة التأثير على عياد الشمس . فما سبب هذه الجموضة إذن ؟ الناتجة من التفاعل متعادلة التأثير على عياد الشمس . فما سبب هذه الجموضة إذن ؟ التفاعل السابق ليس من التفاعلات التامة وائتى تسير في إنجاء تكوين النواتج فقط و يعتبر من التفاعلات المنعكسة التى تسير في كلا الاتجاهين الطردى والعكسى .  $\text{CH}_3\text{COOH}_{+} + \text{C}_3\text{H}_3\text{OH}_{----} \text{CH}_3 \text{COOC}_2\text{H}_{50} + \text{H}_3\text{OH}_{----} \text{CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_{50} + \text{H}_3\text{OH}_{----} \text{CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_{50} + \text{H}_3\text{OH}_{----} \text{CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_{50} + \text{CH}_3\text{COO$ 


وبالتالى فإن المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل تكون موجودة باستمرار في حيرُ التفاعل عند الإنزان وهذا يفسر حموضة خليط التفاعل لوجود حمض الخليك.

الاتزان الكيميائي في التفاعلات الانعكاسية ، هو نظام ديناميكي يحدث عندما يتساوي معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي وتثبت تركيزات المتفاعلات والنواتج ويظل الاتزان قائماً طالما كانت جميع المواد المتفاعلة والناتجة موجودة في وسط التفاعل (لم يتصاعد غاز ولم يتكون راسب) وما دامت ظروف التفاعل مثل درجة الحرارة أو الضغط ثابتة .



#### معدل التفاعل الكيميائي Rate of Chemical Reaction

تقاس سرعة التفاعل الكيميائي بتغير تركيز المواد المتفاعلة في وحدة الزمن ويعبر عن وحدات التركيز بالمول في كل لتر من المحلول وعن الزمن بالدقائق أو الثوائي . وأثناء حدوث التفاعل الكيميائي التام نسبيا يقل تركيز المواد المتفاعلة إلى أن تستهلك تقريباً ويزداد تركيز المواد الناتجة من التفاعل شكل (٣-١). أما في حالة التفاعلات الانعكاسية فإن زيادة تركيز المواد الناتجة وقلة تركيز المواد المتفاعلة يستمران إلى أن يصلا إلى حالة اتزان شكل (٣٠٠).



ومن التفاعلات الكيميائية مايئتهي نسبياً في وقت قصير جداً وهي التفاعلات اللحظية تقريباً مثل تفاعل نتراث الفضة مع كلوريد الصوديوم حيث ينتج راسب شحيح النوبان من كلوريد الفضة الأبيض بمجرد خلط الواد التفاعلة.

وهناك تفاعلات معدلها بطئ نسبياً مثل تفاعل الزيوث النباتية مع الصودا الكاوية لتكوين الصابون والجليسرين وهناك تفاعلات يتطلب حدوثها شهوراً عديدة مثل تفاعل تكوين صدأ الحديد.

#### (العوامل التي تؤثر على معدل (سرعة) التفاعل الكيميائي ، 🛶

تتأثر سرعة التفاعل الكيميائي بعدد من العوامل هي :

- ا طبيعة المواد المتفاعلة .
- ٣- درجة حرارة التقاعل .
- آركيز المواد المتفاعلة .
  - ±- الضفط .

#### ١- الضوء -

#### العوامل الحفارة.

### (١) طبيعة المواد المتفاعلة : يقصد بطبيعة المواد المتفاعلة عاملان مهمان هما :

#### أ- نوع الترابط في المواد المتفاعلة ،

عندما تكون المواد المتفاعلة أيونية مثل تفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع محلول نترات الفضة فإن هذه التفاعلات تكون لحظية وسريعة جدا لأن أيونات المواد المتفاعلة تتفاعل بسرعة بمجرد خلطها. أما التفاعلات التي تتم بين المواد المرتبطة بالروابط التساهمية مثل التفاعلات العضوية فتكون بطيئة عادة

#### ب- مساحة السطح المعرض للتفاعل :

تلعب درجة تجزئة المادة دوراً مهماً في زيادة سرعة التفاعل، فإذا أحضرت كتلتين من فلز الخارصين أحدهما على هيئة مسحوق والأخرى عبارة عن كتلة واحدة ووضعت كلاً على حدة في أنبوبة اختبار وأضفت إلى كل أنبوبة حجمين متساويين من حمض الهيدروكلوريك المخفف فإنك تشاهد أن التفاعل في حالة المسحوق يئتهي في وقت أقل من التفاعل في حالة الكتلة الواحدة . أي أنه كلما زادت مساحة السطح المعرض للتفاعل بين المواد المتفاعلة كلما كان معدل التفاعل أسرع .

### (۲) تركيز المواد المتفاعلة : >

كلما زاد عدد الجزيئات المتفاعلة (أى كلما زاد التركيز) زادت فرص التصادم وزادت سرعة التفاعل .

وقد أوجد العالمان النرويجيان جولدبرج Guldberg وهاج Waage القانون الذي يعبر عن العلاقة بين سرعة التفاعل الكيميائي وتركيز المواد المتفاعلة وهو ما يعرف بقانون فعل الكتلة .

#### Law of Mass Action هانون فعل الكتلة

يتناول هذا القانون تأثير التركيز على معدل التفاعل وينص على ا





عند ثبوت درجة الحرارة تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي تناسبا طرديا مع حاصل ضرب التركيزات الجزيئية لمواد التفاعل (كل مرفوع الأس يساوى عدد مولات الجزيئات أو الأيونات في معادلة التفاعل الموزونة).

ولتوضيح قانون فعل الكتلة يمكنك إجراء التجربة الأتية ،

عند إضافة محلول كلوريد الحديد (III) ( ذو اللون الأصفر الباهت) تدريجيا إلى محلول ثيوسيانات الأمونيوم (عديم اللون) يصير لون خليط التفاعل أحمر دموى لتكون ثيوسيانات الحديد (III) ويمكن تمثيل التفاعل بالانزان التالي ،

قادًا أَضَيفَ مَرْيدًا مَنْ كَلُورِيدَ الحديد (III) نَجِدَ أَنْ لُونَ الْمَحْلُولُ يَرْدَادُ إِحْمَرَارًا مَمَا يَدلَ على تَكُوينَ مَرْيدَ مِنْ ثِيوسِيانَاتَ الحديد (III) .

وعندما يتساوى معدل التفاعل العكسى (r<sub>2</sub>) والطردى (r<sub>1</sub>) في التفاعل السابق فإن التفاعل يكون قد وصل إلى حالة اتزان ، ويعبر عن كلا المعدلين للتفاعل بما يأتي ،

$$\mathbf{r}_1 \propto [\text{FeCl}_3] [\text{NH}_4\text{SCN}]^3$$
  
 $\mathbf{r}_1 = \mathbf{k}_1 [\text{ Fe Cl}_3] [\text{NH}_4\text{SCN}]^3$ 

 $r_2\alpha\,[Fe(SCN)_3]\,[NH_4C']^3$ 

 $r_2 = k_2 [ \text{ Fe (SCN)}_3 ] [ \text{ NH}_4 \text{C}^f ]^3$ 

والأقواس المستطيلة [] تدل على التركيزات بوحدة (Mol/L) أما k<sub>2</sub>, k<sub>1</sub> فهما ثابتاً معدل التفاعل الطردي والعكسي على الترتيب وعند الاتزان بتساوي معدل التفاعلين.

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= \mathbf{r}_2 \\ \mathbf{k}_1 [\text{FeC}_3^\ell] [\text{NH}_4 \text{SCN}]^3 &= \mathbf{k}_2 [\text{Fe}(\text{SCN})_3] [\text{NH}_4 \text{C}_1^\ell]^3 \\ \frac{\mathbf{k}_1}{\mathbf{k}_2} &= \mathbf{K}_5 = \frac{[\text{Fe}(\text{SCN})_3] [\text{NH}_4 \text{C}_1^\ell]^3}{[\text{FeC}_3^\ell] [\text{NH}_4 \text{SCN}]^3} \end{aligned}$$

وخارج قسمة  $rac{k_1}{k_2}$  مقدار ثابت يرمز له بالرمز Ke ويعرف بثابت الاتزان لهذا التفاعل .




#### مثال : احسب ثابت الاتزان للتفاعل

إذا علمت أن تركيزات اليود والهيدروجين ويوديد الهيدروجين عند الاتزان هي على

الترتيب 0.221 mol/L , 0.221 mol/L

الحل :



$$Kc = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

$$Kc = \frac{(1.563)^2}{0.221 \times 0.221} = 50$$

ويلاحظ ما يلى:

(أ) القيم الصغيرة لثابت الاتزان (Kc < 1) تعنى أن حاصل ضرب تركيز النواتج (في البسط) أقل من حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة (في المقام) (كل مرفوع لأس عدد مولاته) مما يعنى أن التفاعل لا يسير بشكل جيد نحو تكوين النواتج وأن التفاعل العكسي له دور فعال . شكل ( $T_c = T_c$ ).

مثال ذلك ذوبانية كلوريد الفضة في الماء :

$$AgC\ell_{(s)} \implies Ag^{+}_{(aq)} + C\ell_{(aq)}$$
,  $Kc = 1.7 \times 10^{-10}$ 

قيمة Kc في التفاعل السابق تدل على أن كلوريد الفضة شحيح الذوبان في الماء . ( $\nu$ ) القيم الكبيرة لثابت الإتزان ( $\nu$ ) تعنى أن التفاعل يستمر إلى قرب نهايته. أي أن التفاعل الطردي هو السائد تقريباً ، مثال لذلك تفاعل الكلور مع الهيدروجين ،

$$H_{2(g)} + C\ell_{2(g)} \implies 2HC\ell_{(g)}, Kc = 4.4 \times 10^{32}$$

(ج.) لا يكتب تركيز الماء النقى كمذيب أو المواد الصلبة أو الرواسب فى معادلة حساب ثابت الإتزان حيث أنها تعتبر ذات تركيز ثابت بوجه عام مهما اختلفت كميتها لأن قيمتها لاتتغير بدرجة ملموسة.

(ء) القيمة العددية لثابت الإتزان لاتتغير بتغير تركيز الواد المتفاعلة أو الناتجة عند نفس درجة الحرارة.



#### SPIPUL SIVERION

#### (۳) تأثیر درجة الحرارة على سرعة التفاعل: >

يمكن تفسير تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل الكيميائي في ضوء نظرية التصادم التي تفترض أنه يشترط لحدوث التفاعل الكيميائي أن تصطدم جزيئات المواد المتفاعلة بحيث تكون الجزيئات المتصادمة ذات السرعات العالية جدًا فقط هي التي تتفاعل لأن طاقتها الحركية العالية تمكنها من كسر الروابط بين الجزيئات فيحدث التفاعل الكيميائي. وعلى ذلك لابد أن يمتلك الجزيء حد أدنى من الطاقة الحركية لكي يتفاعل عند الاصطدام، ويسمى هذا الحد الأدنى بطاقة التنشيط.

وتعرف طاقة التنشيط ، بأنها الحد الأدنى من الطاقة التى يجب أن يمتلكها الجزئ لكى يتفاعل عند الاصطدام . وتسمى الجزيئات ذات الطاقة الحركية المساوية لطاقة التنشيط أو تفوقها بالجزيئات المنشطة . ونستنتج من هذه النظرية أن زيادة درجة الحرارة يزيد نسبة الجزيئات المنشطة وبالتالى يزيد معدل التفاعل الكيميائى . وقد وجد أن كثيرًا من التفاعلات الكيميائية تتضاعف سرعتها تقريبًا إذا ارتفعت درجة الحرارة بمقدار عشر درجات مئوية .

#### تجربة لايضاح تأثير درجة الحرارة على سرعة تفاعل متزن:

- إذا أحضرنا دورق زجاجى يحتوى غاز ثانى أكسيد النيتروجين المعروف بلونه البنى المحمر ووضعناه في إناء به مخلوط مبرد ، نجد أن حدة اللون تخف تدريجيا حتى يزول اللون البنى المحمر شكل (٣-٤)



شکل (۲ - ؛)

وإذا أخرج الدورق من المخلوط المبرد ثم ترك ليعود إلى درجة حرارة الغرفة (25°c) نجد أن اللون البنى المحمر يبدأ في الظهور ولا يلبث أن يعود إلى ما كان عليه وتزداد درجة



اللون كلما ارتفعت درجة الحرارة ويمكن تمثيل ما حدث بالاتزان التالى:

نستنتج من التجربة السابقة أن إزاحة (امتصاص) الحرارة من تفاعل متزن طارد للحرارة ينتج عنها سير التفاعل في الاتجاه الطردي الذي ينتج فيه حرارة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيز المواد في المحاليل يعبر عنها عادة بالمولارية ويتم التعبير عنها بوضع المادة بين قوسين مربعين [] أما إذا كانت المواد الداخلة في التفاعل أو الناتجة منه في الحالة الغازية فإن التعبير عن التركيز يتم عادة باستخدام ضغطها الجزئي.

وعلى سبيل المثال يحضر غاز النشادر في الصناعة من عنصريه طبقاً للتفاعل التالي :

$$N_2 + 3H_{2_{(q)}} \xrightarrow{\text{High pressure}} 2NH_{3_{(q)}}$$
 ,  $\Delta H = -92KJ$ 

نلاحظ أن ، 4 mol من الجزيئات تتفاعل لينتج 2 mol من جزيئات النشادر أى أن تكوين النشادر يكون مصحوبا بنقص في عدد المولات، وبالتالي ينقص في الحجم، وقد وجد أنه بالضغط والتبريد يزداد معدل تكون غاز النشادر. نستنتج من المثال السابق أن زيادة الضغط أو التبريد على تفاعل غازى متزن تجعله ينشط في الاتجاه الذي يقل فيه الحجم.

ويعبر عن ثابت الاتزان في التفاعلات الغازية (مثل تفاعل تحضير غاز النشادر من عنصريه) بالرمز  $K_p$  للدلالة على تركيز المواد معبراً عنه بالضغط الجزئي.

$$K_p = \frac{(P_{NH_3})^2}{(P_{N_2}) \times (P_{H_2})^3}$$

وكما هو الحال في  $K_c$  فإن قيمة  $K_p$  للتفاعل لاتتغير بتغير الضغوط الجزئية للغازات المتفاعلة أو الناتجة في نفس درجة الحرارة ويكون الضغط الكلى للتفاعل هو مجموع الضغوط الجزئية لغازاته (والمرتبطة بعدد مولات كل غاز)





### 201401 24091901

مثال : أحسب ثابت الاتزان Kp للتفاعل :

 $N_{2(g)}+2O_{2(g)}$  يَّنَا كَانَ ضَغَطُ الْغَازِ 2 atm  $N_{2(g)}$  . الْغَازِ 2 atm  $N_{2(g)}$  الْغَارِ 2 atm 2

$$K_p = \frac{(P_{NO_2})^2}{(P_{N_c})^{-X} - (P_{O_c})^2} = \frac{(2)^2}{0.2x \cdot 1^2} = 20$$

.: دُابِت الاتزان = 20

من جملة المشاهدات السابقة وغيرها استطاع العالم الفرنسي "Le Chatelier" أن يضع قاعدة تعرف باسمه وهي تصف تأثير العوامل المختلفة من تركيز وحرارة وضغط على الأنظمة المتزنة .

قاعدة لوشاتلييه : Le Chatelier Principle

إذا حدث تغير في أحد العوامل المؤثرة على نظام في حالة اتزان مثل التركيز ، الضغط ، درجة الحرارة فإن النظام ينشط في الاتجاء الذي يقلل أو يلغى تأثير هذا التغير .

#### (٥) تأثير العوامل الحفازة :>

علمت مماسبق أن التقاعلات البطيئة تحتاج إلى تسخين لكى تسير بمعدل أسرع ولكن إذا كنا بصدد تطبيق هذه التقاعلات في الصناعة فإن تكاليف الطاقة اللازمة للتسخين لاحداث هذه التقاعلات ستكون عالية مما يؤدى إلى رفع أسعار السلع المنتجة لتحميل تكاليف الطاقة على أسعارها.

ومن هذا يبرز دور الكيميائي في المصنع الذي يتضمن البحث عن أفضل السبل لزيادة الإنتاج وتحسينه بأقل التكاليف ، وقد وجد أن معظم التقاعلات البطيئة يمكن إسراعها باستعمال مواد تزيد من معدلها دون الحاجة لزيادة درجة الحرارة ، وتعرف هذه المواد بالعوامل الحفازة Catalysts .

ويعرف العامل الحفاز بأنه مادة بلزم منها القليل لتغير معدل التفاعل الكيميائي دون أن تتغير أو تغير من وضع الاتزان .



#### ويقوم العامل الحفاز بتقليل طاقة التنشيط اللازمة للتفاعل فهو يسرع التفاعل العكسي والطردي في نفس الوقت

وتستخدم الحفازات في أكثر من %90من العمليات الصناعية مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والأغذية . وتوضع في المحولات الحفزية المستخدمة في شكمانات السيارات لتحويل غازات الاحتراق الملوثة للجو إلى نواتج آمنة والحفازات هي عناصر فلزية أو أكاسيدها أو مركباتها. وتعمل الانزيمات (وهي جزيئات من البروتين تتكون في الخلايا الحية) كعوامل حفز للعديد من العمليات البيولوجية والصناعية .

### (٦) تأثير الضوء :

تتأثر بعض التفاعلات الكيميائية بالضوء ويعتبر التمثيل الضوئى مثالاً لذلك حيث يقوم الكلوروفيل في النبات بامتصاص الضوء وتكوين الكربوهيدرات في وجود ثاني أكسيد الكربون والماء. كما أن أفلام التصوير تحتوى على بروميد فضة في طبقة جيلاتينية وعندما يسقط الضوء عليها فإنه يعمل على أكتساب أيون الفضة الموجب الإلكترون من أيون البروميد السالب ليتحول إلى فضة ويمتص البروم المتكون في الطبقة الجيلاتينية وكلما زادت شدة الضوء زادت كمية الفضة المتكونة.

$$Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag^\circ$$



# الاتزان الأيونى


### تطبيقات قانون فعل الكتلة على حالات الاتزان الأيوني ب

#### ﴿ أُولاً : المحاليل الإلكتر وليتية : ≻

هناك مواد صلبة متأينة تماماً مثل كلوريد الصوديوم وعند ذوبان مثل هذه المواد في الماء فإنها تتفكك إلى أيوناتها الموجبة والسالبة ومحاليل هذه المواد موصلة جيدة للتيار الكهربي. وتعرف هذه المواد بالمركبات الأيونية حيث وترتبط أيوناتها الموجبة والسالبة بقوى الجذب الإلكتر وستاتيكية.

أما المركبات التساهمية فتكون الروابط بين ذراتها تساهمية مثل غاز كلوريد الهيدروجين الجاف وحمض الخليك النقى . وفي وجود الماء تتأين هاتان المادتان . غير أن غاز كلوريد الهيدروجين يكون تأينه 100٪ تقريباً بينما حمض الخليك يكون تأينه محدودًا جدًا . ويمكن الاستدلال على ما سبق بإجراء التجارب التالية :

تجربة (۱): اختبر التوصيل الكهربي لحمض الخليك النقى (الثلجي) وغاز كلوريد الهيدروجين الدائب في البنزين باستخدام الجهاز المبين بالشكل (۳- ۵). تشاهد أن المصباح لا يضي في كلتا الحالتين مما يدل على أن كلا المحلولين لا يحتوى على أيونات تعمل على توصيل التيار.





(شکل (۳- ۰)

تجربة (٢) ؛ أذب 0.1 mol من غاز كلوريد الهيدروجين في 1 L من الماء وبالمثل أذب 0.1 mol من حمض الخليك النقى في 1 L من الماء وبذلك يكون لديك محلولان متساويان في التركيز من حمض الخليك وحمض الهيدروكلوريك . اختبر التوصيل الكهربي لهذين المحلولين



تشاهد أن المصباح يضئ بشدة مع حمض الهيدروكلوريك ويضئ إضاءة خافتة مع حمض الخليك مما يدل على أن الأول يحتوى على وفرة من الأيونات بخلاف الثاني .

تجربة (٣) : اختبر تأثير تخفيف كلا المحلولين السابقين على توصيل التيار الكهربى (شدة إضاءة المصباح) وذلك بتخفيفهما إلى 0.00 mol/L - 0.01 mol/L ولاحظ ما يحدث . تلاحظ أن شدة إضاءة المصباح لا تتأثر بتخفيف حمض الهيدروكلوريك بينما تزداد بتخفيف حمض الخليك .

الاستنتاج : نستنتج من جملة التجارب السابقة :

أن المركبات التساهمية مثل غاز كلوريد الهيدروجين الجاف وحمض الخليك (الأسيتيك) النقى تتأين في وجود الماء ويكون تأين كلوريد الهيدروجين تأينا تامًا بينما تأين حمض الخليك (الاسيتيك) محدودًا جدًا، وهذا يعكس التوصيل الجيد لمحلول الحمض الأول للتيار الكهربي ويكون التوصيل الردئ لمحلول الحمض الثاني . ولذلك لا يتأثر تأين حمض الهيدروكلوريك بالتخفيف بينما يزداد تأين حمض الخليك بالتخفيف دلالة على وجود جزيئات من الحمض لم تتأين .

وعلى ضوء المشاهدات السابقة يمكن تمثيل تأين كلا من الحامضين كما يلى :

$$HC\ell_{(g)} \longrightarrow H^{+}_{(aq)} + C\ell^{-}_{(aq)}$$

$$CH_{3}COOH_{(aq)} \Longleftrightarrow CH_{3}COO^{-}_{(aq)} + H^{+}_{(aq)}$$

والجدول التالى يبين قيم ثابت التأين لبعض الأحماض الضعيفة . وترتب الأحماض الضعيفة تنازليا تبعا لتناقص قوتها بدلالة ثابت تأينها (Ka)

ثابت التأين (Ka)	الصيغة الجزيئية	اسم الحمض
1.7 x 10 <sup>-2</sup>	H <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	حمض الكبريتوز
6.7 x 10 <sup>-4</sup>	HF	حمض الهيدروفلوريك
5.1 x 10 <sup>-4</sup>	HNO <sub>2</sub>	حمض النيتروز
1.8 x 10 <sup>-5</sup>	СН3СООН	حمض الخليك (الأسيتيك)
4.4 x 10 <sup>-7</sup>	H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	حمض الكربونيك
5.8 x 10 <sup>-10</sup>	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	حمض البوريك

(الجدول للإطلاع فقط)





## ﴿أيون الهيدرونيوم : √

لا يوجد أيون الهيدروجين (البروتون) الناتج من تأين الأحماض في محاليلها المائية منفرداً ولكنه ينجذب إلى زوج الالكترونات الحر الموجود على ذرة أكسجين أحد جزيئات الماء ويرتبط مع جزئ الماء برابطة تناسقية ويعرف هذا البروتون بالبروتون المماه أو أيون الهيدرونيوم ويرمز له بالرمز +H<sub>3</sub>O .

$$HC_{(a)}^{\ell} + H_2O_{(\ell)} \longrightarrow H_3O_{(aq)}^{+} + C_{(aq)}^{\ell}$$

ويمكن بلورة المفاهيم السابقة كما يلى :

التأين : هو عملية تحول جزيئات غير متأينة إلى أيونات .

التأين التام : هو عملية تحول كل الجزيئات غير المتأينة إلى أيونات، و تحدث في الإلكترو ليتات القوية

التأين الضعيف : هو عملية تحول جزء ضئيل من الجزيئات غير المتأينة إلى أيونات ويحدث في الإلكترو ليتات الضعيفة. وتوجد في المحلول باستمرار حالتان متعاكستان هما تفكك الجزيئات إلى أيونات واتحاد الأيونات لتكوين جزيئات فتنشأ حالة اتزان بين الأيونات والجزيئات غير الفككة وبمكن تمثيل ذلك بالمعادلة

 $(\infty)$ 

أيونات حرة مادة إلكتر وليتية ضعيفة

ويعرف هذا النوع من الاتزان بالاتزان الأيوني :

الاتزان الأيونى: ينشأ هذا النوع من الاتزان في محاليل الالكتروليتات الضعيفة بين جزيئاتها و الأيونات الناتجة عنها.

ولا يمكن تطبيق قانون فعل الكتلة على محاليل الإلكتروليتات القوية لأن محاليلها تامة التأين. وقد تمكن «استفالد» عام 1988 من إيجاد العلاقة بين درجة التفكك أو التأين ألفا (△) والتركيز (C) mol/L لحاليل الإلكتروليتات الضعيفة.



### ✓ ! Ostwald التفائد Ostwald :

نفرض أن لدينا مو لا و احداً من حمضاً ضعيفاً أحادى البروتون صيغته الإفتراضية HA. عند إذا بته في الماء يتفكك عدد من جزيئاته تبعاً للمعادلة ،

وبتطبيق قانون فعل الكتلة على هذا النظام المتزن فإن :

$$Ka = \frac{[H^+] [A^-]}{[HA]}$$

حيث تمثل [H+] ، [A-] ، [H-] تركيزات كل من الأيونات الناتجة وجزيئات الحمض غير المتأينة عند حالة الاتزان Ka وهو ثابت تأين أو تفكك الحمض. فإذا افترضنا أن مولاً واحدًا من الحمض الضعيف (HA) قد أذيب في (V) لتر من المحلول فعند الاتزان تكون :

 $(1-\alpha)={
m HA}$  فإذا كانت عدد المولات المتفككة (  $\alpha$  ) مول يكون عدد المولات غير المتفككة من

. مول وعدد مو لات كل من +H و -A الناتجة  $\alpha$  مول

$$\frac{$$
 عدد المولات  $}{(V)} = \frac{}{(C)}$  الحجم باللتر  $}{(V)}$ 

تكون تركيزات المواد عند الاتزان بالمول لترهى:

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$$

$$\frac{(1-\alpha)}{V}$$
  $\frac{\alpha}{V}$   $\frac{\alpha}{V}$ 

وبالتعويض في معادلة قانون فعل الكتلة فإن :

$$Ka = \frac{\left[\frac{\alpha}{V}\right]\left[\frac{\alpha}{V}\right]}{\left[\frac{1-\alpha}{V}\right]} = \frac{\alpha^2}{V(1-\alpha)}$$





### क्षणिया क्षणिया

وتعرف هذه العلاقة بقانون استفالد للتخفيف وهو يبين العلاقة الكمية بين درجة التأين (a) ودرجة التخفيف ويتضح منها:

«أنه عند ثبوت درجة الحرارة فإن درجة التأين ( $\alpha$ ) تزداد بزيادة التخفيف»(لتظل قيمة Ka ثابتة)، وفي حالة الالكتروليتات الضعيفة فإن درجة التأين ( $\alpha$ ) تكون صغيرة بحيث يمكن إهمالها وعليه فإن القيمة ( $\alpha$ -1) يمكن اعتبارها تساوى الواحد تقريباً وتصبح العلاقة:

$$Ka = \frac{\alpha^2}{V}$$

mol/L  $\frac{1}{V} = (C_a)$  وحيث أن تركيز الحمض الضعيف الضعيف أن تركيز الحمض الضعيف فيمكن كتابة المعادلة السابقة على النحو التالى:

$$K = \alpha^2 \times C_a$$
  $\therefore \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C_a}}$ 

أى كلما زَّاد التخفيف (قل التركيز) زادت درجة التفكك والعكس صحيح.

مثال : احسب درجة التفكك في محلول  $0.1 \, \mathrm{mol/L}$  من حمض  $7.2 \times 10^{-10} = \mathrm{K_a}$  منابت تأین الحمض  $7.2 \times 10^{-10} = \mathrm{K_a}$  الهیدروسیانیک HCN عند  $25^{\circ}\mathrm{C}$  عند

الحل:

$$HCN_{\text{(aq)}}^{+} \ H_2O_{\text{(b)}}^{-} \longrightarrow \ H_3O_{\text{(aq)}}^{+} + \ CN_{\text{(aq)}}^{-}$$

بتطبيق قانون (استفالد)

$$Ka = \alpha^2 \times C_a$$

$$\therefore \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C_a}}$$

$$\therefore \alpha = \sqrt{\frac{7.2 \times 10^{-10}}{0.1}} = 8.5 \times 10^{-5}$$

#### حساب تركيز أيون الهيدرونيوم للأحماض الضعيفة:

عندما يتفكك حمض ضعيف مثل حمض الخليك (تركيزه  $(C_3)$ ) في الماء حسب المعادلة :  $CH_3COOH_{(aq)}^+ + H_2O = CH_3COO_{(aq)}^- + H_3O_{(aq)}^+$ 

$$=rac{[{
m CH_3COO^-}] \ [{
m H_3O^+}]}{[{
m CH_3COOH}]}={
m Ka}$$
 فإن ثابت التفكك لهذا التفاعل

ومن المعادلة السابقة فإن مقدار ما ينتج من أيونات الخلات -CH3COO يساوى مقدار ما ينتج من أيونات الهيدرونيوم +H3O :

$$[H_3O^+] = [CH_3COO^-]$$
 وبذلك فإن قيمة ثابت الاتزان  $[H_3O^+]^2$   $[H_3O^+]^2$ 

ونظرًا لأن الحمض ضعيف فإن ما يتفكك منه مقدار ضئيل (α) يمكن إهماله ومن ذلك فإن تركيز حمض الخليك الأصلى (C) وبالتعويض في قانون ثابت الاتزان (C) وبالتعويض في قانون ثابت الاتزان :

[CH<sub>3</sub>COOH]

$$Ka = \frac{[H_3O^+]^2}{C_a}$$
$$[H_3O^+] = \sqrt{C_a \times K_a}$$

مثال :

 $25^{\circ}\mathrm{C}$  عند  $0.1 \mathrm{mol/L}$  حمض خليك عند  $0.1 \mathrm{mol/L}$  علمًا بأن ثابت تأین الحمض  $1.8 \times 10^{-5}$  .



الحل:

$$[H_3O^+] = \sqrt{C_a \times K_a}$$

$$[H_3O^+] = \sqrt{(0.1 \times 1.8 \times 10^5)} = 1.342 \times 10^3 \text{ mol/L}$$

#### حساب تركيز أيون الهيدروكسيل للقواعد الضعيفة:

القواعد التى تتأين فى المحلول المائى جزئيًا تسمى قواعد ضعيفة ويمكن حساب تركيز أيون الهيدرونيوم السابق ذكرها وعلى سبيل المثال فإن النشادر من القواعد الضعيفة وعندما تذاب فى الماء يحدث التفاعل المتزن التالى:

$$NH_{3_{(g)}}^{+} + H_{2}O \rightleftharpoons NH_{4_{aq}}^{+} + OH_{(aq)}^{-}$$

$$K_{b} = \frac{[NH_{4}^{+}] \ [OH^{-}]}{[NH_{3}]} = 1.8 \times 10^{-5}$$

وتبين معادلة التأين السابقة تكوين مول واحد من كل من أيوني †NH<sub>4</sub> والهيدروكسيل.

$$K_b = \frac{[OH^-]^2}{[NH_3]}$$

ونظراً لأن ثابت تفكك النشادر صغير فإن جزءً اقليلاً جداً منه يتفكك وعند الاتزان فإن تركيز الامونيا المتبقية [NH3] يساوى تركيز الأمونيا الأصلية (Cb).

$$[OH] = \sqrt{C_b \times K_b} \qquad , \quad K_b = \frac{[OH^-]^2}{C_b} \qquad \qquad \label{eq:Kb}$$

الماء النقى الكتروليت ضعيف يوصل التيار الكهربى توصيلاً ضعيفًا ويعبر عن تأينه بالاتزان التالى:

$$2 H_2 O_{\text{(Aq)}} \rightleftharpoons H_3 O_{\text{(aq)}}^+ + OH_{\text{(aq)}}^-$$

وللتبسيط يمكن كتابة المعادلة السابقة كالتالى:

$$H_2Q_{\ell} \rightleftharpoons H_{(aq)}^+ + OH_{(aq)}^-$$

ويعبر عن ثابت الاتزان كما يلى:

$$K_W = \frac{[H^+] [OH^-]}{[H_2O]} = 10^{-14}$$

ونظرًا لأن مقدار ما يتأين من الماء لا يذكر كما يتضح من قيمة ثابت الاتزان فإن تركيز الماء غير المتأين يعتبر مقدارًا ثابتًا ومن ثم يؤول التعبير السابق إلى العلاقة التالية بعد إهمال تركيز الماء غير المتأين والذي يعتبر ثابت في ثابت الاتزان.

$$K_w = [H^+] [OH^-] = 10^{-14}$$

وحيث إن الماء النقى متعادل التأثير على عباد الشمس فيكون تركيز أيون الهيدروجين المسئول عن الحموضة مساويًا لتركيز أيون الهيدروكسيل المسئول عن القلوية ولذلك فإن:

$$K_w = [10^{-7}] [10^{-7}] = 10^{-14}$$

الحاصل الأيوني للماء (K<sub>w</sub>):

يعرف حاصل ضرب تركيزى أيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسيل الناتجين من تأين الماء بالحاصل الأيونى للماء ويساوى 1×10<sup>-14</sup> وهو مقدار ثابت فإذا زاد تركيز أيون الهيدروجين قل تركيز أيون الهيدروكسيل بنفس المقدار وإذا عرف تركيز أحد الأيونين أمكن معرفة تركيز الأخر.

الأس (الرقم) الهيدروجيني pH Value :

 $-\log [H^+] = \log [H_3O^+]$  هو اللوغاريتم السالب (للأساس 10) لتركيز أيون الهيدروجين أ $= -\log [H_3O^+]$ 

الحرف (p) يعنى (log)

وهو أسلوب للتعبير عن درجة الحموضة أو القاعدية للمحاليل المائية فإذا رجعنا لمعادلة الحاصل الأيوني للماء وبأخذ اللوغاريتم السالب لهذه المعادلة فإنها تصبح:

$$-\log K_w = (-\log [H^*]) + (-\log [OH^*]) = -\log 10^{-14}$$





### ক্রথন্য ক্রথকা

وباستبدال القيمة (log -) بالحرف (p) فإن المعادلة تصبح:

$$pK_w = pH + pOH = 14$$

فالمحلول المتعادل يكون قيمة الرقم الهيدروجينى له pH=7 وقيم الرقم الهيدروكسيلى pOH=7 له pOH=7 و المحلول ذو الرقم الهيدروجينى pH=9 مثلا يكون الرقم الهيدروكسيلى له pOH=9 والمحلول ذو الرقم الهيدروجينى pH=9 يكون الرقم الهيدروكسيلى له pOH=9 والمحلول ذو الرقم الهيدروجينى pOH=9 والمحلول أما المحاليل الحامضية يكون قيمة الرقم الهيدروجينى لها pH<7 والرقم الهيدروكسيلى لها pOH>7 أما المحاليل القاعدية يكون قيمة الرقم الهيدروجينى pOH=9 والرقم الهيدروكسيلى pOH>7



ويبين الجدول التالي الرقم الهيدروجيني لبعض المحاليل:

المادة	الرقم الهيدروجيني	
حلول lmol/L حمض هيدروكلوريك	Zero	
حلول 0.1mol/L حمض هيدروكلوريك	1	
لعصير المعدى	1.8 - 1.6	
مصير الليمون	2.3	
لخل	2.9	
مصير البرتقال	3.5	
عصير العنب	4.0	
عصير الطماطم	4.2	
لقهوة	5.0	
اء المطر	6.2	
للبن	6.6 - 6.3	
لبول	7 - 5.5	
لماء النقى	7	
للعاب	7.4 - 6.2	
لدم	7.45 - 7.35	
اء البحر	8.4	
لعصارة المرارية	8.6 - 7.8	
ستحلب المانيزيا	10.5	
حلول 0.1mol/L من الأمونيا	11.0	
سودا الغسيل	12.0	
حلول 0.1mol/L هيدروكسيد صوديوم	13.0	
حلول lmol/L هيدركسيد صوديوم	14.0	







#### < ثالثاً: التحلل المائي للأملاح (التميؤ) Hydrolysis :

تجربة : أحضر أربع أنابيب اختبار وضع في الأولى محلول كربونات الصوديوم وفي الثانية محلول كلوريد الامونيوم وفي الثائثة محلول اسيتات (خلات) الأمونيوم وفي الرابعة محلول كلوريد الصوديوم واكشف عن المحاليل الأربعة بورق عباد الشمس وتأكد من صحة البيانات الموضحة في الجدول التالي.

تجسربسة	المشاهدة	الاستنتاج
۱- تأثير محلول Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	تزرق ورقة عباد الشمس	المحلول قاعدى
۲- تائير محلول NH <sub>4</sub> Cl	تحمر ورقة عباد الشمس	المحلول حمضى
۳- تأثير محلول CH <sub>3</sub> COONH <sub>4</sub>	لا تتاثر	المحلول متعادل
٤- تأثير محلول NaCl	لا تتاثر	المحلول متعادل

ويمكن تفسير نتائج الجدول السابق كما يلي ،

۱- التحلل المائى لملح كربونات الصوديوم (ملح مشتق من حمض ضعيف مع قاعدة قوية) :
 يتأين الماء كالكتروليت ضعيف ليعطى أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيل
 وعند إذابة كربونات الصوديوم فإنها تتفكك إلى أيونات صوديوم وأيونات كربونات :

$$\begin{array}{c} 2 \text{ H}_{2}\text{Q}_{\ell} > \Longrightarrow 2\text{H}_{(aq)}^{+} + 2\text{OH}_{(aq)}^{-} \\ \text{Na}_{2}\text{CO}_{3(s)} > \Longrightarrow \text{CO}_{3}^{2-} + 2\text{Na}_{(aq)}^{+} \\ \text{Na}_{2}\text{CO}_{3(s)}^{+} 2 \text{ H}_{2}\text{Q}_{\ell} > \Longrightarrow \text{H}_{2}\text{CO}_{3}^{+} + 2 \text{ Na}_{(aq)}^{+} + 2\text{OH}_{(aq)}^{-} \end{array}$$

ويلاحظ من التفاعل تكون حمض الكربونيك وأيونات كل من الصوديوم والهيدروكسيل ويرجع عدم تكوين هيدروكسيد الصوديوم إلى أنه الكتروليت قوى والمعروف أن الالكتروليتات القوية تكون تامة التأين ، أما تكون حمض الكربونيك فيعزى إلى اتحاد





أيونات الهيدروجين الناتجة من تأين الماء مع أيونات الكربونات في المحلول وتعطى حمض الكربونيك ضعيف التأين ، وينشأ عن ذلك سحب مستمر لأيونات الهيدروجين من اتزان تأين الماء فيختل الاتزان ، ولكي يسترجع ثانية فإنه تبعًا لقاعدة لوشاتلييه تتأين جزيئات أخرى من الماء لتعوض النقص في تركيز أيونات الهيدروجين الأمر الذي يترتب عليه تراكم أو زيادة تركيز أيونات الهيدروكسيل ويصبح تركيزها أكبر من تركيز أيونات الهيدروجين وعلى ذلك يكون الرقم الهيدروجيني 7 < PH ويكون محلول كربونات الصوديوم قلويا .

٢- التحلل المائي لملح كلوريد الأمونيوم (ملح مشتق من حمض قوى مع قاعدة ضعيفة):
 يمكن تمثيل ذوبان كلوريد الأمونيوم في الماء بالمعادلات التالية:

$$\begin{array}{c|c} H_2O_{(\ell)} & \longrightarrow & H_{(aq)}^+ OH_{(aq)}^- \\ \hline NH_4C_{(s)}^{\ell} & \longrightarrow & C\ell_{(aq)}^+ NH_{4(aq)}^+ \\ \hline NH_4C_{(s)}^{\ell} + H_2O_{(\ell)} & \longrightarrow & H_{(aq)}^+ C\ell_{(aq)}^- + NH_4O_{4aq}^+ \end{array}$$

يتضح من التفاعل أنه ينتج من ذوبان كلوريد الأمونيوم في الماء أيونات الهيدروجين وأيونات الكلوريد وهيدروكسيد الأمونيوم. ولا يتكون حمض الهيدروكلوريك لأنه الكتروليت قوى فيكون تام التأين  $(C^{\ell}, H^+)$  أى أن وجود أيونات الكلوريد لا تؤثر في اتزان الماء أما أيونات الأمونيوم فهي تتفاعل مع أيونات الهيدروكسيل الناتجة من تأين الماء لتعطى هيدروكسيد الأمونيوم وهو الكتروليت ضعيف التأين ونتيجة لسحب أيونات الهيدروكسيل من اتزان تأين الماء يختل الاتزان ، ولكي يسترجع ثانية فإنه تبعًا لقاعدة لوشاتلييه تتأين جزيئات أخرى من الماء لتعوض النقص في أيونات الهيدروكسيل ، وبذلك لتراكم أيونات الهيدروكسيل وبدلك تتراكم أيونات الهيدروكسيل وبدلك وبصبح تركيزها أكبر من تركيز أيونات الهيدروكسيل وبذلك يصبح المحلول حامضيًا.

٣- التحلل المائى لملح أسيتات (خلات) الأمونيوم (ملح مشتق من حمض ضعيف مع قاعدة ضعيفة):
 يمكن تمثيل ذوبان أسيتات الأمونيوم في الماء بالمعادلات الأتية:

$$\begin{array}{c|c} H_2Q & \longrightarrow & H_{(aq)}^+ + OH_{(aq)}^- \\ \hline CH_3COONH_{4_{(s)}} & \longrightarrow & CH_3COOH_{(aq)}^+ + NH_{4_{(aq)}}^+ \\ \hline CH_3COONH_{4_{(s)}} + H_2Q & \longrightarrow & CH_3COOH_{(aq)}^+ + NH_4OH_{(aq)}^+ \\ \hline \end{array}$$

وفى هذه الحالة يتكون حمض الخليك وهيدروكسيد الأمونيوم وكلاهما الكتروليت ضعيف مما يعنى أن تركيز أيونات الهيدروجين القليل الناتج من تأين الحمض الضعيف يكافئ تركيز أيونات الهيدروكسيل القليل الناتج من تأين القلوى الضعيف فيكون المحلول متعادلاً.

١٠- التحلل الماني لملح كلوريد الصوديوم (ملح مشتق من حمض قوى مع قاعدة قوية) :
 يمكن تمثيل ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء بالمعادلات الأتية :

وفى هذه الحالة لا يتكون حمض الهيدروكلوريك القوى والتام التأين وهيدروكسيد الصوديوم القلوى القوى والتام التأين ، لذا تبقى أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيل الناتجين من تأين الماء كما هي ويكون المحلول متعادلاً.

مما سبق يمكن أن نستنتج أن التميؤ هو عكس التعادل فعند ذوبان الملح في الماء ينتج الحمض والقلوى المشتق منهما الملح وتعتمد الخاصية الحامضية والقاعدية لمحلول الملح على قوة كل من الحمض والقلوى الناتجين من ذوبان الملح في الماء .

ثكل ملح صلب حد معين للنوبان في الماء عند درجة حرارة معينة، وعند الوصول إلى هذا الحد تصبح المادة المذابة في حالة اتزان ديناميكي مع المادة غير المذابة، ويوصف المحلول حينئذ بالمحلول المشبع.

ومدى ذوبانية الأملاح الصلبة في الماء واسع جداً، فنوبانية نيترات البوتاسيوم  $\mathrm{KNO}_3$  في الماء ومدى ذوبانية الأملاح الصلبة في الماء واسع جداً، فنوبانية كلوريد الفضة  $\mathrm{AgC}\ell$  في الماء عند نفس المدرجة تساوى  $\mathrm{AgC}\ell$ 





### क्षणिया क्षणिया

تساوى 0.0016g/100g ويُعرف تركيز المحلول المشبع من الملح شحيح النوبان عند درجة حرارة معينة بدرجة النوبان

فإذا أخذت كمية من بروميد الرصاص Pb Br<sub>2</sub>II ورُجت في الماء، فإن كمية ضئيلة جدا سوف تذوب ويتأين جزء منها وفقاً للمعادلة الأتية ،

$${
m PbBr}_{2_{(aq)}}$$
  $\Longrightarrow$   ${
m Pb}^{2+}_{(aq)}$  +  $2{
m Br}^-_{(aq)}$  . گم یطبق علیها قانون فعل الکتله

فإن ثابت الاتزان :

$$K_{sp} = \frac{[Pb^{2+}][Br^{-}]^{2}}{[PbBr_{2}]}$$

وحيث أن تركيز PbBr<sub>2</sub> الصلب يظل ثابتًا تقريبًا فإن :

$$K_{sp} = [Pb^{2+}] [Br^{-}]^{2}$$

يعرف K<sub>sp</sub> بعاصل الإذابة Solubility product وحاصل الإذابة لأى مركب أيونى شعيح الذوبان هوحاصل ضرب تركيز أيوناته مقدرة بالمول/لتر مرفوع كل منها لأس يساوى عدد مولات الأيونات والتى توجد فى حالة اتزان مع محلولها المشبع.

مثال: احسب قيمة حاصل الإذابة لملح كبريتات الفضة Ag<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> علما بأن درجة نوبانه في الماء عند درجة حرارة معينة يساوي

الحل :

$$K_{sp} = [Ag+]^2 [SO^2]$$

$$K_{sp} = [2 x1.4 x 10^2]^2 [1.4 x 10^2] = 1.0976 x 10^5$$

# (السؤال الأول:) عرف ما بأتي:

١- الاتزان الكيميائي. ٢- ضغط بخار الماء المشبع في الجو.

> ٤- التفاعلات الانعكاسية . ٣- التفاعلات التامة .

> > ٦- العامل الحفاز. ٥- معدل التفاعل .

٨- قاعدة لوشاتلييه. ٧- قانون فعل الكتلة .

١٠- الحاصل الأيوني للماء . ٩- حاصل الإذابة .

> ١١- الأس الهيدروجيني ١٢- قانون استفالد .

#### (السؤال الثاني ا

ضع حرف (ع) أمام التفاعلات الانعكاسية وحرف (م) أمام التفاعلات التامة:

$$NaOH + HCl(aq.) = NaCl(aq.) + H2O(aq.) -i$$

$$2AgNO_{3(aq.)} + BaCl_{2(aq.)} = 2AgCl_{(s)} + Ba(NO_3)_{2(aq.)}$$
 --

$$2Cu(NO_3)_{2(s)} = 2CuO_{(s)} + 4NO_{2(g)} + O_{2(g)}$$
 ---

$$CO_{(g)} + H_2O_{(g)} = CO_{2(g)} + H_{2(g)}$$
 في إناء مغلق

### (السؤال الثالث ع

اكتب فيما يلي:

أ- معدل التفاعل الكيميائي والعوامل التي تؤثر عليه .

ب- التفاعل المتزن والعوامل التي تؤثر عليه .

#### السؤال الرابع:

كيف يؤثر كل تغير من التغيرات الآتية على تركيز الهيدروجين في النظام المتزن التالي؛

$$H_{2(g)} + CO_{2(g)}$$
  $\longrightarrow$   $H_2O_{(g)} + CO_{(g)}$ ,  $\Delta H = 41.1 \text{ KJ}$ 

أ- إضافة المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون .

ب- إضافة المزيد من بخار الماء .

ج- إضافة عامل حفاز .



# ক্রপন্ম প্রকর্মন

- د- زيادة درجة الحرارة .
- ه- تقليل حجم الوعاء .

#### (السؤال الخامس :)

في أي من التفاعلات الأتية تتوقع زيادة نسبة التفكك مع زيادة درجة الحرارة :

NO (g) 
$$\longrightarrow$$
 1/2 N<sub>2</sub> (g) + 1/2 O<sub>2(g)</sub>;  $\triangle$ H = (-)

$$SO_{3(g)} \longrightarrow SO_{2(g)} + 1/2 O_{2(g)}$$
;  $\Delta H = (+)$ 

$$N_2H_{4(g)} \longrightarrow N_{2(g)} + 2H_{2(g)}$$
;  $\Delta H = (-)$ 

#### (السؤال السادس:

ما المحاليل الحمضية والقاعدية والمتعادلة فيما يلي:

- i محلول pH له = 3.5
- ب- محلول pH له = 7.0 .
- ج- محلول pH له = 4.0
- د- محلول pH له = 12.0 .

. (.....)

#### السؤال السابع:

أكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات الأتية :

وتكون المواد المتضاعلة	أ- التفاعلات التي تسير في كلا الاتجاهين الطردي والعكسي
. (	والناتجة من التفاعل موجودة باستمرار في حيز التفاعل (
. (	ب- مقدار التغير في تركيز المواد المتفاعلة في وحدة الزمن (.
تناسبا طرديا مع حاصل	ج- عند ثبوت درجة الحرارة تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي
- (	ضرب التركيزات الجزيئية لمواد التفاعل (
لة اتزان مثل الضغط أو	د- إذا حدث تغير في أحد العوامل المؤثرة على نظام في حا
قلل أو يلغى هذا التغير	التركيز أو درجة الحرارة فإن النظام ينشط في الاتجاه الذي ي



السؤال الثامن : اذكر تجربة عملية لإثبات :

أ- تأثير التركيز على معدل التفاعل.

ب- تأثير درجة الحرارة على سرعة تفاعل متزن.

السؤال التاسع: احسب قيمة ثابت الاتزان للتفاعل:

 $N_2O_4(g) \Longrightarrow 2 NO_2(g)$ 

.  $0.213 mol/L = [NO_2]$  ،  $0.213 mol/L = [N_2O_4]$  عندما تكون التركيزات عند الاتزان

#### (السؤال العاشر:)

ما نسبة تأين محلول £0.13mol من حمض الخليك .

(ثابت تأين حمض الخليك 1.8x10-5) .

#### (السؤال الحادي عشر:)

أى المواد الآتية تكون محاليلها المائية حامضية أو قاعدية أو متعادلة :

 $(NH_4)_2 CO_3$  , KCl ,  $NH_4NO_3$  , FeCl<sub>3</sub>

# (السؤال الثاني عشر:

اكتب معادلة ثابت الاتزان (Kc) للتفاعلات الأتية :

$$CO(g) + H_2O(g)$$
  $\subset$   $CO_2(g) + H_2(g)$ 

$$4 \text{ NH}_3 (g) + 3 \text{ O}_2 (g) = 2 \text{ N}_2 (g) + 6 \text{ H}_2 \text{O} (g)$$

#### (السؤال الثالث عشر:)

إذا كانت درجة تأين حمض عضوى ضعيف أحادى البروتون تساوى 3% في محلول تركيزه

. احسب ثابت التأين (Ka) لهذا الحمض . 0.2 mol/L

#### (السؤال الرابع عشر:)

للتفاعل الأتي قيمتان لثابت الاتزان عند درجتي حرارة مختلفتين :

$$H_{2 (g)} + I_{2} (g)$$
  $\rightleftharpoons$  2 HI (g) Kc = 50 at 448°C

هل التفاعل طارد أم ماص للحرارة؟ مع تفسير إجابتك



# ক্রান্স ক্রিঅন্স

التفاعل طارد أم ماص للحرارة؟ مع تفسير إجابتك

# (السؤال الخامس عشر)

إذا علم أن قيمة الحاصل الأيونى للماء  $1 \times 10^{-11}$  عند  $10^{-12}$  املء الفراغات في الجدول الأتي عند هذه الدرجة :


pOH	pН	[OH-]	[H+]
			1 x 10 <sup>-11</sup>
		1 x 10 <sup>-5</sup>	
	6		
12		********	

# (السؤال السادس عشر)

احسب [ $Ba^{2+}$ ] في المحلول المشبع من كبريتات الباريوم  $BaSO_4$  ، علماً بأن حاصل إذابته .  $K_m=1.1 \times 10^{-10}$ 

## السؤال السابع عشر

إذا كانت درجة ذوبان كلوريد الفضة AgCl هي AgCl . احسب قيمة حاصل الإذابة .





# الأهداف

#### في نهاية دراسة الطالب لباب الكيمياء الكهربية ينبغي أن يكون قادرا على أن:

- يفسر التفاعلات التي تحدث في الخلية الجلفانية ودور القنطرة الملحية.
- يبين المقصود بقطب الهيدروجين القياسي واستخدامه في قياس جهود الأقطاب القياسية.
  - يحسب القوة الدافعة الكهربية للخلية الجلفانية.
    - يكتب الرمز الاصطلاحي للخلية الجلفانية.
      - يقيس علميا جهود بعض الأقطاب.
    - يتعرف أنواع مختلفة من الخلايا الجلفانية.
    - يبين كيفية وقاية الحديد من الصدأ والتآكل.
      - يحقق قانوذا فاراداي عمليا.
  - يحسب كمية المادة المترسبة باستخدام قوانين فاراداي.
  - يوضح نواتج التحليل الكهربي لمحاليل ومصاهير الأملاح.
  - يكتب التفاعلات التي تحدث عند الأقطاب في الخلايا الإلكتروليتية.
    - يميز بين الخلايا الجلفانية والخلايا الإلكتروليتية.
      - يتعرف على تطبيقات الخلايا الإلكتروليتية.
    - يفسر التفاعلات التي تحدث أثناء تآكل المعادن وعلى رأسها الحديد.
      - يقدر دور الكيمياء الكهربية في خدمة الإنسان.
        - يقدر دور العلماء في تقدم الكيمياء الكهربية.







تعتبر الطاقة الكهربية أهم أنواع صور الطاقة وأكثرها صداقة للبيئة، ويهتم علم الكيمياء الكهربية بدراسة التحول المتبادل بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربية من خلال تفاعلات الأكسدة والاختزال وهي التفاعلات التي تنتقل فيها الإلكترونات من أحد المواد المتفاعلة إلى المادة الأخرى الداخلة معها في تفاعل كيميائي، والتجربة التالية تبين أحد تفاعلات الأكسدة اختزال.

#### تجربة:

- أغمس صفيحة من الخارصين في محلول كبريتات النحاس «الزرقاء اللون» كما بالشكل (٤-١أ). سوف تلاحظ أن فلز النحاس بدأ يترسب على سطح صفيحة الخارصين بينما بدأ فلز الخارصين في اللغوبان في المحلول كما بالشكل (٤-١ب).
- وإذا استمر ذلك لفترة طويلة سوف تلاحظ أن لون محلول كبريتات النحاس الأزرق قد قل وربما أصبح عديم اللون ويزداد ذوبان الخارصين.



إن ما حدث هو تفاعل أكسدة و اختزال تلقائي يمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية:







# इन्स्य इन्स्य

ويالحظ أن هذا التفاعل يتكون من نصفى تفاعل:

$$Zn_{(S)}^{\circ} \longrightarrow Zn_{(aq)}^{2+} + 2\overline{e}$$

فيه تفقد كل ذرة خارصين (Zn) الكترونين وتتحول إلى أيون خارصين  $(Zn^2+1)$  الذى يترك سطح صفيحة الخارصين وينوب وينتشر في المحلول.

$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2\bar{e} \longrightarrow Cu^{\circ}_{(s)}$$
 عناعل اختزال:


وفيه يكتسب كل أيون نحاس  $(Cu^{2+})$  في المحلول الكترونين (القادمين من نصف تفاعل الخارصين) ويتحول إلى فلز النحاس (Cu) الذي يترسب على سطح صفيحة الخارصين.

وقد نجح العلماء في ترتيب نظام يعرف بالخلايا الجلفانية والتي روعي فيها فصل مكونات نصفى الخلية الخلية مع اتصالهما عن طريق قنطرة ملحية والسماح للإلكترونات أن تمر في سلك بين نصفى الخلية وبذلك يمكن الحصول على تيار كهربي ناتج من تفاعل الأكسدة والاختزال التلقائي الذي يحدث في الخلية الجلفانية.


وهناك نوع آخر من الخلايا الكهربية تستخدم فيها طاقة كهربية من مصدر خارجى (بطارية جافة) لإحداث تفاعلات أكسدة واختزال (غير تلقائية) - ويعرف هذا النوع بالخلايا الإلكترو ليتية Electrolysis Cells أو خلايا التحليل الكهربي Electrolysis Cells.

# ≺ أولاً: الخلايا الجلفانية Galvanic cells

وهى نوع من الخلايا الكهربية التى يمكن الحصول منها على تيار كهربى نتيجة حدوث تفاعد أكسدة - اختزال تلقائى - ومن أمثلتها خلية (دانيال) كالمبنية بشكل (٢-٤):



شكل (٤-٢ب)



شكل (٤-١١)

وتتكون هذه الخلية من لوح من فلز النحاس (قطب النحاس) وآخر من فلز الخارصين (قطب النحاس) وآخر من فلز الخارصين (قطب الخارصين) كل منهما مغمور في محلول أحد أملاحه وذلك في إنائين منفصلين ويوصل بين المحلولين بقنطرة ملحية وكل إناء بما فيه يعرف بنصف خلية - ويعرف لوح النحاس في هذه الخلية بالمهبط أو الكاثود (Cathode) وهو القطب الموجب في الخلية بينما يعرف لوح الخارصين بالمصعد أو الأنود (Anode) وهو القطب السائب في الخلية - أما المحلول الموجود في كل نصف خلية فيعرف بالإلكترونيت Electrolyte.

وعند توصيل قطبى الخلية بسلك معدنى موصل يحدث مرور تيار كهربي. ويمكن توضيح تفاعل الأكسدة - الاختزال الحادث في هذه الخلية فيما يلي:

#### أ- عند الأنود (Anode):

ب- عند الكاثود (Cathode)

$$Cu_{(aq)}^{2+} + 2\overline{e} \longrightarrow Cu_{(s)}^{\circ} \downarrow$$
 (اختزال)

ويكون التفاعل الكلى الحادث في الخلية (شكل ٢-٢) هو مجموع تفاعلي نصفي الخلية.

ويتوقف مرور التيار الكهربى بين نصفى الخلية عندما ينوب كل فلز الخارصين فى نصف خلية الخارصين فى نصف خلية الخارصين - أو تنضب أيونات النحاس بسبب ترسبها على هيئة ذرات نحاس (Cu°) فى نصف خلية النحاس.

وقد اتفق على تمثيل الخلية الجلفانية لأى عنصرين برمز اصطلاحي كالمبين بالمثال التالي،

$$Zn^{\circ}$$
  $\begin{vmatrix} Zn^{2+} \\ (xM) \end{vmatrix}$   $\begin{vmatrix} Cu^{2+} \\ (xM) \end{vmatrix}$   $\begin{vmatrix} Cu^{\circ} \\ Cu^{\circ} \end{vmatrix}$ 

حيث يمثل الخط الرأسى المفرد الحد الفاصل بين قطب العنصر والمحلول الإلكتروليتي الأيوناته بينما الخط الرأسي المزدوج فيمثل الحد الفاصل بين المحلولين في نصفى الخلية (أو القنطرة الملحية).



# इयम्म इरिव्यक्त

يالحظ أن عملية الأكسدة تحدث دائما عند المصعد (الأنود) بينما عملية الاختزال تحدث عند المهبط (الكاثود) في الخاليا الكهربية بأنواعها.

#### ما القنطرة الملحية Salt bridge؛ وما أهميتها في الخلايا الجلفانية؟


القنطرة الملحية في الخلايا الجلفانية (مثل خلية دانيال) عبارة عن أنبوبة زجاجية على هيئة حرف  ${\rm U}$  تملأ بمحلول إلكترو ليتى (مثل كبريتات الصوديوم  ${\rm Na_2SO_4}$ ) لا تتفاعل أيوناته مع أيونات محاليل نصفى الخلية و لا مع مواد أقطاب الخلية الجلفانية وتقوم القنطرة الملحية بالتوصيل بين محلولي نصفى الخلية بطريقة غير مباشرة كما تقوم بمعادلة الأيونات الموجبة والسائبة الزائدة التي تتكون في محلولي نصفى الخلية نتيجة تفاعل الأكسدة والاختزال في نصف خلية الخارصين ونصف خلية النحاس على التوالي وغياب القنطرة الملحية في الخلية الجلفانية يؤدي إلى توقف تفاعل الأكسدة والاختزال وبالثالي يتوقف مرور التيار الكهربي في السلك الخارجي الموصل بين نصفى الخلية .



# Electrode Potentials حقياس جهود الأقطاب

لا توجد طريقة مؤكدة ومباشرة لقياس الفرق المطلق في الجهد الكهربي بين قطب فلز ومحلول أيوناته في الخلية الجلفانية في حين أن الفرق بين جهدى قطبى الخلية الجلفانية يمكن قياسه بسهولة. وذلك عن طريق تكوين خلية جلفانية من قطبين أحدهما القطب المراد قياس جهده والأخر قطب قياسي ذو جهد ثابت ومعلوم - ثم قياس القوة الدافعة الكهربية للخلية (جهد الخلية) ومنها يمكن حساب جهد القطب غير المعلوم.

وقد اتفق العلماء على استخدام قطب الهيدروجين القياسى كقطب قياسى يمكن أن تقاس جهود أقطاب العناصر الأخرى بمعلومية جهده الذى يساوى



شكل (٤-٣) قطب الهيدروجين القياسي.

ویتکون قطب الهیدروجین القیاسی کما هو مبین بالشکل (۴-۳) من صفیحة من البلاتین (1cm²) من صفیحة من البلاتین الأسود یمرر مغطاة بطبقة أسفنجیة من البلاتین الأسود یمرر علیها تیار من غاز الهیدروجین تحت ضغط ثابت مقداره واحد ضغط جوی ومغمور فی محلول واحد مولار (1mol/L) من أی حمض قوی - ویسمی قطب الهیدروجین تحت هذه الظروف بقطب الهیدروجین القیاسی (SHE) وجهده = Zero و بالطبع یتغیر القیاسی (SHE) وجهده = شکل (الهیدروجین فی المحلول أو بتغیر الضغط الجزئی للغاز أو کالاهما.

صفر.

ويرمز تنصف خلية الهيدروجين القياسية بالرمز الاصطلاحي) Pt- H,(1atm)/2H (1mol/L).



# The electromotive series :سلسلة الجهود الكهربية للعناصر

تمكن العلماء من قياس الجهود القطبية القياسية (E°) لأنصاف الخلايا لجميع العناصر الفلزية واللافلزية مقاسة بالنسبة لجهد قطب الهيدروجين القياسي.


وإذا ما رتبت هذه الجهود القياسية ترتيبا تنازليا بالنسبة لجهود الاختزال السالبة وتصاعديا بالنسبة لجهود الاختزال الموجبة بحيث تكون أكبر القيم السالبة في أعلى السلسلة وأكبر القيم الموجبة في أسفلها تحصل بذلك على ما يعرف بسلسلة الجهود الكهربية للعناصر. وتوضح سلسلة الجهود الكهربية للعناصر الحقائق التالية:

أ- العناصر ذات الجهود الأكثر سالبية والتى تقع عند قمة السلسلة تعتبر عوامل مختزلة قوية - وهى الفلزات التى تتأكسد بسهولة أى أنها تفقد إلكتروناتها بسهولة عندما تدخل فى تفاعل مع أيونات أى عنصر يحتل مكانة أدنى فى سلسلة الجهود الكهربية.

ب- العناصر ذات الجهود الأكثر إيجابية والتى تقع عند النهاية السفلى للسلسلة تعتبر الصورة المتأكسدة لها (أى عندما تكون الفلزات على هيئة أيونات وتكون اللافلزات فى حالتها العنصرية) عوامل مؤكسدة قوية مثل جزيئات غاز الفلور (F2). بمعنى أنها ذات قدرة أكبر على إكتساب الالكترونات عندما تدخل فى تفاعل مع أى عنصر يحتل مكانه أعلى في سلسلة الجهود الكهربية.

ج- العناصر المتقدمة في السلسلة تحل محل العناصر التي تليها في محاليل أملاحها - وكلما زاد البعد في الترتيب بين عنصرين زادت قدرة العنصر المتقدم (ذو الجهد الأكثر سالبية أو الأقل إيجابية) على طرد العنصر المتأخر (ذو الجهد الأقل سالبية أو الأكثر إيجابية) من مركباته.

د- جميع العناصر التى تقع فوق الهيدروجين فى سلسلة الجهود الكهربية تحل محل أيونات الهيدروجين فى المحاليل الحامضية (أى يتصاعد الهيدروجين)
مثال ذلك تفاعل عنصر الحديد مع حمض الهيدروكلوريك.





وكلما زادت القيمة السالبة للجهد زاد الميل نحو الإحلال محل أيونات الهيدروجين. أما العناصر ذات الجهود الموجبة أى التى تقع تحت الهيدروجين فى سلسلة الجهود الكهربية فلا يمكن لها أن تحل محل أيونات الهيدروجين فى محاليله.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجهد القياسى لنصف خلية أى عنصر يأخذ إشارة سالبة أوموجبة ، فإذا كان التفاعل فى نصف خلية الخارصين مثلا عبارة عن عملية اختزال فإن الجهد هنا يعرف بجهد الاختزال القياسى(E)

وجهد الاختزال (E°) لنصف خلية الخارصين بالنسبة لجهد الهيدروجين القياسي 0.76V وجهد الاختزال (E°) لنصف خلية الخارصين بالنسبة لجهد التأكسد لهذا العنصر يكون ذو إشارة مخالفة حيث يمثل هنا عملية أكسدة.

$$Zn^{\circ} \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}$$
  $E^{\circ} = +0.76 \text{ V}$ 

وعلى ذلك فإنه يمكن أيضا ترتيب العناصر في سلسلة الجهود الكهربية تبعا لجهود الأكسدة القياسية تنازليا بالنسبة للجهود الموجبة وتصاعديا بالنسبة للجهود السالبة - كما هو مبين بالجدول صفحة ٨٢

ويمكن حساب القوة الدافعة الكهربية لأى خلية جلفانية وذلك باستخدام جهد الاختزال أو جهد الأكسدة لنصفى الخلية أو كلاهما معا بحيث يكون لجهد الخلية الجلفائية قيمة موجبة دائما.

فجهد الاختزال القياسي لنصف خلية النحاس = 0.34V +

وجهد الأكسدة القياسي لنصف خلية النحاس = 0.34V -

أما جهد الاختزال القياسي لنصف خلية الخارصين = 0.76V -

بينما يكون جهد الأكسدة القياسي لنصف خلية الخارصين = 0.76V +

والقوة الدافعة الكهربية للخلية الجلفانية emf = فرق جهدى الاختزال لنصفى الخلية

emf or  $E_{cell} = 0.34 - (-0.76) = 1.1V$ 

emf = فرق جهدى الأكسدة لنصفى الخلية





# **spren** sragan

 $emf~or~E_{cell} = 0.76 - (-0.34) = 1.1 V$  مجموع جهدى الأكسدة والاختزال لنصفى الخلية  $emf~or~E_{cell} = 0.76 + 0.34 = 1.1 V$ 

(الحدول للاطلاء فقط)

سلسلة الجهود الكهروكيميائية للعناصر:

نصف الخلية (نصف التفاعل			جهد التأكسد القياسي (فولت)	جهد الاختزال القياسي (فولت)
Li	ح أكسدة ح	Li <sup>+</sup> + e	+ 3.045	- 3.045
K	اختزال ح	K++ e	+ 2.924	- 2.924
Na	06	Na++ e	+ 2.711	- 2.711
Mg	<b>∡</b> ≥	$Mg^{2+} + 2e^{-}$	+ 2.375	- 2.375
Al	<b>¥</b> ::::≥	Al <sup>3+</sup> +3e	+ 1.670	- 1.670
Mn	<b>¥</b> :::::≥	$Mn^{2+}+2e^{-}$	+ 1.029	- 1.029
Zn	<b>¥</b> ::::≥	$Zn^{2+}+2e^{-}$	+ 0.762	- 0.762
Cr	<b>¥</b> ::::≥	Cr <sup>3+</sup> +3e	+ 0.740	- 0.740
Cr	<b>¥</b> ::::≥	$Cr^{2+}+2e^{-}$	+ 0.557	- 0.557
Cr <sup>2+</sup>	<b>¥</b> ::::≥	$Cr^{3+}+e^{-}$	+ 0.410	- 0.410
Fe	<b>₩</b> ::::≥	Fe <sup>2+</sup> +2e	+ 0.409	- 0.409
Cd	<b>₩</b> ::::≥	$Cd^{2+}+2e^{-}$	+ 0.402	- 0.402
Co	<b>₩::::</b>	$Co^{2+}+2e^{-}$	+ 0.280	- 0.280
Ni	<b>∀</b> ::::≥	$Ni^{2+}+2e^{-}$	+ 0.230	- 0.230-
Pb	<b>¥</b> ::::≥	Pb <sup>2+</sup> +2e	+ 0.126	- 0,126
H <sub>2</sub>	¥::::3	2H <sup>+</sup> +2e	Zero	Zero
Sn <sup>2+</sup>	<b>₩</b> ::::>	$Sn^{4+}+2e^{-}$	- 0.150	+ 0.150
Cu	******	$Cu^{2+}+2e^{-}$	- 0.340	+ 0.340
40H	******	2H <sub>2</sub> O+O <sub>2</sub> +4e	- 0.401	+ 0.401
Ag	<b>₩</b>	$Ag^{+}+e^{-}$	- 0.800	+ 0.800
pt	<b>¥</b> ::::≥	Pt <sup>2+</sup> +2e	- 1.200	+ 1.200
Au	<b>₩</b>	$- Au^{3+}+3e^{-}$	- 1.420	+ 1.420
2F	<b>2</b> ::::≥	$F_2 + 2\bar{e}$	- 2.87	+ 2.87

# ✓الخلايا الجلفانية وأنتاج الطاقة الكهربائية :>

تقسم الخلايا الجلفانية تبعا لطبيعة عملها لإنتاج الطاقة الكهربائية إلى:

2 - خلایا ثانویه Secondary cells

1 -خادیا أو لید Primary cells

وجميعها أنظمة تنتج الطاقة الكهربية من خلال ما يحدث فيها من تفاعلات أكسدة - اختزال تلقائي.

# الخلايا الأولية: Primary cells

وهى أنظمة تخزن الطاقة فى صورة كيميائية والتى يمكن تحويلها عند اللزوم إلى طاقة كهربائية وذلك من خلال تفاعل أكسدة - اختزال تلقائى غير انعكاسى ويتوقف هذا النوع من الخلايا عن العمل عندما تستهلك مادة المصعد أو تنضب أيونات نصف خلية المهبط.

والخلايا الأوثية لا يسهل (عمليا أو اقتصاديا) بل ربما يصبح من المستحيل إعادة شحنها بغرض إعادة مكوناتها إلى الحالة الأصلية وبمعنى آخر فإنها خلايا غير انعكاسية - وبالطبع لكى يسهل استخدامها وخصوصا في الأجهزة المتنقلة لابد أن تكون في صورة جافة وليست سائلة. لذلك عرفت باسم البطاريات الجافة Dry Batteries - والخلية في الصورة الجافة تحقق جهدا ثابتا لمدة أطول أثناء تشغيلها بالإضافة إلى إمكانية تصنيعها في أحجام أصغر.

وسوف نعرض فيما يلى نموذجين للخلايا الأولية :





# SOLD STUBION

# (أ) خلية الزئبق Mercury cell

وتصنع هذه الخلية في شكل أسطواني أو على هيئة قرص. وتتميز بصغر حجمها لذلك فهي شائعة الاستخدام في سماعات الأذن والساعات والآلات الخاصة بالتصوير. يتكون القطب السالب من الخارصين والقطب الموجب من أكسيد الزئبق. ويستخدم فيها هيدروكسيد البوتاسيوم كإلكتروليت والخلية مغلقة بإحكام شكل (٤-٤)

هيدروكسيد بوتاسيوم(الكتروليت)

شكل (٤ - ٤) خلية الزئيق

والتفاعل الكلي الحادث في الخلية هو

$$Z_{n(s)}^{\circ}$$
 +  $HgO \xrightarrow{i \geq n(s)}$   $Z_{n(s)}^{\circ}$  +  $Hg^{\circ}_{(\ell)}$ 

وتعطى هذه الخلية قوة دافعة كهربية  $E_{\rm cell} = 1.35 
m V$  ويجب التخلص من هذه البطارية بعد الاستخدام بطريقة آمنة حيث أنها تحتوى على الزئبق وهو مادة سامة.

# (ب) خلية الوقود Fuel cell

من المعروف أن الهيدروجين يحترق في الهواء بعنف وينتج عن عملية الاحتراق ضوء وحرارة

 $2H_{2_{(a)}} O_{2_{(a)}} \longrightarrow 2H_{2_{(a)}} Energy$ وقد تمكن العلماء من إجراء هذا التفاعل تحت ظروف يتم التحكم فيها داخل ما يعرف بخلية اڻو قو د .

يجدهذا النوعمن الخالايا اهتماما بالغا فيمركبات الفضاء حيث إن الوقود الغازى من الهيدروجين والأكسجين المستخدم في إطالاق الصواريخ هو نفسه

الوقود المستخدم في هذه الخاليا. وتتركب خلية الوقود من قطبين، كل منهما على

بباح كهربى e H+ H+ شكل (٤ - ٥) خلية الوقود

هيئة وعاء مجوف مبطن بطبقة من الكربون المسامي، تسمح بالاتصال بين الحجرة الداخلية والمحلول الإلكتروليتي الموجود بها وهو غالبا محلول هيدروكسيد البوتاسيوم المائي.

# التفاعلات الحادثة في الخلية

#### تفاعل الأكسدة

$$2H_{2(g)} + 4OH_{(aq)}$$
  $\rightarrow$   $4H_2O_{(\ell)} + 4e^{+}$   $\rightarrow$   $E^{\circ} = 0.83V_{(oxidation)}$   $\rightarrow$   $E^{\circ} = 0.83V_{(oxidation)}$ 

$$O_{2(g)} + 2H_2O_+ 4e^ \longrightarrow$$
  $4OH^-_{(aq)}$   $E^\circ = 0.4V_{(reduction)}$   $e^-_{(reduction)}$ 

$$2H_{2(0)} + O_{2(0)} \longrightarrow 2H_2O_{(\ell)}$$
  $E_{cell} = 1.23V$ 

وخلية الوقود لا تستهلك كباقي الخلايا الجلفانية، لأنها تزود بالوقود من مصدر خارجي.

 $1.23V = E_{\rm cell}$  کهربیة قوة دافعه کهربیة الخلیه قوة

وتعمل خلية الوقود عند درجة حرارة عالية فيتبخر الماء الناتج عنها، ويمكن إعادة تكثيفه للاستفادة منه كمياد للشرب لرواد الفضاء.

وبعكس البطاريات الأخرى فخلايا الوقود لا تختزن الطاقة لأن عملها يتطلب إمدادها المستمر بالوقود وإزالة مستمرة للنواتج.

# Secondary cells الخلايا الثانوية - ٢ - الخلايا الثانوية

وهى خلايا جلفائية متميز بان دفاعلادها الكيميائية دفاعلات انعكاسية، وتختزن الطاقة الكهربية على هيئة طاقة كيميائية والتي يمكن تحويلها مرة أخرى إلى طاقة كهربية عند اللزوم - ويمكن إعادة شحنها بإمرار تيار كهربى من مصدر خارجى بين قطبيها في اتجاه عكس عملية تفريغها وسوف نعرض فيما يلى نمو ذجين من الخلايا الثانوية ،

## أ- بطارية الرصاص الحامضية Lead - Acid battery


تم تطوير هذا النوع من البطاريات وأصبح أنسب أنواع البطاريات المستخدمة في السيارات (لذلك تم تطوير هذا النوع من البطاريات وأصبح أنسب أنواع البطارية خلايا موصلة على التوالي وتنتج كل خمية السيارة) - وتتكون هذه البطارية غالبا من ستة خلايا موصلة على التوالي وتنتج كل خلية  $E_{cell} = 2 \times 6 = 12V$  ويمكن عند الحاجة تصنيع بطاريات أكبر حجما تحتوى على أكثر من ستة خلايا.

وفى البطارية يكون المصعد «الأنود» عبارة عن شبكة من الرصاص مملوءة برصاص أسفنجى (Pb) شكل (٦-٤) ويكون المهبط (الكاثود) عبارة عن شبكة من الرصاص مملوءة بعجينة من ثانى أكسيد



# इयम्भ इरिव्यक्त

الرصاص (PbO<sub>2</sub>) - وتفصل الأنواح عن بعضها بصفائح عازلة وجميعها تغمر في محلول حمض الكبريتيك المخفف كإلكتروئيت موصل. وجميعها موضوعة في وعاء مصنوع من المطاط الصلب أو البلاستيك (بولي ستيرين) والذي لا يتأثر بالأحماض، وتعمل البطارية كخلية جلفائية أثناء تشغيلها (تفريغها) واستهلاك طاقتها أما عند إعادة شحنها فتعتبر خلية إليكتروئيتية.



تحدث التفاعلات التائية عند تشغيل البطارية

أ- تفاعل الأنود (الصعد):

$$Pb_{(s)} + SO_{4(s)}^{2} + 2e^{-} E^{\circ} = 0.36V$$

ب- تفاعل الكاثود (الهبط):

$$PbO_{2(s)} + 4H^{+}_{(aq)} + SO_{4(aq)}^{2-} + 2e^{-}$$
  $\longrightarrow$   $PbSO_{4(s)} + 2H_{2}O_{(\ell)}$   $E^{\circ} = 1.69V$  وتعمل الخلية هنا كخلية جلفانية وعند التفريغ تكون معادلة التفاعل الكلى للبطارية :

$$Pb_{(s)} + PbO_{2(s)} + 4H^{+}_{(aq)} + 2SO_{4(aq)}^{2} \xrightarrow{dicharge} 2PbSO_{4(s)} + 2H_{2}O_{\ell}$$
  $E_{cell} = 2.05V$ 

#### تدريب: احسب القوة الدافعة الكهربية لهذه البطارية

ويتم التعرف على حالة البطارية بقياس كثافة محلول الحمض بواسطة الهيدروميتر (مقياس الكثافة للسوائل) وحينما تكون البطارية كاملة الشحن تكون كثافة الحمض فيها تساوى 1.28.1.3g/cm³ وإذا

قلت كثافة الحمض إلى أقل من 1.2g/cm<sup>3</sup> فهذا يعنى حاجة البطارية إلى إعادة الشحن وزيادة تركيز الحمض فيها.

يؤدى طول مدة استعمال البطارية إلى تخفيف تركيز حمض الكبريتيك فيها نتيجة لزيادة كمية الماء الناتج من التفاعل كذلك تحول مواد الكاثود  $(PbO_2)$  والأنود  $(PbO_2)$  إلى كبريتات رصاص (II). مما يؤدى إلى نقص كمية التيار الكهربي الناتج منها - وهنا تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن ويتم ذلك بتوصيل قطبي البطارية بمصدر للتيار الكهربي المستمر له جهد أكبر قليلا من الجهد الذي ينتج من البطارية مما يؤدى إلى حدوث تفاعل عكس التفاعل التلقائي الذي حدث أثناء تفريغ الشحنة ويؤدى هذا إلى تحول كبريتات الرصاص (II) إلى رصاص عند المصعد (الأنود) وثاني أكسيد الرصاص عند المهبط (الكاثود) كما يعيد تركيز الحمض إلى ما كان عليه.

$$2PbSO_{(s)}^{4} + 2H_{2}O_{(\ell)} \xrightarrow{charge} Pb_{(s)} + PbO_{2(s)} + 2SO_{4(aq)}^{2-} + 4H_{(aq)}^{+}$$

وتعمل البطارية أثناء الشحن كخلية إلكتروليتية، حيث تم فيها إحداث تفاعل كيميائى غير تلقائى بواسطة مرور تيار كهربى - وهذا يعنى تخزين الطاقة الكهربية الواردة من المصدر الخارجى في شكل طاقة كيميائية - لذلك اعتبرت الخلايا الثانوية «المراكم» أنها بطاريات لتخزين الطاقة وفي السيارة يستخدم الدينامو وبصورة مستمرة في إعادة شحن البطارية أو لا بأول.

# ب بطارية أيون الليثوم Lithium ion battery

تعتبر بطارية أيون الليثيوم الجافة من البطاريات القابلة الإعادة الشحن وتستخدم في أجهزة التليفون المحمول والكمبيوتر المحمول.

وفى بعض السيارات الحديثة كبديل لبطارية المركم الرصاص لخفة وزنها وقدرتها على تخزين كميات كبيرة من الطاقة بالنسبة لحجمها. وقد استخدم الليثيوم في تركيبها لسببين أساسيين، هما أنه أخف فلز معروف وجهد اختزاله القياسي هو الأصغر بالنسبة لباقي الفلزات الأخرى (3.04V -) ويحتوى الغلاف المعدني للبطارية على ثلاثة رقائق ملفوفة بشكل حلزوني وهي:

- . ( $LiCoO_2$ ) الإلكترو د الموجب (الكاثود) ويتكون من أكسيد الليثيوم كوبلت ( $LiCoO_2$ ) .
  - ٢- الأنكترود السالب (الأنود) ويتكون من جرافيت الليثيوم (LiC<sub>6</sub>).
- ٣- العازل وهو مكون من شريحة رقيقة جدا من البالستيك تعمل على عزل الإلكترود الموجب عن






# **এখন্যা প্রশিক্ষান্তা**

السالب، بينما تسمح للأيونات بالرور من خلاله.

وتغمر الرقائق الثالاثة في إلكتروليت لا مائي من سداسي فلوروفوسفيد الليثيوم  $(LiPF_6)$ .



تحدث التفاعلات التالية عند تشغيل البطارية

$$E_{cell} = 3V$$
 وتعطى هذه الخلية قوة دافعة كهربية




يتسبب تآكل المعادن في خسائر اقتصادية فادحة يؤدى إلى تدهور المنشآت المعدنية وخاصة الحديدية منها ويقدر الحديد المفقود نتيجة للتآكل بحوالي ربع إنتاج العالم منه سنويا ومن هنا كان الاهتمام بهذه الظاهرة ومحاولة التغلب عليها، وتعرف أي عملية تآكل كيميائي للفلزات بفعل الوسط المحيط بالصدأ.

#### ميكانيكية التآكل:

فى معظم الحالات يكون تآكل الفلزات النقية صعبا - حتى الحديد لا يصدأ بسهولة إذا كان نقيا جدا ولكن معظم المعادن الصناعية تحتوى دائما على شوائب مختلفة تنشط عملية التآكل أى أن ملامسة فلز أقل نشاطا لفلز آخر أكثر نشاطا تسبب زيادة تآكل الفلز الأنشط في هذا الوسط وعلى ذلك يمكن أن نستنتج أن تآكل الفلزات يحدث عن طريق تكون خلايا جلفانية يكون أنو دها الفلز المتآكل أما الكاثود فيكون الفلز الأقل نشاطا أو الكربون الموجود في صورة شوائب وهذا هو سبب تآكل الصلب.

ويمكن تفسير ميكانيكية تأكل الحديد والصلب كما يلي:



شكل (٤ - ٨) ميكانيكية صدأ الحديد والصلب

عند تعرض قطعة حديد للتشقق أو الكسر فإنها تكون خلية جلفانية مع الماء المذاب فيه بعض الأيونات والذي يقوم بدور المحلول الإليكتروليتي ويكون الأنود هو قطعة الحديد، ويتم التآكسد تبعا للمعادلة ،

$$2Fe_{(s)} \rightarrow 2Fe^{2+}_{(a0)} + 4e^{-}$$

قصبح أيونات +Fe<sup>2</sup> جزء من المحلول الإلكتروليتي، وتنتقل الإلكترونات خلال قطعة الحديد إلى الكاثود والذي تمثله شوائب الكربون الموجودة في الحديد أي أن قطعة الحديد تقوم بدور كل من الأنود والدائرة الخارجية.



يتم عند الكاثود اختزال أكسجين الهواء إلى مجموعة الهيدروكسيد (OH·)

$$2H_2O_{(\ell)} + O_{2(g)} + 4e^{-} \longrightarrow 4OH_{(aq)}$$

تتحد أيونات الحديد (Fe<sup>2+</sup>) مع أيونات الهيدروكسيد OH- مكونة هيدروكسيد الحديد ال

$$2Fe^{2+}_{(aq)} + 4OH \xrightarrow{(aq)} Fe(OH)_{2(s)}$$

يتأكسد هيدروكسيد الحديد II بواسطة الأكسجين الذائب في الماء إلى هيدروكسيد الحديد III

$$2\text{Fe}(OH)_{2(s)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} + H_2O_{(f)} \longrightarrow 2\text{Fe}(OH)_{3(s)}$$

وبجمع المعادلات السابقة تنتج المعادلة الكلية لتفاعل خلية تأكل الحديد

$$2\text{Fe}_{(s)} + 3\text{H}_2\text{O}_{(\ell)} + \frac{3}{2}\text{O}_{2(g)} \longrightarrow 2\text{Fe}(\text{OH})_{3(s)}$$

والصدأ عملية بطيئة لأن الماء يحتوى على كميات محدودة من الأيونات ويتم الصدأ بأكثر سرعة إذا احتوى الماء على كميات أكبر من الأيونات، كما في ماء البحار.

العوامل التي تؤدي إلى تآكل الفلزات:

يمكن تقسيم العوامل التي تؤدي إلى تأكل الفلزات إلى قسمين:

١- عوامل تتعلق بالفلز نفسه. ٢- عوامل تتعلق بالوسط المحيط.

#### (١) العوامل التي تتعلق بالظلز نفسه:

أ- عدم نجانس السبائك : والفلزات المستخدمة في الصناعة غالبا ما تكون في صورة سبائك ومن الصعوبة تحضير هذه السبائك في صورة متجانسة التركيب ولهذ ينشأ عدد لا نهائي من الخلايا الموضعية تسبب تآكل الفلز الأكثر نشاطا.

ب- اتصال الفلزات ببعضها: عند مواضع لحام الفلزات ببعضها أو استخدام مسامير برشام من فلز مختلف يؤدى ذلك إلى تكوين خلايا جلفانية موضعية تسبب تآكل الفلز الأنشط فعند تالمس الأنومنيوم والنحاس يتآكل الألومنيوم أو لا وفي حالة تالمس الحديد والنحاس يتآكل الحديد أو لا.

٢- العوامل الخارجية: يعتبر الماء والأكسجين والأملاح من العوامل الخارجية التي تؤثر بشكل أساسي في عملية تآكل العادن.

#### وقاية الحديد من الصدأ:

يعد الحفاظ على الفلزات وحمايتها من الصدأ وبالأخص الحديد من أساسيات حماية الاقتصاد العالي وفيما يلى بعض طريق حماية الحديد من الصدأ بتغطيته بمادة أخرى لعزله عن الوسط الحيط به، ويتم ذلك بإحدى وسيليتين هما:

- (١) الطلاء بالمواد العضوية كالزيت أو الورنيش أو السلاقون، وهي طريقة غير فعالة على المدى
   البعيد.
- (٢) التغطية بالفلزات المقاومة للتأكل فمثلا تجرى عملية (جلفنة الصلب) بغمس الصلب في الخارصين المنصهر كما يستخدم الماغنسيوم في وقاية الصلب المستخدم في صناعة السفن، والقصدير في وقاية الحديد المستخدم في صناعة علب المأكولات المعدنية،

#### أ - الحماية الكاثودية (الغطاء الكاثودي):


قإذا كان الفلز الواقى أقل نشاطا (مثل القصدير) من الفلز الأصلى (مثل الحديد) تتكون خلية جلفانية يكون الحديد الفلز الأنشط هو الأنود والقصدير الفلز الأقل نشاطا هو الكاثود فيتأكل الحديد - لذا يصدأ الحديد المطلى بالقصدير عند الخدش أكثر وأسرع من الحديد .

#### ب- الحماية الأنودية (الغطاء الأنودي):

أى تغطية الفلز بفلز أكثر منه نشاطا مثل طلاء الحديد بالخارصين (جلفنة الحديد) حيث إن الخارصين يسبق الحديد في سلسلة الجهود الكهربية فعندما تنشأ خلية جلفانية يكون الخارصين فيها هو الأنود فإنه يتأكل أولا بالكامل قبل أن يبدأ الحديد في التأكل ويستغرق هذا وقتا طويلاً حيث أن تأكل الحديد يبدأ من سطحة.

ونظرا لأن هياكل السفن تكون دائما الاتصال بالماء المالح وكذلك مواسير الحديد المدفونة في التربة الرطبة، فإنها تكون أكثر عرضة للتأكل،. ولحمايتها يتم جعلها كاثودا وذلك بتوصيلها بالقطب السالب

لمصدر كهربى ويتم توصيل القطب الموجب بفلز آخر أكثر نشاطا من الحديد وليكن الماغنسيوم ليعمل كانود، فيتأكل الماغنسيوم بدلا من الحديد، لذا يسمى الماغنسيوم بالقطب المضحى.



شكل (٤ - ٩) القطب المضحى



# STORM STORM

#### خانيا : الخلايا الإلكتروليتية Electrolytic cells

الخلايا الإلكتروليتية هي خلايا كهربية تستخدم فيها الطاقة من مصدر خارجي لإحداث تفاعل أكسدة - اختزال غير تلقائي الحدوث، وهي عبارة عن إناء كالمبين بالشكل (٤-١٠) يحتوى على محلول الكتروليتي (سواء كان محلولا لأحد الأملاح أو القواعد أو الأحماض أو مصهور لأحد الأملاح) مغمورا به قطبان من مادة واحدة (مثل الكربون أو البلاتين) أو كل منهما من مادة مختلفة (مثل الكربون - البلاتين - النحاس - الخارصين أو غيرها) ويوصل أحد القطبين بالقطب الموجب للبطارية ليصبح قطب موجب الشحنة وعنده تتم تفاعلات أكسدة Oxidation عند الأنود بينما القطب الثاني يوصل بالقطب السائب للبطارية وعنده تتم تفاعلات اختزال Reduction عند الكاثود.

وجدير بالذكر أن الألكتروليتات التي تستخدم كموصلات في هذه الخلايا تختلف عن الموصلات الإلكترونية (الفلزات) - وهناك نوعان من الإلكتروليتات السائلة - النوع الأول يشمل محاليل الأحماض والقلويات والأملاح والثاني مصهور الأملاح.

وعند توصيل القطبين بحيث يكون الجهد الواقع على الخلية يفوق قليلا الجهد الانعكاسي للخلية يسرى تيار كهربي في الخلية الإلكتروليتية وهنا تتجه الأيونات الموجبة من المحلول الإلكتروليتي الموصل بين القطبين نحو القطب السالب (الكاثود) وتتعادل شحنتها باكتسابها الكترونات (اختزال) بينما تتجه الأيونات السالبة من المحلول الإلكتروليتي نحو القطب الموجب (الأنود) وتتعادل شحنتها بفقد الكترونات (أكسدة).

فإذا كان المحلول الإلكتروليتي في هذه الخلية عبارة عن محلول كلوريد النحاس (CuCl<sub>2</sub>) فإن تفاعلات الأكسدة - اختزال التالية سوف تحدث في الخلية الإلكتروليتية ،


اً- تفاعل أكسدة المصعد (الأثود) وهو القطب الموجب 
$$2C\ell_{(aq)}^{-} \xrightarrow{} C\ell_{2(q)}^{+} + 2e^{-} -1.36V = E^{\circ}$$

ب- تفاعل اخترال المهبط (الكاثود) وهو القطب السالب

$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \xrightarrow{|\text{detical}|} Cu^{\alpha}_{(s)} + 0.34V E^{\alpha}$$

ويكون التفاعل الكلى الحادث في الخلية هو مجموع تفاعلي الأنود والكاثود.

$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2C\ell_{(aq)} \longrightarrow Cu^*_{(s)} + C\ell_{2(q)}$$
 $L_{(aq)} \longrightarrow Cu^*_{(s)} + C\ell_{2(q)}$ 



(شكل (١٠٠٠) خلية التحليل الكهربي لمحلول كلوريد النحاس [[

وجهد الخلية « مجموع جهدى الأكسدة والاختزال لنصفى الخلية. emf = -1.36 + 0.34 = - 1.02V

والإشارة السالبة لجهد الخلية هنا تعنى أن التفاعل الكلى الحادث في الخلية لا يتم تلقائيا إذا كان في خلية جلفانية ولكنه يتم في خلية إلكتروليتية باستخدام طاقة كهربية من مصدر خارجي.

ويطلق على مثل هذه العملية التي تم فيها فصل مكونات المحلول الإلكتروليتي (مثل تصاعد الكلور وترسيب النحاس) بالتحليل الكهربي Electrolysis

#### التحليل التهربي ، هو التحلل الكيمياش للمحلول الإلكتروليتي بفعل مرور التيار الكهربي به.

# ✓ قوانين فاراداي للتحليل الكهربي: ✓

مما سبق يتضح أنه يمكن استخدام ظاهرة مرور التيار الكهربي في محاليل التوصيل الكهربي، وما يتبعها من تعادل أيونات هذه المحاليل وتحررها في تطبيقات كثيرة صناعية ومعملية وحتى يمكن وضع أساس علمي لهذه العمليات، فقد قام العالم فاراداي باستنباط يالعلاقة بين كمية الكهرباء التي يتم تمريرها في محلول وبين كمية المادة التي يتم تحريرها عند الأقطاب، ولخص هذه العلاقة في قانونين سميا باسمه.

#### القانون الأول لفاراداي

تتناسب كمية المادة المتكونة أو المستهلكة عند أي قطب سواء كانت غازية أو صلبة تناسبا طرديا مع كمية الكهرباء التي تمر في المحلول أو المصهور الإلكتروليتي.

تحقيق القانون الأول لفاراداي ، بتمرير كميات مختلفة من التيار في نفس المحلول وحساب نسبة كتل المواد المتكونة على الكاثود أو الذائبة من الأنود ومقارنة هذه النسب بنسب كميات الكهرباء التي تم تمريرها.



# প্রতিদ্যে প্রসিত্যক্তি


#### القانون الثاني لفاراداي:

كميات المواد المختلفة المتكونة أو المستهلكة بمرور نفس كمية الكهرباء في عدة الكتروليتات متصلة على التوالى تتناسب مع كتلتها المكافئة.

ويعبر عن القانون الثاني لفاراداي رياضيا بالعلاقة التالية:

وتعرف الكتلة المكافئة الجرامية بأنها كتلة المادة التي لها القدرة على فقد أو اكتساب مول واحد من الإلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي

ويمكن اختبار صحة قانون فاراداى الثانى بإمرار نفس كمية الكهرباء فى مجموعة محاليل ، كبريتات النحاس (II) ونترات الفضة وكلوريد الألومنيوم شكل (٤ - ١١)



(شكل (١٠١)) التحليل الكهربي لعدة محاليل الكتروليتية

فنجد أن كتلة المواد المتكونة عند الكاثود في الخلايا وهي، النحاس والفضة والألومنيوم على التوالى Al: Ag : Cu تتناسب مع الكتل المكافئة لهذه المواد، أي ينسبة 31.75 : 107.88 على التوالي.

(وكمية الكهرباء (بالكولوم) المارة تساوى حاصل ضرب شدة التيار (بالأمبير) المستخدم في الزمن (بالثانية) الذي تم تمريره خلاله).

> كمية الكهرباء (Coulomb) = شدة التيار (Ampere) × زمن المرور (Second) [1C = 1A. x Is]

#### الأمبيروالفاراداي:

تعرف وحدة شدة التيار الكهربائي بالأمبير وهي كمية الكهرباء التي إذا تم تمريرها لمدة ثانية واحدة في محلول أيونات فضة يتم ترسيب 1.118mg من الفضة.

ويتضح من ذلك أن ترسيب أو إذابة كتلة مكافئة جرامية من الفضة يتطلب 96500 وهي أيضا نفس كمية التيار المطلوبة لترسيب أو إذابة الكتلة المكافئة الجرامية لأي عنصر آخر بناء على القانون الثاني لفاراداي، وقد أطلق على هذه الكمية وحدة الفاراداي حيث واحد فاراداي يساوي

96500 C تقريبا.

القانون العام للتحليل الكهربيء

عند مرور واحد فاراداي (11) (96500 C) خلال الإلكتروليت فإن ذلك يؤدى إلى ذوبان أو تصاعد أو ترسيب كتلة مكافئة جرامية من المادة عند أحد الأقطاب.

ولما كانت الذرة الجرامية من المادة تساوى حاصل ضرب الكتلة المكافئة الجرامية في عدد شحنات أيوناتها لذلك فإن وحدات الفاراداى اللازمة لترسيب g/atom من المادة تساوى حاصل ضرب الفاراداى في شحنة الأيون (Z) لذلك فإن كمية الكهرباء اللازمة لترسيب g/atom من الفضة في التفاعل

وكمية التيار الكهربي اللازمة لترسيب g/atom النحاس بناء على التفاعل

وعموما فإن كتلة المادة المترسبة يمكن حسابها بالعلاقة التالية :

كتلة المادة المترسبة (بالجرام)=

شدة التيار (A) × الزمن (s) × الكتلة المكافئة للمادة المترسبة 96500

مثال (۱)

ما كتلة كل من الذهب والكلور الناتجين من إمرار C 10000 من الكهرباء في محلول مائي من كلوريد الذهب (III) علما بأن التفاعلات التي تحدث عند الأقطاب هي:

$$Au_{(aq)}^{3+} + 3e^{-} \longrightarrow Au_{(s)}^{-}$$
  
 $2 Cl_{(aq)}^{-} \longrightarrow Cl_{2_{(q)}}^{+} + 2e^{-}$ 



# প্রতাদ্মে প্রদেশ

الحلء

$$65.6631g = \frac{196.98}{3}$$
 الكتلة المكافئة للنهب  $\frac{35.45g}{1} = \frac{35.45}{1}$  الكتلة المكافئة للنهب المترسب  $\frac{35.45g}{1} = \frac{35.45}{1}$  كمية التيار  $\frac{35.45g}{1} = \frac{35.45}{1}$  الكتلة المكافئة للنهب المترسب  $\frac{35.45g}{1} = \frac{35.45}{1}$ 

96500 C

$$\frac{65.66 \times 10000}{96500} = 6.8 \text{ g}$$

$$3.67~{
m g} = rac{35.66~{
m x}~10000}{96500} = rac{35.66~{
m x}~10000}{96500}$$
 وبالمثل فإن كتلة الكلور المتصاعد

مثال (۲)،

ما كمية الكهربية مقدرة بالكولوم اللازمة لفصل 5.6g من الحديد من محلول كلوريد الحديد (III) علما بأن تفاعل الكاثود هو:

$$(Fe = 55.86) Fe^{3}_{(aq)} + 3e^{-} \longrightarrow Fe^{\circ}_{(s)}$$

الحل

$$18.62 \, \mathrm{g} = \frac{55.86}{3} = \frac{100 \, \mathrm{kg}}{3}$$
 الكتلة المنافقة المحديد - التكافق الترية الكتلة المنافقة المحديد التكافق التكافق المحديد ال

ترسيب 18.62g حديد يحتاج إلى 96500 C

وأن ترسيب 5.6 جم حديد يحتاج إلى X) C


$$29022.5 \, \, \mathrm{C} \, = \frac{96500}{18.62} \, = \, \frac{96500 \mathrm{x}}{18.62} = \frac{96500 \mathrm{x}}{18.62}$$
 حمية الكهرباء كولوم الكتلة المافة المادة المترسبة

# تطبيقات على التحليل الكهربي

#### ۱ - الطلاء بالكهرباء Electroplating

هي عملية تكوين طبقة رقيقة من فلز معين على سطح فلز آخر الإعطائه مظهرا جميلا والمعا أو الحمايته من التاكل ذ فنجد مثلا أن بعض أجزاء السيارات المصنوعة من الصلب تطلى كهربيا بطبقة من الكروم لتأخذ شكلا جماليا وأيضا لحمايتها من التاكل وكذلك فإن بعض الأدواوت الصحية مثل الصنابير والخلاطات تطلى كهربيا بالكروم أو الذهب كذلك يستفاد من عملية الطلاء الكهربي في رفع قيمة بعض الفلزات والمعادن الرخيصة بعد طلائها بالكروم أو الذهب أو الفضة.

فإذا أخذنا مثلا طلاء إبريق بطبقة من الفضلة ، فإنه يتم أولا تنظيف سطح الإبريق تماما ثم يغمس في محلول الكتروليتي يحتوى على أيونات الفضة (نترات الفضة مثلا) ويوضع في المحلول أيضا عمود من فلز الفضة ، ويوسل الإبريق بالطقب السالب لبطارية ، ويصبح بذلك مهبطا (كاثودا) ويوسل عمود الفضة بالقطب الموجب، ويصبح بذلك مصعدا (أنودا) ، كما هو موضح بالشكل (٤-١٢)



## <١ - استخلاص الألومنيوم ،


Cryollite (Na $_3$ A $_6$ F $_6$ ) المنابع مصور الكريولية (A $_2$ O $_3$ ) المنابع مصور الكريولية ( $_2$ O $_3$ ) المحتوى على قليل من الفلورسبار ( $_3$ CaF $_2$ ) المخفض درجة انصهار المخلوط من الفلورسبار ( $_3$ CaF $_3$ ) المحتوى على قليل من الفلورسبار ( $_3$ CaF $_3$ ) المحلوط من أملاح فلوريدات كل من الألومنيوم ، الصوديوم،



# STORM STORM

والكالسيوم حيث يعطى هذا المخلوط مع البوكسيت مصهورا يتميز بانخفاض درجة انصهاره وكذلك انخفاض كثافته مقارنة بالمصهور مع الكريوليت. وانخفاض كثافة المصهور يسهل فصل الألومنيوم المنصهر والذي يكون راسبا في قاع خلية التحليل الكهربي.

والشكل (٤-١٣) يمثل رسما تخطيطيا لخلية التحليل الكهربي المستخدمة.



خالية التحليل الكهربي للبوكسيت

وفى هذه الخلية يكون المهبط (الكاثود) هو جسم إناء الخلية المصنوع من الحديد والمبطن بطبقة من الكربون (جرافيت) الكربون (جرافيت) وعند مرور التيار الكهربي بين قطبي الخلية يحدث تفاعل أكسدة واختزال :

$$2A \ell^{3} \xrightarrow{(aq)} + 6e^{-} \xrightarrow{l \neq i \neq j} 2A \ell \xrightarrow{(s)}$$

$$3O^{2} \xrightarrow{(aq)} + 6e^{-} \xrightarrow{j \neq i \neq j} \frac{3}{2} O_{2(g)} + 6e^{-}$$

$$2A \ell^{3} \xrightarrow{(aq)} + 6e^{-} \xrightarrow{j \neq i \neq j} \frac{3}{2} O_{2(g)} + 6e^{-}$$

$$2A \ell^{3} \xrightarrow{(aq)} + 6e^{-} \xrightarrow{j \neq i \neq j} \frac{3}{2} O_{2(g)} + 6e^{-}$$

$$2A \ell^{3} \xrightarrow{(aq)} + 6e^{-} \xrightarrow{j \neq i \neq j} \frac{3}{2} O_{2(g)} + 6e^{-}$$

$$2A \ell^{3} \xrightarrow{(aq)} + 6e^{-} \xrightarrow{j \neq i \neq j} \frac{3}{2} O_{2(g)} + 6e^{-}$$

$$2A\ell^{3+}_{(aq)} + 3O^{2-}_{(aq)} \longrightarrow 2A\ell_{(s)} + \frac{3}{2}O_{2}(g)$$

ويتفاعل الأكسجين المتصاعد مع أقطاب الكربون مكونات غازات أول وثانى أكسيد الكربون لذا يلزم


$$\frac{3}{2}$$
 نغييرها باستمارا التاكلها ا $O_{2(g)} + 2C_{(s)}$   $O_{(g)} + CO_{2(g)}$ 

ويسحب الألومنيوم من الخلية من خلال فتحة خاصة بذلك.

# ح "- تنقية المعادن :

تكون درجة نقاوة المعادن التى يتم تحضيرها فى الصناعة أقل من درجة تفاوتها المطلوبة لبعض الاستخدامات المعينة ، وبالتالى تقلل من كفاءتها ، فمثلا النحاس الذى نقاوته %99 يحتوى على شوائب الحديد والخارصين والذهب والفضلة ، والتى تقلل من قابلية النحاس للتوصيل الكهربائى وأيضا من جودته لذلك تستخدم طريقة التحليل الكهربي لتنقية النحاس الذي يراد استعماله في صناعة الأسلاك الكهربائية. ويكون الأنود (القطب الموجب) في خلية التحليل الكهربي هو فلز النحاس (Cu°) غير النقى ويكون الكاثود (القطب السالب) من سلك أو رقائق النحاس النقى، ومحلول التوصيل الكهربي يكون عبارة عن محلول مائى من كبريتات النحاس التي تتفكك جزيئاتها في الماء إلى أيونات النحاس (Cu²) والكبريتات (SO<sub>3</sub>²)

وعند مرور التيار الكهربائي من البطارية الخارجية عند جهد يزيد قليلا عن الجهد القياسي لنصف خلية النحاس، تتجه الأيونات نحو الأقطاب المخالفة في الشحنة .



#### (شكل (١١-١)) تنقية النحاس كهربيا

فعند المصعد (الأنود) يذوب النحاس (يتأكسد) ويتحول إلى أيونات نحاس "Cu² تنتشر في المحلول ثم تعود وتترسب أيونات النحاس هذه من المحلول في صورة نحاس نقى مرة أخرى عند الكاثود

أما الشوائب الموجودة أصلا هي مادة المصعد (الأنود)، هإن بعضها يذوب (يتأكسد) هي المحلول مثل الحديد والخارصين ولكنها لا تترسب على الكاثود لصعوبة اختزالها بالنسبة لأيونات النحاس

$$Zn_{(s)} \longrightarrow Zn^{2} \cdot_{(aq)} + 2e^{-}$$
 $Fe_{(s)} \longrightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$ 

وبالنسبة للشوائب الأخرى مثل الذهب والفضة إذا وجدت في مادة الأنود فلا تتأكسد (لاتذوب) عند جهد تأكسد النحاس وتتساقط أسفل الأنود وتزال في قاع الخلية ويمكن بهذه الطريقة الحصول على نحاس درجة نقاوته \$99.95 بالإضافة إلى إمكانية فصل بعض المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة من خامات النحاس كما يتضح بالشكل ( ؛ - ؛ ا)



# ح التقويم >

#### (السؤال الأول :)

(السوال الدول ا
تخير الجابة السحيحة من يون الأقواس ،
🕕 المواد التي توصل التيار عن طريق حركة أيوناتها هي موصلات
(معدنية ذ الكتروليتية ذ الكترونية)
🥕 الأنظمة التي يتم فيها تحخويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية نتيجة لحدوث تفاء
أكسدة واختزال بشكل تلقائي هي
(خلايا الكتروليتية ذخلايا جلفائية ذخلاية شمسية)
<ul> <li>القطب الذي يحدث عنده عملية الاختزال في الخلايا الجلفانية هو</li> </ul>
(القطب الموجب دُ الأنود دُ الكاثود)
<ul> <li>القطب الذي تحدث عنده عملية الأكسدة في الخلايا الإلكتروليتية هو</li> </ul>
(القطب السالب ذ الأنود ذ الكاثود)
🎿 الجسيمات المادية المتحركة في المصهور أو المحلول والغنية بالإلكترونات هي
(الأيونات الموجبة ذ الأيونات السالبة ذ الجزيئات)
🥕 جهد قطب الهيدروجسين القياسي له قيمة
(صفر ذموجبة ذسائبة)
<ul> <li>عند مرور كمظية من الكهرباء في خلايا إلكتروليتية متصلة على التوالي فإن كتل العناصر المتكوا</li> </ul>
عند الأقطاب تتناسب مع
(كتلها النرية ذ أعدادها النرية ذكتلها المكافنة)
<ul> <li>إذا كانت قيمة جهود الاختزال القياسية لكل من الخارصين 0.762V-والنيكل 0.230V-</li> </ul>
على الترتيب فإن emf للخلية هي V
((0.99)/(0.76)/(0.53))

#### (السؤال الثاني)

- أحسب كمية الكهرباء بالفاراداي اللازمة لترسيب مول من الألومنيوم عند التحليل الكهربي لمهور (A1=27)
  - أحسب كتلة الكالسيوم المترسبة عند الكائود نتيجة مرور كمية من الكهرباء مقدارها ،
     (Ca=40)
     (Ca=40)
  - أكتب الرمز الاصطلاحي لخلية جلفانية مكونة من قطب Sn<sup>2+</sup> /Sn وقطب Ag'/Ag وقطب Ag'/Ag
     أكتب الرمز الاصطلاحي لخلية جلفانية مكونة من قطب Sn<sup>2+</sup> /Sn وقطب O.8V
     ثم أحسب emf إذا علمت أن جهد الاختزال القياسي لكل من القصدير O.147V والفضة O.8V

#### (السؤال الثالث)

- علل ۱۱ یاتی د
- أهمية خلايا الوقود بالنسبة لركبات الفضاء
- تفضل بطارية أيون الليثيوم عن بطارية المركم الرصاصى الحامضى

#### السؤال الرابع ،

- وضع التفاعلات التي تحدث داخل كلا من ،
  - أ- خلية الوقود
  - ب- مركم الرصاص (شحن وتفريغ)
    - ج- خلية الزئبق
    - د- بطارية الليثيوم أيون

#### (السؤال الخامس ا

أعطيت ملعقة تحاسية ما هي الخطوات الواجب اتباعها لطلالتها بطبقة من الفضة ، مع كتابة العادلات التي تحدث عند كل من الكانود والأنود (الهيمة والسعد)

#### (السؤال السادس ا

كيف يمكن الحصول على الألومنيوم من البوكسيت ؟

#### (السؤال السايع ،

النحاس النفي 99% يحتوي على نسبة من الشوائب، وضح كيف يمكن تنقيته من الشوائب للحصول على نحاس نقاوته 99.95%



# المعاديدية المامية

# (السؤال الثامن :)

أكتب الرمز الاصطلاحي للخلية الحلفائية التي يحدث بها التفاعل التالي ه

$$Ni^{2}$$
,  $(aq)$   $Fe_{(s)} \rightarrow Ni_{(s)} + Fe^{2}$ ,  $(aq)$ 

دم بين ،

الكاثود والأثود (المبهط والمصعد)

- اتجاه سريان التيار

(السؤال التاسع:

كم دقيقة تلزم لإتمام ما يلي :

- انتاج C 10500 من تيار شدته 25A.

- ترسيب 21.5g من الفضة من محلول نتيرات الفضة بمرور تيار شدته 10A

(السؤال العاشر ،

أحسب كمية الكهربية ( بالفاراداي) اللازمة لترسيب 10g من الفضة على سطح شوكة خلال عملية

الطارع بالكهرياء (Ag: 108)

$$Ag^+_{(aq)} + e^- \longrightarrow Ag_{(s)}$$
 معادلة الكاثود

(السؤال الحادي عشر؛)

كيف بمكن العصول على الذهب الخالص من سلك نحاس يحتوى على شوائب من الذهب؟

(السؤال الثاني عشر:)

قارن بين كل من الهبط ( الكاشود) والصعد ( الأنود) في الخلايا الجلفانية والخلايا الإلكتروثيتية.

# الباب الخامس

الكيمياء العضوية

CH<sub>4</sub> CH<sub>3</sub>-CH<sub>3</sub>

0113 013

CH3-CH2-CH3

CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH2-CH3-CH3

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

CH 3- CHe-CHe-CHe-CH a-CHe-CH a

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3-CH3

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3





# الأهداف >

#### في نهاية دراسة الطالب لباب الكيمياء العضوية ينبغي أن يكون قادرا على أن :

- يستنتج أن الكيمياء علم تجريبي .
- يقارن بين المركبات العضوية وغير العضوية .
  - بميز بين الصيغ الجزيئية والصيغ البنائية .
- برسم متشكلات مختلفة للصيفة الجزيئية الواحدة .
- بجرى تجربة للكشف عن الكربون والهيدروجين في المواد العضوية .
  - يصنف الهيدروكربونات إلى أنواعها المختلفة .
  - بعرف تسمية المركبات العضوية بنظام الأيوباك.
- بشرح طرق تحضير الهيدروكربونات ويكتب معادلات التفاعل ويرسم أجهزة التحضير.
  - بشرح الأهمية الاقتصادية للهيدروكربونات ومشتقاتها.
    - يميز بين الكحولات والفينولات.
- يفرق بين تصنيف الكحولات حسب مجموعة الهيدروكسيل أو حسب ارتباط الكاربينول.
  - يتعرف تسمية الكحولات.
  - يتعرف التفاعلات الميزة للكحولات.
- يوجد العلاقة بين الكحولات والمركبات العضوية الأخرى مثل الألدهيدات والكيتونات والاحماض.
  - يتعرف الأهمية الاقتصادية للكحولات.
  - يجرى تجارب للكشف عن الايثانول والفينول.
  - يتعرف الجموعات الوظيفية لكل من الأحماض والأسترات.
    - يتعرف أنواع الأحماض الكربوكسيلية.
      - يعرف تسمية الأحماض والأسترات.
        - يتعرف الخواص العامة للأحماض.
    - يعرف الأهمية الاقتصادية لكل من الأحماض والأسترات.

- يعرف أنواع التفاعلات العضوية المختلفة وكيف أسهمت في تحضير العديد من المنتجات التي يستخدمها في حياته اليومية .
- يستنتج أن الكيمياء علم ذو حدين فهى كما تسعده فى حياته يمكنها أن تدمره إن لم يحد من أخطارها .
  - يقدر جهود العلماء في تطور علم الكيمياء العضوية .





# الكيمياء العضوية

# ﴿نبدة تاريخية ،

استخدم الإنسان في حياته منذ القدم كثيراً من المواد التي استخلصها من الحيوانات والنباتات مثل الدهون والزيوت والسكر والخل والكحول والعطور . كما استخدم المصريون القدماء العقاقير في عمليات التحنيط والأصباغ ذات الألوان الثابتة التي مازالت ناصعة حتى الأن على معابدهم .

وهي عام 1806 قسم العالم برزيليوس المركبات إلى نوعين :

أ - المركبات العضوية وهي المركبات التي تستخلص من أصل نباتي أو حيواني .

ب - المركبات غير العضوية وهي المركبات التي تأتي من مصادر معدنية من الأرض.

## · Vital Force : نظرية القوى الحيوية

أعتبر برزيليوس أن المركبات العضوية هي المركبات التي تتكون داخل خلايا الكائنات الحية يواسطة قوى حيوية و لا يمكن تحضير هذه المركبات في المختبرات.

فى عام 1828 وجه العالم الألمانى فوهار ضربة قاضية لنظرية القوى الحيوية حيث تمكن من تحضير اليوريا ( البولينا) ( وهو مركب عضوى يتكون فى بول الثدييات) فى المختبر وذلك من تسخين محلول مائى لمركبين غير عضويين هما كلوريد الأمونيوم وسيانات الفضة.

وكانت هذه هى البداية التى انطلق منها العلماء ليملئوا الدنيا بمركباتهم العضوية فى شتى مناحى الحياة من عقاقير ومنظفات وأصباغ وبالاستيك وأسمدة ومبيدات حشرية ١٠٠٠ إلخ . وأصبحت المادة العضوية تعرف على أساس بنيتها التركيبية وليس على أساس مصدرها لأن معظم المركبات العضوية التى حضرت فى المختبرات لا تتكون إطلاقاً داخل الكائنات الحية . ويهتم علم الكيمياء العضوية بدراسة مركبات عنصر الكربون ( باستثناء أكاسيد الكربون وأملاح الكربونات والسيانيد ) . أما علم الكيمياء غير العضوية فيهتم بدراسة بقية



العناصر المعروفة . وقد يتطرق إلى الذهن أن عدد المركبات غير العضوية أكثر من عدد المركبات العضوية . ولكن العكس هو الصحيح . فعدد المركبات العضوية يتعدى العشرة ملايين ويزيد يوما بعد يوم ، أما جميع المركبات غير العضوية فلا يتعدى النصف مليون . أي أن النسبة بين المركبات العضوية إلى غير العضوية ٢٠ - ١ تقريبا .

#### ما سبب وهرة المركبات العضوية ؟

ترجع وفرة المركبات العضوية إلى قدرة ذرات الكربون على الارتباط مع نفسها أو مع غيرها بطرق عديدة. فقد ترتبط بروابط أحادية أو ثنائية أو ثلاثية .

$$-c\equiv$$
  $-c=$   $-c -c H$   $H$   $H$   $H-C\equiv C-H$   $H-C=O$   $H-C-H$ 

أو قد ترتبط ذرات الكربون مع بعضها بطرق مختلفة إما على هيئة سلاسل مستمرة أو سلاسل متفرعة أو حلقات متجانسة أو غير متجانسة .

وأمام هذا الكم الهائل من المركبات العضوية كان لزاماً على العلماء تصنيف هذه المركبات بشكل منظم في مجموعات قليلة العدد نسبيًا ووضعوا أسسًا لتسميتها وسنلقى لاحقاً الضوء على بعض هذه المجموعات، وسندرس بعض التفاعلات المهمة ، وهدفنا من ذلك هو تقديم فكرة عامة عن بعض الموضوعات المهمة في مجال الكيمياء العضوية وأهميتها في حياتنا .



# ≺الفرق بين المركبات العضوية وغير العضوية

# ⟨ تدریب عملی : ⟩

أحضر بعض المواد العضوية الصلبة (مثل شمع البرافين والنفثالين) والمواد السائلة (مثل الكحول الايثيلي والاسيتون والجلسرين) وبعض المواد غير العضوية السائلة (مثل الماء) والصلبة (مثل ملح الطعام وكبريتات النحاس).

قارن بين المواد العضوية وغير العضوية من حيث الذوبان - درجة الأنصهار - الغليان -القابلية للاشتعال - الرائحة - التوصيل الكهربي .

ويمكن أن نستنتج من هذه التجارب وغيرها الفرق بين المركبات العضوية وغير العضوية كما يوضحه الجدول التالي:

المركبات غير العضوية	المركبات العضوية	وجه المقارنة
قد تحتوى الكربون بالإضافة لعناصر أخرى.	یشترط أن تحتوی علی عنصر الکربون.	۱- التركيب الكيميائي
تَدُوبِ غَالِباً هِي المَّاءِ ،	لا تذوب في الماء غالباً - وتذوب في المذيبات العضوية مثل البنزين.	٢- الذوبان
مرتفعة.	منخفضة.	٣- درجة الانصهار
مرتفعة.	منخفضة.	٤- درجة الغليان
عديمة الرائحة غالباً.	لها روائح مميزة غالبا.	٥- الرائحة
غير قابلة للاشتعال غالباً وإذا اشتعل بعضها تنتج غازات أخرى.	تشتعل وينتج دائماً H <sub>2</sub> O,CO <sub>2</sub>	٦- الاشتعال
روابط أيونية وتساهمية.	روابط تساهمية.	٧- أنواع الروابط في الجزيء .
مواد الكتروليتية توصل التيار الكهربي غالبا، نظرا لقدرتها على التأين	مواد غير الكتروليتية لاتوصل التيار الكهربي، لعدم قدرتها على التأين	٨ - التوصيل الكهربي
سريعة لأنها تتم بين أبونات.	بطينة لأنها تتم بين جزيئات.	٩ - سرعة التفاعلات
لا توجد غالباً.	تتميز بقدرتها على تكوين بوليمرات.	١٠ - البلمرة أو التجمع
لاتوجد غالباً بين جزيئات مركباتها هذه الخاصية.	توجد بين كثير من المركبات.	<ul><li>١١ - المشابهة الجزيئية</li><li>(الايزوميرزم)</li></ul>

# ≺الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية للمركبات العضوية

# الصيغة الجزيئية : Molecular Formula:

هى صيغة تبين نوع وعدد ذرات كل عنصر في المركب فقط ولا تبين طريقة ارتباط الذرات مع بعضها في الجزيء .

# Structural Formula : الصيغة البنانية

هى صيغة تبين نوع وعدد ذرات كل عنصر فى الجزىء وطريقة ارتباط الذرات مع بعضها بالروابط التساهمية . فعدد الروابط التساهمية حول الذرة تبين تكافؤها فكل رابطة تساهمية واحدة تمثل تكافؤا واحداً. ولكل عنصر يدخل فى تركيب المركبات العضوية تكافؤ محدد وثابت وهو فى ذرة الكربون (رباعى) وفى ذرة الهيدروجين (أحادى) وفى ذرة الأكسجين (ثنائي) وفى ذرة النيتروجين (ثلاثي).

CH <sub>4</sub> O	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	الصيغة الجزينية
н н-с-о-н	н-с≡с-н	H H C=C I I H H	Cl Cl H-C-C-H H H	المبيغة البتائية


# المشابهة الجزيئية (التشكل): Isomerism:

هى ظاهرة وجود عدة مركبات عضوية تشترك في صيغة جزيئية واحدة ولكنها تختلف عن بعضها في صيغتها البنائية والخواص الكيميائية والفيزيائية.






ويتضح ذلك في الصيغة الجزيئية C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O التي تمثل مركبين مختلفين تماماً هما الكحول الايثيلي و إثير ثناني الميثيل .



#### ملحوظة

كتابة الصيغ البنائية تظهر الجزىء كما لو كان مسطحاً - إنما هو في الواقع جزىء مجسم تتجه ذراته في الأبعاد الفراغية الثلاثة ولتوضيح شكل الجزىء الصحيح يجب استخدام النماذج الجزيئية وهي أنواع عديدة - أحد هذه الأنواع يستخدم كرات من البلاستيك وتمثل فيه ذرات كل عنصر بلون معين وحجم معين.



الثماذج الجزيئية شكل (٥-١)

# الكشف عن الكربون والهيدروجين في المركبات العضوية :

#### تجرية عملية ا

ضع فى أنبوبة اختبار قليل من أى مادة عضوية (قماش - جلد - ورق - بلاستيك) واخلطها مع أكسيد النحاس (II) فى أنبوبة اختبار تتحمل الحرارة ثم سخن ثم أمرر الأبخرة والفازات الناتجة على مسحوق كبريتات النحاس (II) اللامائية البيضاء - ثم على ماء الجير (شكل ٥ ـ ٢).

دون مشاهداتك وماذا تستنتج ؟ ثم أكتب معادلات التفاعل .



تجربة الكشف عن الكربون والهيدروجين في المركبات العضوية شكل (٥ - ٢)



#### (Lambaria)

١ - يتحول لون كبريتات النحاس الأبيض إلى اللون الأزرق مما يدل على امتصاصها لبخار
 الماء الذي تكون من أكسجين أكسيد النحاس وهيدروجين المادة العضوية .

٢ - يتعكر ماء الجير مما يدل على خروج غاز ثانى أكسيد الكربون الذى تكون من أكسجين
 أكسيد النحاس وكربون المادة العضوية .

#### الاستنتاج

المركب العضوى يحتوى على عنصرى الكربون والهيدروجين ،

$$C + 2 CuO_{(s)} \xrightarrow{\Delta} 2 Cu_{(s)} + CO_{2_{(g)}}$$

$$2 H + CuO_{(s)} \xrightarrow{\Delta} Cu_{(s)} + H_2O_{(v)}$$

# حتصنيف المركبات العضوية


يتكون البناء الأساسى لأى مركب عضوى من عنصرى الكربون الهيدروجين فيما يعرف بالهيدروكربونات وتعتبر كافة أنواع المركبات العضوية الباقية مشتقات للهيدروكربونات.

# Hydrocarbons الهيدروكربونات

## هي مركبات عضوية تحتوى على عنصري الكربون والهيدروجين فقط.

ويمكن تقسيم الهيدروكربونات إلى الأقسام المبيئة في الجدول التالى و سنتناول دراسة كل قسم منها بالتفصيل بعد ذلك .





الالكانات هي هيدروكربونات أليفاتية مفتوحة السلسلة الكربونية وترتبط ذرات الكربون في جزيئاتها بروابط أحادية قوية من نوع سيجما اص التي يصعب كسرها لذا فهي مركبات خاملة كيميانيا نسبياً.



# প্রতিদ্যা ব্রদ্ভিরম্ভ

## ويبين الجدول أسماء وصيغ العشرة مركبات الأولى في سلسلة الالكانات:

C, H <sub>2s+2</sub>	الصيفة	الاسم
CH <sub>4</sub>	CH <sub>4</sub>	ميثان
C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub>	ايثان
C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	بروبان
C4H10	C H <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	بيوتان
C5H12	CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	بنتان
C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	هكسان
C7H16	CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3	هبتان
C <sub>8</sub> H <sub>18</sub>	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	أوكتان
C <sub>9</sub> H <sub>20</sub>	CH <sub>3</sub> - CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	نونان
C <sub>10</sub> H <sub>22</sub>	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	ديكان

## ومن الجدول السابق ثلا حظ ما يلى :

- جميع الالكانات لها الصيفة العامة وبالكربون.
   حيث (n) عدد ذرات الكربون.
  - ٢ كل مركب يزيد عن الذي يسبقه بمجموعة ميثيلين (-CH<sub>2</sub>).
- ٢ جميع مركبات السلسلة تنتهى بالمقطع آن (ane) الذي يدل على انتمائه لسلسلة الالكانات أما المقطع الأول من الأسم فيدل غالباً على عدد ذرات الكربون (ميث Meth = 1 ،ايث Eth = 2 .... وهكذا) وتكون الالكانات سلسلة متجانسة .... وهكذا) وتكون الالكانات سلسلة متجانسة ....

## : Homologous Series المتجانسة

هى مجموعة من المركبات يجمعها قانون جزينى عام وتشترك فى خواصها الكيميائية وتتدرج فى خواصها الفيزيائية مثل (درجة الغليان).

وتلعب الالكانات دوراً هاماً كوقود ومواد أولية تستخدم في تحضير العديد من المركبات العضوية الأخرى . وتوجد بكميات كبيرة في النفط الخام . ويتم فصلها عن بعضها بواسطة التقطير التجزيئي .

قالميثان يوجد بنسبة تترواح بين 50% إلى أكثر من 90% في الغاز الطبيعي المستخدم حاليا كوقود في المنازل. كما يعبأ البروبان والبيوتان في اسطوانات ويستخدم أيضا كوقود. أما الالكانات الأطول في السلسلة الكربونية فتوجد في الكيروسين وزيت الديزل وزيوت التشحيم وشمع البارافين.

# : Alkyl Radical (R-) مجموعة أو شق الالكيل

هى مجموعة ذرية لا توجد منفردة وتشتق من الالكان المقابل بعد نزع ذرة هيدروجين منه - وتسمى باسم الالكان المشتقة منه باستبدال المقطع (أن) بالمقطع (يل) - ويرمز لها بالرمز (R) وصيغتها العامة C<sub>n</sub>H<sub>2n+1</sub>، ويبين الجدول التالى أمثلة لذلك : -

R−H <del>−H</del> (R-)		
ا <b>نک</b> ان C <sub>n</sub> H <sub>2n+2</sub>	شق الكيل C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub>	أمثلة
میثان CH <sub>4</sub>	- CH <sub>3</sub> میثیل	CH <sub>3</sub> Cl کلورید میثیل
ایثان C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	- C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ايثيل	برومیدایثیل C₂H₅Br
C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> بروبان	$- C_3H_7$ بروبیل	يوديد البروبيل C3H7I
بيوتان C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	بيوتيل <sub>C4</sub> H9 -	C4H9Cl كلوريد بيوتيل

## تسمية الالكانات ( بنظام الايوباك ):

استخدم الكيميائيون القدماء أسماء اللمركبات العضوية القليلة التي كانوا يعرفونها انذاك وكانت هذه الأسماء تشير غالباً إلى المصدر الذي استخلص منه هذا المركب و عرفت هذه الأسماء بالأسماء الشائعة. ومع التقدم المستمر وكثرة المركبات العضوية أتفق علماء الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية.

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

على إتباع نظام معين في تسمية أي مركب عضوى تمكن كل من يقرأه أو يكتبه من التعرف الدقيق على بناء هذا المركب.





# STORM STREAM

والإسم الشائع أو القديم للألكانات هو البارافينات ويتبع في تسميتها الخطوات التالية :

 ١ - تحدد أطول سلسلة كربونية متصلة (سواء كانت مستقيمة أو متفرعة ) ومنها يحدد أسم الالكان .

السلسلة الأساسية هي الهيتان

السلسلة الأساسية هي البنتان

۲ - ترقیم ذرات الکربون ،

أ - إذا كانت أطول سلسلة كربونية خالية من التفرعات - ترقم ذرات الكربون من أى طرف في السلسلة الأيمن أو الأيسر.

ب- إذا كانت أطول سلسلة كربونية متصلة بمجموعة ألكيل أو أى ذرات أخرى يبدأ
 ترقيم السلسلة الكربوئية من الطرف الأقرب لمكان التفرع - وتبدأ التسمية برقم
 ذرة الكربون الذى يخرج منها الفرع مع وضع فاصلة (،) بين كل رقمين وخط قصير (-)
 بين الرقم والإسم - ثم اسم الفرع - وتنتهى التسمية باسم الألكان.

3 - میثیل هکسان

2 - میثیل بنتان

٢ - إذا تكررت المجموعة الفرعية في السلسلة الكربونية تستخدم المقدمات ثنائي أو
 ثلاثي أو رباعي للدلالة على عدد التكرار .

3,2 - ثنائى ميثيل بنتان

$$\begin{array}{c} \operatorname{CH_3} \\ \operatorname{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3} \\ \operatorname{CH_3} \end{array}$$


3,3 - ثنائى ميثيل بنتان

١٠ إذا كان الفرع ذرة هالوجيئ مثل الكلور أو البروم أو مجموعة NO<sub>2</sub> - فيكتب
 اسمها منتهيا بحرف (و) فيقال كلورو أو برومو أو نيترو.

٥ - إذا كانت الفروع مختلفة (مجموعة الكيل وهالوجينات مثلا) فترتب حسب الترتيب الأبجدى
 لأسمائها اللاتينية، بعد أن يتم الترقيم من الطرف الذي يعطى لكل الفروع أقل مجموع ممكن.

2 - برومو - 3 - میثیل بیوتان

2 - كلورو - 4.4 - ثنائى ميثيل هكسان



5.4.4.3 وباعي ميثيل أوكتان

6,3 - ثنائي ميثيل أوكتان



وسنتناول بالذكر مثال على الألكانات (الميثان) من حيث تواجدها في الطبيعة وتحضيرها



هو أول سلسلة الالكانات ويعتبر أبسط المركبات العضوية على الإطلاق - ويكون نسبة كبيرة قد تصل إلى أكثر من %90 من الفاز الطبيعي الموجود في باطن الأرض أو مصاحباً للبترول . كما يوجد في مناجم الفحم التي قد تتعرض للانفجار نتيجة اشتعاله ويسمى الغاز أحيانا بغاز المستنقعات لأنه يخرج على هيئة فقاقيع من قاع المستنقعات نتيجة لتحلل المواد العضوية .

# (تحضير الميثان في المختبر:

كما يحضر الميثان في المعمل بالتقطير الجاف لملح اسيتات الصوديوم اللامائية مع الجير الصودي باستخدام جهاز كالمبين بالشكل (٥ - ٣).

$$CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{CaO} CH_{(s)} + Na_2CO_{3_{(s)}}$$

جهاز تحضير غاز الميثان في العمل

ويلاحظ أن الجير الصودى هو خليط من الصودا الكاوية NaOH خليط من الصودا الكاوية الكالسيوم والجير الحى (أكسيد الكالسيوم (CaO) ولا يدخل الأخير في التفاعل إنما يساعد على خفض درجة إنصهار الخليط.

## الخواص العامة للألكانات:

# ﴿ الخواص الفيزيائية ا

۱ -الألكانات التي تحتوى من 1 : 4 ذرة كربون عبارة عن غازات في درجة الحرارة العادية فالميثان يستخدم كوقود في المنازل . أما خليط البروبان والبيوتان فتسال وتعبأ في اسطوانات تستخدم كوقود . وحيث أن البروبان أكثر تطايراً (اقل في درجة الغليان) من البيوتان. لذا نجد أن نسبة البروبان تكون أكثر في المناطق الباردة . أما في المناطق الدافئة فتحتوى اسطوانات الغاز على نسبة أكبر من البيوتان.

۲- الألكانات التي تحتوى من 5 - 17 ذرة كربون سوائل مثل الجازولين والكيروسين
 و يستخدما كوقود أيضا .

٣ - المركبات التى تحتوى على أكثر من 17 ذرة كربون مواد صلبة مثل شمع البرافين. أى
 أنه كلما زاد عدد ذرات الكربون (الكتلة الجزيئية) للألكان زادت درجة الغليان.

١٠ الألكانات مواد غير قطبية لا تذوب في الماء - لذا تغطى الفلزات بالإلكانات الثقيلة
 مثل الشحم لتحميها من التآكل .

# حب- الخواص الكيميائية :

ترتبط ذرات الكربون ببعضها في الألكانات بروابط من نوع سيجما احه القوية التي يصعب كسرها إلا تحت ظروف خاصة - لذا نجد أن الألكانات خاملة نسبيا في تفاعلاتها الكيميانية .

ا الاحتراق المحترق الألكانات وتكون ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء - وهي تفاعلات طاردة المحرارة لذا تستخدم كوقود .

$$CH_{4_{(g)}} + 2O_{2_{(g)}} \xrightarrow{\Delta} CO_{2_{(g)}} + 2H_2O_{(v)} + Energy$$

## ٢- النَّفَاعل مع الهالوجيئات :

تتفاعل الألكانات مع الهالوجينات بالتسخين إلى °C أو في وجود الأشعة فوق البنفسجية (uv) في سلسلة من تفاعلات الاستبدال (Substitution reactions) ويتوقف الناتج على نسبة كل من الميثان والهالوجين في خليط التفاعل.



STORM STUBBOA

# تدريب ما هي نواتج تفاعل الإيثان مع الكلور ، أكتب الصيغ البنائية لها .

## استخدامات مشتقات الألكانات الهالوجينية

الستخدم الكلوروفورم وCHCl لمدة طويلة كمخدر ، ولكن توقف استخدامه لأن عدم التقدير الدقيق للجرعة اللازمة لكل مريض تسبب في وفيات كثيرة، ويستخدم حاليا بأمان أكثر مخدر الهالوثان وصيغته وCHBrCl-CF وهو

(2 - برومو -2-کلورو -1.1.1 - ثلاثی فلوروایثان ) -

- بستخدم مركب ١,١,١- ثلاثى كلورو إيثان في عمليات التنظيف الجاف.
- استخدمت الفريونات في أجهزة التكييف والثلاجات وكمواد دافعة للسوائل والروائح وكمنظفات للأجهزة الألكترونية والفريونات عبارة عن مشتقات هالوجينية للألكانات مثل CF<sub>4</sub> رابع فلوريد الكربون (رباعي فلوروميثان ولكن أشهرها هو ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان <sub>1</sub> CF<sub>2</sub>CI وتستخدم الفريونات بكميات كبيرة لرخص ثمنها وسهولة إسالتها وهي غير سامة ولا تسبب تأكلا في المعادن، إلا أنها تسببت في تأكل طبقة الأوزون التي تقى الأرض من أخطار الأشعة فوق البنفسجية وهناك اتفاقا دوليا يحرم استخدامها بداية من عام 2020

#### Thermal Catalytic Craking : التكسير الحراري الحفري الحقر عام

تجرى هذه العملية أثناء تكرير البترول وذلك لتحويل النواتج البترولية الطويلة السلسلة والثقيلة (الأقل استخداما) إلى جزيئات أصغر وأخف الأكثر استخداما، وتتم عملية التكسير بتسخين منتجات البترول الثقيلة وتحت ضغط مرتفع في وجود عوامل حفازة فينتج نوعين من المنتجات.

أ - الكانات ذات سلسلة قصيرة تستخدم كوقود للسيارات مثل الجازولين الذي يحتاجه
 العالم باضطراد مستمر .

ب - الكينات ذات سلسلة قصيرة مثل الإيثين والبروبين التى تقوم عليها صناعات
 كيميائية كثيرة أهمها صناعة البوليمرات.

$$C_8H_{18}$$
  $C_4H_{18}$   $C_4H_{10}$   $C_4H_{10}$ 

#### الأهمية الاقتصادية للألكانات

## ١- الحصول على الكريون المجرَّأ (أسود الكريون) ١

يدخل الكربون المجزأ بكميات كبيرة في صناعة إطارات السيارة وكصبغة في الحبر الأسود والبويات وورنيش الأحذية ، ويمكن الحصول عليه بتسخين الميثان ( بمعزل عن الهواء) لدرجة ٢٠٥٥٠٠ .

$$CH_{4_{(g)}} - \frac{1000^{\circ}c}{No \text{ alr}} - C_{(a)} + 2H_{2_{(g)}}$$

## ٢- الحسول على الفارّ المائي :

الغاز المائى هو خليط من غازى الهيدروجين وأول أكسيد الكربون وهو يستخدم كمادة مختزلة أو وقودا قابلا للإشتعال .

$$CH_{4_{(g)}} + H_2O_{(v)} \xrightarrow{-725^{\circ}C} CO_{(g)} + 3H_{2_{(g)}}$$



# إب- الهيدروكربونات الأليفاتية غير المشبعة مفتوحة السلسلة ، >-

تقسم الهيدروكربونات الأليفاتية غير المشبعة مفتوحة السلسلة إلى مجموعتين،

١- مجموعة الألكينات Alkenes وتتميز بوجود رابطة مزدوجة في السلسلة الكربونية .

٢- مجموعة الألكاينات Alkynes وتتميز بوجود رابطة ثلاثية في السلسلة الكربونية.

# Olifenes الألكينات Alkenes الأولفينات

هى هيدروكربونات توجد بين ذرات الكربون فى جزيئاتها رابطة مزدوجة على الأقل - ويمكن اعتبار الألكينات مشتقات من الألكانات وذلك بانتزاع ذرتى هيدروجين من جزئ الألكان المقابل ولذلك فهى تكون سلسلة متجانسة قانونها العام - وكل مركب فى هذه السلسلة يقل عن مثيله فى سلسلة الألكانات بذرتى هيدروجين.

#### تسمية الألكيتات

١- تتبع نفس الخطوات التي اتبعناها في تسمية الألكانات ، وهي اختيار أطول سلسلة كربونية ويستبدل المقطع (ان) في اسم الألكان بالمقطع (ين) في اسم الألكين على أن يسبق هذا المقطع رقم ذرة الكربون المرتبطة بالرابطة المزدوجة الأقرب إلى بداية السلسلة .

٢- يبدأ الترقيم من الطرف الأقرب إلى الرابطة المزدوجة بغض النظر عن موقع أى
 مجموعات أخرى.


وتتميز الألكينات بوجود الرابطة المزدوجة، التي تتكون من رابطتين، إحدى هاتين الرابطتين من نوع باي (П) الضعيفة سهلة الكسر مما يفسر نشاط الألكينات.

ونتناول بالذكر مثال على الألكينات (الإيثين) من حيث تحضيره ،

الاسم الشائع للإيثين هو الإثيلين - وهو أول مركبات الألكينات .

يحضر الإيثين بانتزاع الماء من الكحول الإيثيلي بواسطة حمض الكبريتيك المركز الساخن إلى 180°C باستخدام جهاز كالمبين بالشكل (٥ - ٤).

$$\mathbf{C_2} \xrightarrow{\mathbf{H_4}\mathbf{OH_{(i)}}} \xrightarrow{\mathbf{Conc.}} \xrightarrow{\mathbf{H_2}} \mathbf{C_2} \xrightarrow{\mathbf{H_4_{(q)}}} \xrightarrow{\mathbf{H_2}\mathbf{O_{(v)}}}$$



جهاز تحضير الإيشين في المعمل شكل (٥-٤)

ويتم هذا التفاعل على خطوتين متتاليتين :

كبريتات ابثيل هيدروجينية

١- يتفاعل الإيثانول مع حمض الكبريتيك المركز مكونا كبريتات إيثيل هيدروجينية .

٢- تنحل كبريتات الإيثيل الهيدروجينية بالحرارة ويتكون الإيثين ،



# خواص الألكينات ،

# الخواص الفيزيائية :

١- المركبات الأولى من سلسلة الألكينات غازات أما المركبات التي تحتوى من 5 - 15 ذرة
 كربون فهي سوائل والمركبات الأعلى مواد صلية .

٢- الألكينات مواد غير قطبية لا تذوب في الماء وإنما تذوب في المركبات العضوية مثل
 الأثير والبنزين ورابع كلوريد الكربون .

# ﴿الخواص الكيميانية : √

تعتبر الألكينات أكثر نشاطا من الألكانات ويرجع ذلك إلى احتوانها على روابط من نوع باى (II) الضعيفة سهلة الكسر .

$$C_2H_{4(0)} + 3 O_2 \xrightarrow{\Delta} 2 CO_{2(0)} + 2 H_2O + Energy$$

-۱- تفاعلات الإضافة المات الألكينات بقدرتها على الدخول في تفاعلات بالإضافة مع المواد الأخرى - حيث تنكسر الرابطة باى وتبقى الرابطة سيجما فقط وتتكون مركبات مشبعة ، ومن هذه التفاعلات ،

## أ) إضافة الهيدروجين:

تتفاعل الألكينات مع الهيدروجين في وجود عوامل حفازة مثل النيكل أو البلاتين مع التسخين - ويتكون الألكان المقابل، حيث تحتاج كلرابطة (□) مول واحد من الهيدروجين لكسرها مقابل مول من الهيدروكربون.

## ب) إضافة الهالوجينات ، (الهلجنة)

تتفاعل الهالوجينات مع الألكينات بالإضافة - ويستغل هذا التفاعل للكشف عن الألكينات غير المشبعة فعند رج الإيثين مع البروم المذاب في رابع كلوريد الكربون يزول لون البروم الأحمر ويتكون 2.1 - ثنائي برومو إيثان عديم اللون .

$$CH_{2} = CH_{2} + Br_{2} \xrightarrow{CCI_{4}} H - C - C - H_{(f)}$$

$$CH_{2} = CH_{2} + Br_{2} \xrightarrow{(f)} H - C - C - H_{(f)}$$

$$Br Br$$

2.1 (شناش برومو ابثان (مرکب عدمم الون)

#### ج) إضافة هاليدات الهيدروجين (الأحماض الهالوجينية) (H+X):

تتفاعل الألكينات بالإضافة مع هاليدات الهيدروجين وهى مادة غير متماثلة حيث تنكسر الرابطة (∏) وتتصل ذرة هيدروجين بإحدى ذرتى الكربون فى الرابطة (∏) وذرة الهالوجين بذرة الكربون الأخرى ويتكون هاليد الألكيل المقابل - وتتوقف نواتج الإضافة على نوع الألكين.

أ) إذا كان الألكين متماثل (أى أن ذرتى الكربون المتصلتين بالرابطة المزدوجة تحتويان نفس العدد من ذرات الهيدروجين) - فتضيف أى من ذرتى الكربون ذرة الهيدروجين والذرة الأخرى تضيف ذرة الهالوجين.

ب) إذا كان الألكين غير متماثل (أى أن ذرتى الكربون المتصلتين بالرابطة المزدوجة تحتويان عددا غير متساو من ذرات الهيدروجين)، نجد أن ذرة الهيدروجين H، تضاف إلى ذرة الكربون الأغنى بالهيدروجين - بينما تتجه ذرة الهالوجين Xإلى ذرة الكربون الأخرى المتصلة بعدد أقل من ذرات الهيدروجين، وتسمى هذه القاعدة بقاعدة ماركو نيكوف.



STORM STREAM

#### قاعدة ماركونيكوف

عند إضافة متفاعل غير متماثل ( $\dot{H}$  أو  $\dot{H}$  OSO $_3$ H) إلى ألكين غير متماثل فإن الجزء الموجب ( $\dot{H}$ ) من المتفاعل يضاف إلى ذرة الكربون الحاملة لعدد أكبر من ذرات الهيدروجين والجزء السالب( $\dot{H}$ ) يضاف إلى ذرة الكربون الحاملة لعدد أقل من ذرات الهيدروجين .

## د) إضافة الماء: (الهيدرة الحفرية)

نظراً لأن الماء الكتروليت ضعيف فإن تركيز أيون الهيدروجين الموجب يكون ضعيفا ولا يستطيع كسر الرابطة المزدوجة لذا لايتم التفاعل إلا في وسط حامضي لتوفير أيون الهيدروجين الموجب لذا يضاف حمض الكبريتيك المخفف أولا إلى الابثين فتتكون كبريتات الإيثيل الهيدروجينية التي تتحلل مائياً مكونه الكحول الابثيلي .


$$CH_{2}=CH_{2}$$
 + H-OSO $_{3}H_{(aq)}$   $\Delta$   $CH_{3}^{-}$   $CH_{3}^{-}$   $CH_{2}^{-}$  OSO $_{3}H_{(d)}$  (الإيثيلين) كبريتات أيقل هدروجينية حمض الكبريتيك الإيثين (الإيثيلين)

تتأكسد الالكينات بالعوامل المؤكسدة مثل فوق أكسيد الهيدروجين H2O2 أو برمنجنات البوتاسيوم القلوية البنفسجية KMnO وتتكون مركبات ثنائية الهيدروكسيل تعرف بالجلايكولات .

#### :Baeyr's reaction تقاعل باير

عند إمرار غاز الايثين في محلول برمنجانات البوتاسيوم في وسط قلوى يزول لون برمنجانات البوتاسيوم وهو اختبار هام للكشف عن وجود الرابطة المزدوجة.

ايثيلين جليكول



والاثيلين جليكول هو المادة الأساسية المانعة لتجمد المياه في مبردات السيارات حيث أنه يكون روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء فيمنع تجمع جزيئات الماء مع بعضها على هيئة بلورات ثلج كما هو موضح بشكل (٥ ـ ٥).

# - Polymerization : البلمرة

كلمة بوليمر كلمة لاتينية الأصل معناها عديد الوحدات . وتعتبر عملية البلمرة من التفاعلات الكيميانية الهامة التي فتحت الباب على مصراعيه لتحضير العديد من المنتجات التي ساهمت في إزدهار الحضارة . والبلمرة عبارة عن تجمع عدد كبير من جزيئات مركبات بسيطة يتراوح عددها من المائة حتى المليون لتكوين جزىء كبير عملاق ذات كتلة جزيئية كبيرة ويسمى الجزىء الأولى الصغير بالمونومر ، بينما يسمى الجزئ الكبير الناتج من عملية البلمرة بالبوليمر.

## وهناك طريقتين أساسيتين لعملية البلمرة ،

١ - البلمرة بالإضافة : Addition Polymerization

وتتم بإضافة أعداد كبيرة جداً من جزيئات مركب واحد صغير وغير مشبع إلى بعضها







# SOLD STORM

لتكون جزىء مشبع كبير جدا مثل البولي ايثيلين .

وتتميز الالكينات بأنها تكون بوليمرات بالإضافة - فعند تسخين الايثين تحت ضغط كبير (حوالى الله الله الله الله المنافقة الأكاسيد كمواد بادنة للتفاعل يتكون البولى ايثيلين الذي تبلغ كتلته الجزيئية (١٥٥٥٥ (لاحظ أن الكتلة الجزيئية للايثين = 28 فقط) وتفسر عملية بلمرة الايثين بالإضافة إلى أن الرابطة باي تنكسر ويتحرر الكتروني هذه الرابطة ويصبح لكل ذرة كربون الكترون حر. ثم ترتبط ذرات الكربون عن طريق الكتروناتها الحرة مع بعضها بروابط تساهمية أحادية مكونة سلاسل طويلة من جزيئات البوليمر .



الأشكال البنائية لبعض البوليمرات شكل (٥-٦)



## ويوضح الجدول التالى بعض مونومرات الألكينات ومشتقاتها الناتجة بالإضافة وأهم استخداماتها.

استخداماته	خواصه	الأسم التجاري	البوليمر	الموتومر
الرقائق والأكياس البلاستيك - الزجاجات البلاستيك - الخراطيم.	ثين ويتحمل المواد الكيمياتية	بولی ایثیلین (PE)		H C=c H
السجاد - المقارش - الشكائر البلاستيك - المعلبات.	قوى وصلب	بولی بروبلین (PP)	H H	Жено Н Н     С=С     CH <sub>3</sub> H
مواسير الصرف الصحى والرى - أحذية - خراطيم مياه - عوازل الأرضيات - جراكن الزيوت المعدنية	لين وقوى	PVC بولی قاینیل کلورید	H H H   -   -   -   -   -   -   -     -     -	کلورو ایٹین کلورید فاینیل H C=C ا H Cl
تبطين أوانى الطهى (التيفال) - خيوط جراحية .	يتحمل الحرارة - غير قابل للالتصاق-عازل للكهرباء وخامل	تظلون	الم	باعی ظورو ایشن F F I I C=C I I F F

#### ۲ - البلمرة بالتكاثف: Condensation Polymerization

وتتم بين مونومرين مختلفين يحدث بينهما عملية تكاثف أى ارتباط مع فقد جزىء بسيط مثل الماء - ويتكون بوليمر مشترك Copolymer ويعتبر هو الوحدة الأولى التى تستمر فيها عملية البلمرة بين جزيئاتها وسنتعرض لدراسة هذا النوع فيما بعد .



# Alkynes الألكاينات - Y (الأستيلينات Acetylenes

هى مجموعة من الهيدروكربونات مفتوحة السلسلة توجد بين ذرات الكربون في السلسلة الكربونية رابطة ثلاثية واحدة على الأقل . وهى تكون سلسلة متجانسة قانونها العام 2-4 روية أي أن كل مركب منها يقل ذرتى هيدروجين عن مثيله من الالكينات وبالتالى أربعة ذرات هيدروجين عن مثيله من الالكانات ، ونجد أن إحدى الروابط الثلاثية من نوع سيجما القوية إما الرابطتين الأخريين همن نوع باى الضعيف لذا فهى مركبات شديدة النشاط .

وأول مركبات هذه المجموعة الايثاين  $C_2H_2$  واسمه الشائع هو الاستيلين والذي سميت هذه المجموعة باسمه .

#### تسمية الألكايئات

١ - تتبع نفس الطريقة السابقة التي استخدمناها في تسمية الالكانات بأن نختار أطول
 سلسلة كربونية متصلة ثم نسمى الالكان المقابل بعد استبدال النهاية ( ان ) بالنهاية ( آين ) .

٢ - ترقم السلسلة من الطرف القريب للرابطة الثلاثية بغض النظر عن موقع أى
 مجموعات متفرعة أخرى .

٢ - يسبق أسم الالكاين رقم ذرة الكربون المتصلة بالرابطة الثلاثية .

وسنتناول بالذكر مثال على الألكاينات (الأستيلين) من حيث تحضيره وخواصه الكيميائية

## تحضير الإيثاين في المعمل:

يحضر بتنقيط الماء على كربيد الكالسيوم ( ثانى كربيد الكالسيوم ) باستخدام جهاز كالمبين بشكل (° - °). يلاحظ أن الغاز قبل جمعه يمرر أولا على محلول كبريتات نحاس في حمض كبريتيك مخفف لازالة غاز الفوسفين و PH وغاز كبريتيد الهيدروجين R<sub>2</sub>S الناتجين من الشوائب الموجودة في كربيد الكالسيوم.



$$C \equiv C_{(a)} + 2H-OH_{(i)} \longrightarrow H-C \equiv C-H_{(g)} + Ca(OH)_{(gg)}$$

٢ - تحضير الإيثاين في الصناعة من الغاز الطبيعي المحتوى على نسبة عالية من غاز
 الميثان بالتسخين لدرجة حرارة أعلى من °C 1400 ثم التبريد السريع للناتج

## خواص الايثاين:

الاحتراق ، يحترق الإيثاين بلهب مدخن في الهواء الجوى تكون كمية الأكسجين
 محدودة وذلك لعدم احتراق الكريون تماما.

$$2C_2H_{2_{(g)}} + 3O_{2_{(g)}} \xrightarrow{\triangle} 2CO_{2_{(g)}} + 2H_2O_{(v)} + 2C_{(s)}$$

أما إذا كانت كمية الأكسجين وفيرة يحترق الايثاين تماماً معطياً ثانى أكسيدُ الكّربون وبخار الماء من خلال تفاعل طارد للحرارة .

$$2C_2H_{2_{(g)}} + 5O_{2_{(g)}} \xrightarrow{\triangle} 4CO_{2_{(g)}} + 2H_2O_{(g)} + Heat$$

أصحبينتي وتبلغ الحرارة المنطلقة من هذا التفاعل حوالي 3000°C ولذا يستخدم ما يعرف بلهب الأكسى استيلين في لحام وقطع المعادن .

ب - تفاعلات الإضافة ، نظراً لأن جزىء الايثاين يحتوى على رابطتين باى بجانب الرابطة سيجما . فإنه يتفاعل بالإضافة على مرحلتين حيث تتحول الرابطة الثلاثية إلى رابطة



SOLON SLASIEM

ثنائية ثم إلى رابطة أحادية وتتضح تفاعلات الإضافة فيما يلي :

## أ - الهدرجة في وجود النيكل المجرأ ،

$$H - C \equiv C - H_{(a)} \xrightarrow{H_2} \overset{H}{\longrightarrow} C = C \xrightarrow{H_2} \overset{H}{\longrightarrow} H \xrightarrow{H_2} C - C \xrightarrow{H_2} H_{(a)} H_{(a)} H_{(a)} \xrightarrow{H_2} H_{(a)} H_{(a$$

ب- الهلجئة ، يتفاعل الايثاين مع الهالوجيئات بشدة وقد يكون التفاعل مصحوباً بلهب وضوء عندما يتفاعل مع الكلور ولكن عندما يمرر غاز الايثاين في محلول البروم المذاب في رابع كلوريد الكربون يزال لون البروم الأحمر ويستخدم هذا التفاعل في الكشف عن عدم التشبع في جزئ الايثاين .

$$C_2H_{3g}^++Br_{2g}^- \longrightarrow C_2H_2Br_{2g}^- \longrightarrow C_2H_2Br_{4g}^ \to C_2H_2Br_{4g}^-$$
 يثانين برومو ليثان 2,2,1,1

## - إشافة الأحماش الهالوجيئية أو هاليدات الهيدروجين: (HX)

الحل:

## 1- إضافة الماء - الهيدرة الحفرية Catalytic Hydration - ا

يتفاعل الايثاين مع الماء بالإضافة وذلك في وجود عوامل حفز مثل حمض الكبريتيك وكبريتات الزئبق (II) عند 60°C لتكوين الاسيتالدهيد (الايثانال).

ويستغل هذا التفاعل في صناعة حمض الايثانويك وذلك بأكسدة الايثانال (الاسيتالدهيد)،
وذلك لأهميته الحياتية وسوف تتعرف عليها في نهاية الباب؛

CH3-CHO (O (Acidified KNinO)) CH3 COOH()

حمض ايثانويك اسيتالدهيد

[الاسيتالدهيد] حمض ايثانول الإيثاني الإيثانال الإيثانال الاسيتالدهيد]

CH3CHO (12 CH3 CH2 OH())

CH3CHO (Reduction) CH3 CH2 OH()

CYCloalkanes المسعة الإلكانات الحلقية (Cycloalkanes)

الهيدروكربونات التى تحتوى جزيئاتها على ثلاثة ذرات كربون فأكثر يمكن أن توجد في شكل حلقى، الصيغة العامة للالكانات الحلقية هي وربي السيغة العامة اللالكانات الحلقية هي وربي نفس الصيغة الجزيئية للالكينات الأليفاتية لذا يجب أن نفرق بينهما عند كتابة صيغتهما الجزيئية و لا تختلف تسمية الالكانات الحلقية عن مثيلاتها غير الحلقية سوى وضع (سيكلو) في المقدمة أو (حلقى) في النهاية لندل على التركيب الحلقى ،


ويلاحظ أن الزوايا بين الروابط في البروبان الحلقي "60 بينما تساوى "90 في البيوتان الحلقي وهي تقل عن الزوايا "109.5 الموجودة في الالكانات غير الحلقية . وتؤدى هذه الزوايا الصغيرة إلى تداخل ضعيف بين الأوربيتالات الذرية وبالتالي يكون الارتباط بين ذرات الكربون ضعيفا في هذه المركبات لذا نجد أنها نشيطة للغاية - فالبروبان الحلقي مثلاً يكون مع الهواء خليطا شديد الاحتراق - بينما البروبان المستقيم السلسلة أقل نشاطاً بكثير أما السيكلو بنتان والسيكلو هكسان فمستقران وثابتان لأن الزوايا بين الروابط تقترب من "9.50 وبالتالي يكون التداخل بين الأوربيتالات قوياً وتتكون روابط سيجما القوية .



## إب - الهيدروكربونات الحلقية غير المشبعة ( المركبات الأروماتية العطرية ) ،

ميز الكيميائيون القدماء بين نوعين من المركبات العضوية - المركبات العضوية المشتقة من الأحماض الدهنية وبها نسبة عالية من الهيدروجين وسميت بالمركبات الاليفاتية (الدهنية) ويعتبر الميثان أول أفرادها أما المركبات العضوية الأخرى المشتقة من بعض الراتنجات وبعض المنتجات الطبيعية ولها روائح عطرية مميزة وبها نسبة أقل من الهيدروجين فسميت بالمركبات الأروماتية (العطرية) ويعتبر البنزين العطرى أول أفرادها . وتوجد المركبات العطرية في شكل حلقة بنزين واحدة أو حلقتين أو أكثر بمشتقاتهم العديدة .

تدريب اكتب الصيغ الجزيئية لهذه المركبات؟



آنثراسين Anthracene



نفثائين Naphthalene



پنزین عطری Benzene

## ملحوظة ، وقود السيارات هو الجازولين الذي يختلف تركيبه نماماً عن البنزين العطرى .

## الصيغة البنائية للبنزين ،

استغرق التعرف على الصيفة البنائية للبنزين سنوات عديدة - نظراً لأنه يتفاعل بالإضافة وبالإحلال وطول الروابط بين ذرات الكربون وسط بين طول الرابطة الأحادية والمزدوجة - وغيرها من الخواص التي حيرت العلماء مدة طويلة إلى أن توصل العالم الألماني كيكولي Kekule عام 1965 إلى الشكل السداسي الحلقي الذي تتبادل فيه الروابط المزدوجة والأحادية.

ويمكن الاكتفاء بالشكل ا

حيث تدل الحلقة داخل الشكل على عدم نقر كز الالكتر ونات الستة عند ذرات كربون معينة.

## تحضير البنزين في الصناعة :

#### ١- من قطران الفحم:

عند إجراء التقطير الاتلافي للفحم الحجرى (تسخينه بمعزل عن الهواء) - يتحلل إلى غازات وسوائل أهمها مادة سوداء ثقيلة تسمى قطران الفحم - ويتبقى فحم الكوك. وعند إجراء عملية التقطير التجزيئي لقطران الفحم نحصل على مركبات عضوية لها أهمية اقتصادية كبيرة. وما يهمنا هو البنزين الذي نحصل عليه عند درجة 2°82 - 80 .

### ٢ - من المشتقات البترولية الأليفاتية ،

نظراً للطلب الكبير على البنزين العطرى باعتبارها مادة أولية هامة في الصناعات الكيميائية - أمكن الحصول عليه من المشتقات البترولية الاليفاتية بإحدى طريقتين :

أ- من الهكسان العادى الهكسان العادى في درجة حرارة مرتفعة على عامل حفز يحتوى على البلاتين - وتسمى هذه الطريقة إعادة التشكيل المحفزة Catalytic reforming

باعرة الإيثان ، إمرار الايثان في أنبوبة من النيكل مسخنة لدرجة الإحمرار .

#### ٢ - من الفيتول :

وذلك بإمرار بخار الفينول على مسحوق الزنك الساخن الذي يختزل الفينول إلى البنزين.

$$O_{(s)}$$
 +  $Zn_{(s)}$  Reduction  $\Delta$   $O_{(s)}$  +  $ZnO_{(s)}$ 



# الكافيية العامة

## تحضير البنزين في المختبر:

يحضر البنزين نقياً في المختبر من التقطير الجاف لملح بنزوات الصوديوم مع الجير الصودي (مثل تفاعل تحضير الميثان في المعمل).

#### تسمية مشتقات البنزين :

١- يسمى مشتق البنزين أحادى الإحلال بذكر أسم الذرة أو المجموعة الداخلة مصحوباً بكلمة
 بنزين وتهاجم الذرة أو المجموعة الداخلة أى ذرة من الذرات الستة المتكافئة في الحلقة .

## شق أو مجموعة الأريل ، (-Aryl radical (Ar

هو الشق الناتج من نزع ذرة هيدروجين من المركب الأروماتي ويرمز له بالرمز (-Ar) فعند نزع ذرة هيدروجين مثلاً من جزىء البنزين يسمى شق الأريل الناتج شق الفينيل . (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>.)Phenyl

$$CH_3$$
  $CH_3$   $CH_3$ 

٢ - إذا كان البنزين ثنائي الإحلال فيوجد في ثلاثة متشابهات هي أرثو Ortho ويرمز لها
 (٥٠) وميتا Meta ويرمز لها (m-) وبارا Para ويرمز لها (p-).

ويعتمدنوع الناتج على طبيعة المجموعة أو النرة التى استبدلت ذرة الهيدروجين الأولى (A) وقد وجد أن هناك مجموعات توجه للموقعين أرثو وبارا ومجموعات أخرى توجه للموقع ميتا. ومن المجموعات التى توجه إلى الأرثو والبارا مجموعة الألكيل (R)، مجموعة الهيدروكسيل (OH)، ومجموعة الأمينو  $(NH_{-})$  وذرة الهالوجين (X).

مثال :

أرثو-كلوروطولوين طولوين

بارا-كلوروطولوين

ومن المجموعات التي توجه للموقع ميتا مجموعة الألدهيد (CHO -)، مجموعة الكيتون (CHO -)، مجموعة الكيتون (-coo+) ، مجموعة الكربوكسيل (COO+) ومجموعة النيترو

مثال :

$$O_2$$
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_2$ 
 $O_3$ 
 $O_4$ 
 $O_4$ 
 $O_4$ 
 $O_5$ 
 $O_5$ 
 $O_6$ 
 $O_7$ 
 $O_8$ 
 $O_8$ 
 $O_8$ 
 $O_9$ 
 $O_9$ 

ميتا-كلورونيتروبنزين نيتروبنزيز



# STORM STORM

٣ - إذا كان البنزين ثلاثى الإحلال قلا يمكن استخدام التعبيرات أرثو وميتا وبارا - بل ترقم ذرات الكربون في الحلقة ونحدد رقم ذرة الكربون المرتبطة بكل مجموعة - ثم ترتب التسمية حسب الحروف الأبجدية باللغة اللاتينية فمثلاً يكتب الببروم قبل الكلور، والكلور قبل النيترو.

4 - برومو - 1 - كلورو - 2 - نيترو بنزين

ويلاحظ أن تسمية الأيوباك تأخذ بالتسمية عن طريق الأرقام فقط،

## الخواص الفيزيائية للبنزين :

البنزين سائل شفاف لايمتزج بالماء له رائحة مميزة يغلى عند 80°C

## الخواص الكيميانية ،

يشتعل البنزين مصحوبا بدخان أسود مما يعنى أنه يحتوى على نسبة كبيرة من الكربون. و يتفاعل البنزين بنوعين من التفاعلات هما الإضافة والإحلال.

# ﴿ أ - تفاعلات الإضافة : >

بالرغم من إحتواء جزئ البنزين على روابط مزدوجة إلا أن تفاعلات الإضافة في البنزين صعبة ولا تحدث إلا تحت ظروف خاصة .

اضافة الهيدروجين (هدرجة) ، يتفاعل البنزين مع الهيدروجين بالضغط والحرارة وهي
 وجود عامل حفاز لينتج الهكسان الحلقي .

$$C_6H_{\theta(\ell)}$$
 +3  $H_2$   $C_8H_{12}$   $C_8H_{12}$   $C_8H_{12}$ 

الهاجنة المنظما البنزين مع الكلور أو البروم في ضوء الشمس ويتكون سداسي هالو
 الهكسان الحلقي . فمع الكلور يتكون المبيد الحشري المعروف بالجامكسان .

بارجانسان
 بارخانسان
 بارخانسان

تعتبر تفاعلات الإحلال هي التفاعلات المهمة للبنزين لأنها تمكننا من الحصول على مركبات لها أهمية اقتصادية كبيرة-ويتم في هذه التفاعلات استبدال ذرة هيدروجين أوأكثر بذرات أو مجموعات أخرى.

#### ١- الهلجنة:

يمكن استبدال ذرة أو أكثر من ذرات هيدروجين حلقة البنزين بدرات هالوجين في وجود عامل حفز مناسب - فيتفاعل البنزين مع الكلور وفي وجود كلوريد الحديد (III) كعامل حفز معطيا الكلوروبنزين.

\* تنتج هاليدات الأريل بكميات كبيرة لاستخدامها كمبيدات حشرية ولعل أكثرها استخداماً هو مبيد (D.D.T) المعروف وهو مركب ثنائى كلورو ثنائى فينيل ثلاثى كلوروإيثان وترجع سميه (D.D.T) إلى أن الجزء ; CH-CCl من الجزىء يدوب فى النسيج الذهنى للحشرة فيقتلها. وقد وصف مركب (DDT) بأنه أقبح مركب كيميائى وذلك لمشاكله البيئية المترتبة على إستخدامه.



### Alkylation | Zaklys - v

#### تفاعل فريدل - كرافت Friedel - Craft

يتفاعل البنزين مع هاليدات الألكيل (RX) فتحل مجموعة الالكيل محل ذرة هيدروجين في حلقة البنزين ويتكون الكيل بنزين - ويتم هذا التفاعل في وجود مادة حفازة مثل كلوريد الألومنيوم اللاماني (anhydrous)

#### ٢- الثيترة :

يتفاعل البنزين مع حمض النيتريك في وجود حمض الكبريتيك المركز - فتحل مجموعة النيترو (-NO) محل ذرة هيدروجين في حلقة البنزين .

$$O_{(\ell)}$$
 + (HO-NO<sub>2</sub>)  $O_{(g)}$   $O_{(g)}$ 

ويلاحظ أن مركبات عديد النيترو العضوية مواد شديدة الإنفجار لأن جزيئاتها تحتوى على وقودها الذاتي وهو الكربون أما الأكسجين فهو المادة المؤكسدة - مثل هذه المركبات تحترق بسرعة وتنتج كمية كبيرة من الحرارة والغازات فيحدث الانفجار ويعلل ذلك بضعف الرابطة N-O لتكون الرابطتين القويتين C-O في ثاني أكسيد الكربون والرابطة N-N في جزئ النيتروجين .

طاقة الربط KJ/mol	الرابطة
201	N - O
358	C - O
941	N - N

ومن مركبات النيترو العضوية المتفجرة التى أنتج منها ملايين الأطنان خلال الحرب العالمية الثانية ومازال إنتاجها مستمراً مادة T.N.T وهى ثلاثى نيترو

الطولوين Trinitrotoluene ويحضر بتفاعل خليط النيترة (حمض النيتريك والكبريتيك المركزين بنسبة ١٠١) مع الطولوين .

#### 1- السلفنة : Sulphonation

هى إدخال مجموعة حمض السلفونيك (SO<sub>3</sub>H) محل ذرة هيدروجين في حلقة البنزين - ويتم ذلك بتفاعل البنزين العطرى مع حمض الكبريتيك المركز فيتكون حمض بنزين السلفونيك.

تقوم صناعة المنظفات الصناعية أساساً على مركبات حمض السلفونيك الأروماتية بعد معالجتها بالصودا الكاوية لنحصل على الملح الصوديومي القابل للذوبان في الماء .


$$R = \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right) - SO_3^-H_{(f)}^+ + NaOH_{(sq)}^- \rightarrow R = \left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right) - SO_3^-Na_{(sq)}^+ + H_2O_{(f)}^-$$

$$(Ither limits of the content of the$$



**EXPLY STABLES** 


ويتضح أن جزىء المنظف يتكون من جزأين (الذيل) وهو عبارة عن السلسلة الهيدروكربونية الطويلة وهى كارهة للماء hydrophobic والجزء الأخر هو الرأس وهو مجموعة متأينة وهى محبة للماء hydrophilic




# كيفية عمل المنظف الصناعي:


لا يصلح الماء في إزالة البقع الدهنية من على الأنسجة، لأنها من المواد العضوية، بينما الماء مذيب قطبي، ولهذا تستخدم المنظفات الصناعية. وفيما يلى نوضح دور المنظف الصناعي في عملية التنظيف.

- ۱ إضافة المنظف الصناعى إلى الماء تقلل من توتره السطحي، وهو ما يزيد من قدرة الماء على تندية (بلل) النسيج المراد تنظيفه. كما فى شكل (۵ - ۸ - أ).
- ۲- ترتب جزيئات المنظف نفسها بحيث يتجه الديل الكاره للماء من كل جزيء ناحية البقعة الدهنية ويلتصق بها، أما الرأس المحب للماء، فإنه يتجه نحو الماء، وبذلك تتغطى البقعة الدهنية بجزيئات المنظف كما في شكل (٥-٨-ب).
- ٣-يؤدى الإحتكاك الميكانيكي أثناء عملية الغسيل
   على طرد القاذورات وتكسيرها إلى كرات صغيرة
   كما في شكل (٥-٨-ج).
- ٤ تنفصل الكرات نتيجة للتنافر الحادث بين رؤوس جزيئات المنظف (متشابهة الشحنة) وتتعلق في الماء على هيئة مستحلب ويتم التخلص منها بعملية الشطف كما في شكل (٥ ٨ د).






(**ب**)



(**ج**)



كيفية عمل المنظفات الصناعية شكل (٥-٨)



# حتقويم الهيدروكربونات≻

اكتب الصيغة البنائية لكل من المركبات التالية، ثم أكتب الإسم الصحيح لكل منها
 تبعاً لنظام الإيوباك

ب - 1,1 - ثنائي ميثيل إيثين

i - 3 - بنتين

د - 2 - إيثيل - 3 - ميثيل بيوتان

ج - 3 - برومو بروبان

## ٢ - أي الصيغ الآتية تمثل الكانات أو الكينات أو الكاينات أو الكانات حلقية ،

$$C_{40}H_{82} - C_4H_{10} - C_6H_{12} - C_5H_{12} - C_3H_8$$

## ٣ - أكتب الصيغ البنائية التالية بطريقة صحيحة ،

$$\begin{array}{c} \operatorname{CH_3} \\ \operatorname{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3} \\ \operatorname{CH_3} \end{array} \quad \overrightarrow{-i}$$

# ٤ - أكتب الصيغ البنائية للمركبات الأتية ،

أ - 3 - ميثيل - ١ - بنتين .

ب- 4 - بروبيل - 2 - هبتين .

4 - میثیل - ۱ - هکسین

۱ - کلورو - 2 - فینیل ایثان .

4 - كلورو - 4 - ميثيل - 2 - بنتين .

#### ٥ - أكتب الصيفة البنائية للهيدروكربونات الأتية ،

أ - هيدروكربون غير حلقى به ست ذرات كربون وأثنان من الروابط المزدوجة -

ب - هيدروكربون غير حلقى به ست ذرات كربون وثلاث روابط ثلاثية .

- هيدروكربون غير حلقى به خمس ذرات كربون ورابطة مزدوجة واحدة .

هیدروکربون حلقی به خمس ذرات کربون وکل الروابط فیه أحادیة.

#### ٦ - أي التفاعلات الأتية يعتبر تفاعل إضافة :

1. 
$$C_4H_{g_{(a)}} + CI_{g_{(a)}} \longrightarrow C_4H_8CI_{g_{(a)}}$$

2. 
$$C_{7}H_{160} - C_{7}H_{80} + 4H_{20}$$

4. 
$$C_3H_{6_{(g)}^+}CI_{2_{(g)}} \longrightarrow C_3H_6^{CI_{2_{(g)}}}$$

٧ ـ يمكن تحضير البنزين من الهكسان العادى بإمراره على عامل حفز في درجة حرارة
 مرتفعة بطريقة تسمى إعادة التشكيل. ماهو الألكان الذي يمكن استخدامه لتحضير الطولوين

$$CH_3$$
 بهذه الطريقة ؟  $\Delta$   $D_{(r)} + 4H_2$  الطولوين



# STORM STORM

#### ٨ - ما عدد مولات الهيدروجين اللازمة للتفاعل مع واحد مول مما يأتي للحصول على

#### مركبات مشبعة

- 1. CH<sub>3</sub>-CH=CH-CH=CH-CH<sub>3</sub>
- 2
- 3. CH=CH<sub>2</sub>

#### ٩ - ما المواد اللازمة لتحضير كل مما يأتي :

#### • ١ - أرسم الصيفة البنائية للمونومرات اللازمة لتحضير البوليمرات الأتية :

## ١١ - أرسم الثلاثة وحدات المتكررة الأولى لبوليمرات الإضافة للمونومرات الأتية :

الايثين - 2,1 - ثنائي كلوروايثين - 2 - مثيل - 1 - بروبين

# ١٢ - اكتب أسماء المركبات الأتية بنظام الأيوباك ،

- CH;-CH;-CH;-CH;-C≡CH -\
- CH<sub>3</sub>—CH<sub>2</sub>—CH—C≡CH -**↑**CH<sub>5</sub>—CH<sub>5</sub>—CH<sub>4</sub>
- CH<sub>3</sub>−C≡C−CH−CH<sub>3</sub> -7

۱۳ - علل ؛

أ - وفرة المركبات العضوية .

ب - الصيغة البنائية أفضل من الصيغة الجزيئية .

ج - الألكانات مركبات مشبعة بينما الألكينات غير مشبعة .

۱۱ - أشرح الخطوات التى تجريها للكشف عن عنصرى الهيدروجين والكربون فى مركب
 عضوى مع كتابة معادلات التفاعل رمزية ومتزنة؟



١٥ - كيف يحضر غاز الميثان في المعمل . أرسم الجهاز المستخدم وأكتب معادلة التفاعل .

١٦ - وضح كيف يحضر غاز الأبثين في المعمل مع رسم الجهاز المستخدم وكتابة معادلة التفاعل.

١٧ - أشرح تأثير غاز الايثين على:

محلول برمنجنات البوتاسيوم (في وسط قلوي)

١ - محلول البروم

١٨ - كيف تحصل على الإيثانال ( الاسيتالدهيد ) من الإيثاين .

١٩ - أشرح تفاعل الايشين مع كل من المركبات الأتية ،
 الهيدروجين - البروم المذاب في رابع كلوريد الكربون - هاليد الهيدروجين

٢٠ - كيف يحضر البنزين من بنزوات الصوديوم 9 أكتب معادلة التفاعل .

٢١ - صف مايحدث في كل من الحالات الآتية موضحاً الظروف اللازم توافرها لإتمام التفاعل.

أ - هدرجة البنزين في وجود عامل حفاز

ب - سلفنة البنزين .

ج - الحصول على الطولوين من البنزين .

#### ٢٢ - أكتب معادلات رمزية تمثل التفاعلات الأتية ،

١ - تفاعل إضافة ٢ - تفاعل بلمرة بالإضافة

٣- تفاعل نزع ٤ - تفاعل هيدرة حفزية

٥ - تفاعل تكسير حفزي حراري ٢ - تفاعل أكسدة

٧ - تفاعل إحلال ٨ - تفاعل فريدل - كرافت

٩ - تقاعل باير ١٠ - تقاعل سلفنة

١١ -تفاعل ثيترة ١٢ - تفاعل هلجنة

١٢ - تفاعل هدرجة ١٤ - تفاعل نزع للماء



# مشتقات الهيدروكربونات

# ﴿مقدمــة ، ﴾

اعتمد تصنيف المركبات العضوية في الماضى على خواصها الفيزيائية مثل الرائحة والطعم وبعض خواصها الكيميائية ومع تقدم طرق التحليل الكيميائي وجد أن الخواص الفيزيائية والكيميائية للمركبات تعزى إلى وجود مجموعات معينة تسمى المجموعات الوظيفية .


# الجموعات الوظيفية أو الفعالة ،

هى عبارة عن ذرة أو مجموعة من الذرات مرتبطة بشكل معين وتكون ركنا من جزئ المركب ولكن فاعليتها ( وظيفتها ) تتغلب على خواص الجزىء بأكمله . وقد صنفت المركبات العضوية إلى مجموعات يختص بكل منها مجموعة وظيفية معينة ويبين الجدول التالى أقسام المركبات العضوية والمجموعة الوظيفية المميزة لكل قسم .


مثال	المجموعة الوظيفية	الصيغة العامة	القسم
CH <sub>3</sub> OH کحول مثالي	الهيدروكسيل OH—	R-ОН	الكحولات
OH Mining	الهيدروكسيل OH-	Ar—OH	الفينو لات
CH <sub>3</sub> – O – CH <sub>3</sub> اثير ثنائي الميثيل	الاغربة -0-	R-O-R	الاثورات
CH <sub>3</sub> – CHO	الفورميل H C=0-	R-CHO	الالدهيدات
0 CH <sub>2</sub> −C−CH <sub>3</sub> اسرتون	لكربونيلc=q	O R-C-R	الكيتونات
CH <sub>3</sub> COOH حمض الاستيك	الكربوكسيل СООН—	R-C-OH	الأحماض الكربوكسيلية
وCH <sub>3</sub> COOC <sub>2</sub> H و استر اسينات الأيثيل	الأستر COOR –	O II R-C-OR	الاسترات
C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub> ایثیل آمین	الأمين <sub>ع</sub> NH <sub>2</sub> الأمين (أميلو)	R-NH <sub>2</sub>	الأمينات

# الكحولات والفينولات

الكحولات والفينولات مركبات عضوية تحتوى جزيئاتها على مجموعة أو أكثر من مجموعات الهيدروكسيل - فإذا اتصلت مجموعة الهيدروكسيل بمجموعة ألكيل (R) سمى المركب كحولاً ، أما إذا اتصلت بمجموعة آريل (Ar) سمى المركب فينولاً .



ويمكن اعتبار الكحولات والفينولات إما مشتقات من الماء باستبدال ذرة هيدروجين بمجموعة الكيل أو أريل - أو مشتقات هيدروكسيلية للهيدروكربونات الأليفاتية أو الأروماتية وذلك باستبدال ذرة هيدروجين أو أكثر بمجموعة هيدروكسيل أو أكثر.



# Alcohols الكحولات

التسمية:

هناك طريقتان لتسمية الكحولات وهي ا

## أ - التسمية تبعاً لمجموعة الألكيل ( التسمية الشائعة ) :

وتسمى فيها الكحولات تبعاً لمجموعة الألكيل تسبقها كلمة كحول مثل كحول ميثيلى C2H3-OH وكحول ايثيلي . C4H3-OH





#### ب- التسمية تبعا لنظام الأيوباك ،

يشتق اسم الكحول من الألكان المقابل ( المحتوى على نفس العدد من ذرات الكربون ) ثم تضاف النهاية ( ول) مثل CH3OH ميثانول ، C2H5OH ايثانول ، ويجب عند التسمية ترقيم السلسلة الكربونية من الطرف القريب لمجموعة الهيدروكسيل .

فمن البنتان يمكن اشتقاق عدة إيزوميرات كحولية مختلفة منها ،

ملحوظة : في التسميات الشائعة اصطلح على أن يطلق اسم أيزو على شق الألكيل إذا كانت ذرة كربون مجموعة الهيدروكسيل متصلة بذرتي كربون.

لشريب


١- اكتب الاسم الشائع والاسم بنظام الأيوباك للكحولات الآتية:

٢- اكتب الصيفة البنائية للكحولات الأتية:

كحول أيزو بنتيلى ، 2,2 - ثنائي ميثيل - ١ - بيوتانول

#### تصنيف الكحولات

### يمكن تصنيف الكحولات بحسب عدد مجموعات الهيدروكسيل في الجزيء إلى أربعة أنواع:



تصنيف الكحولات أحادية الهيدروكسيل إلى ثلاثة أنواع وذلك حسب نوع الكاربينول (ذرة الكربون المتصلة بمجموعة الهيدروكسيل).







# 2010 2000 AND

# الكحولات الأولية أحادية الهيدروكسيل

مثال ، الكحول الايثيلي ( الإيثانول ) C2H5OH

يعتبر الإيثانول أقدم المركبات العضوية التي حضرت صناعياً فقد حضره قدماء المصريين منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام من تخمر المواد السكرية والنشوية .

# طرق تحضير الإيثانول في الصناعة:

## ١ - بالتخمر الكحولي ،

ينتج حوالى %20من الإيثانول على مستوى العالم من عمليات التخمر الكحولى للمواد السكرية والنشوية خاصة في البلدان التي تكثر فيها زراعات قصب السكر والبنجر والذرة وفي مصر يحضر الإيثانول من المولاس. وهو المحلول السكرى المتبقى بعدما يستخلص منه السكر ( وذلك في مصانع شركة السكر والتقطير المصرية - بالحوامدية ) وتجرى عملية التخمر Eymase enzyme بإضافة الخميرة (إنزيم الزيميز) هيتكون الإيثانول وثاني أكسيد الكربون تبعا للخطوات التالية :

$$C_{12}H_{22}O_{11_{(8)}}^{}+H_2O_{(0)}^{}$$
 Hydrolysis  $C_6H_{12}O_{6_{(aq)}}^{}+C_6H_{12}O_{6_{(aq)}}^{}$  نسکروز  $V_6H_{12}O_{6_{(aq)}}^{}+V_6H_{12}O_{6_{(aq)}}^{}+V_6H_{12}O_{6_{(aq)}}^{}$  نسکروز  $V_6H_{12}O_{6_{(aq)}}^{}-V_6H_{12}O_{6_{(aq)}}^{}+V_6H_{12}O_{6_{(aq)}$ 

#### ٢ - هيدرة الإيثين :

وهى الطريقة الشائعة لتحضير الإيثانول. وتجرى في معظم البلدان النفطية - فعند تكسير Cracking المواد البترولية الكبيرة السلسلة ينتج غاز الإيثين - وبإجراء الهيدرة الحفزية باستخدام حمض الكبريتيك أو الفوسفوريك يتكون الإيثانول.

لذا يعتبر الإيثانول من البتروكيماويات ( وهي الكيماويات التي تصنع من البترول )

ملحوظة : الإيثين هو الألكين الوحيد الذي يعطى كحول أولى بالهيدرة الحفزية - أما بقية الألكينات فتعطى كحولات ثانوية أو ثالثية (قاعدة ماركونيكوف) :

$$CH_{3}-CH=CH_{2(c)} + H_{2}O_{(c)} \xrightarrow{H_{2}SO_{4}} - CH_{3}-CH-CH_{3(c)} OH$$

$$OH$$

$$(كمول ثانوي)$$

$$CH_{3} - CH_{3}-CH-CH_{3(c)} + H_{2}O_{(c)} \xrightarrow{H_{3}SO_{4}} - CH_{3}-C-CH_{3}-CH_{3(c)} OH$$

$$CH_{3}-C=CH-CH_{3(c)} + H_{2}O_{(c)} \xrightarrow{H_{3}SO_{4}} - CH_{3}-C-C-CH_{2}-CH_{3(c)} OH$$

$$OH$$

$$(2-a)(1-$$

#### الكحول المحول (Converted alcohol) :

#### أو السبرتو الأحمر Red spirit

تفرض ضريبة إنتاج عالية على الإيثانول النقى الذى تركيزه %90 للحد من تناوله فى المشروبات الكحولية لما لها من اضرار صحية واجتماعية جسيمة. ولكن نظراً للاستخدامات العديدة للايثانول كوقود وفى كثير من الصناعات الكيماوية وكمذيب عضوى يمكن استخدامه بثمن اقتصادى بعد أن تضاف إليه بعض المواد السامة مثل الميثانول (يسبب الجنون والعمى) والبيريدين (رائحته كريهة) وبعض الصبغات لتلوينه. وهذه الإضافات لايمكن فصلها عن الايثانول إلا بعمليات كيميائية معقدة . بجانب أن القانون يعاقب عليها .



# الكالئيكية الكاملة

# الطريقة العامة لتحضير الكحولات:

بتسخين هاليدات الألكيل، التي يتكون شقها الألكيلي من الشق الألكيلي للكحول المطلوب مع المحاليل المائية للقلويات القوية ، فتحل مجموعة الهيدر وكسيل محل شق الهاليد ويتكون الكحول المقابل.

$$RX + KOH_{aq} \xrightarrow{\Delta} R - OH + KX$$
حيث  $R - \hat{m}$  الألكيل  $X - \hat{m}$  الماليد

أمثلة

$$\text{CH}_{\overline{3}}\text{CH}_{\overline{2}}\text{Br}_{(f)}^{+}\text{KOH}_{(aq)} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_{\overline{3}}\text{CH}_{\overline{2}}\text{OH}_{(aq)}^{+}\text{KBr}_{(aq)}$$

بروميد إيثيل

ایئاتول ( کمول أولي )

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \end{array} \xrightarrow{\text{CH}_{3}} \begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \end{array} \xrightarrow{\text{CH}_{3}} \text{OH}_{(\text{aq})} \\ \text{CH}_{3} \end{array}$$

2 - كلورو - 2 - ميثيل بروبان

2 - ميثيل - 2 - برويانول (كحول دالتي)

ملحوظة ، ترتب الهالوجينات حسب سهولة إنتزاعها من هاليد الألكيل كما يلى،

يود> بروم > كلور

أى أن يوديدات الألكيل أسهلها في التحلل.

#### تدريب

ما هو هاليد الألكيل المناسب لتحضير الكحولات الآتية (اكتب معادلة التفاعل): (١) الميثانول. (٢) -بيوتانول. (٣) -ميثيل -2- بنتانول. الجليسرول


#### الخواص العامة للكحولات:


#### الخواص الفيزيانية ،


الكحول درجة الغليان الكحولات مواد متعادلة عديمة اللون - المركبات الأولى C2H5(OH) 78°C منها سوائل خفيفة تمتزج بالماء امتزاجا تاما - أما المركبات إيثانول C2H4(OH)2 المتوسطة فسوائل زيتية القوام - والمركبات العالية مواد 197°C ايثلين جليكول صلبة ذات قوام شمعي ـ C3H5(OH)3 290°C

وتختلف الكحولات (خاصة المركبات الأولى منها) عن

الألكانات في أن الكحولات تذوب في الماء- وبارتفاع درجات غليانها ، ويعزى ذلك لوجود مجموعة الهيدروكسيل القطبية التي لها القدرة على تكوين روابط هيدروجينية بين جزيئات الكحول وبعضها كما في شكل (٥ - ١٠) مما يسبب ارتفاء درجات غليانها، أو تكوين روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء مما يتسبب في ذوبانها في الماء كما في شكل (٥- ٩) . بزيادة عدد مجموعات الهيدروكسيل في جزئ الكحول يزداد ذوبانه في الماء وترتفع درجة غليانه.







شكل (٥ - ٩)

الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الكحول و بعضها.

الكحول وجزينات الماء

ترسب مادة بيضاء صلبة هي ايثوكسيد الصوديوم الذي يمكن تحليله مائيا إلى الايثانول وهيدروكسيد الصوديوم.

$$C_2H_5ONa_0 + H_2O_0 \longrightarrow C_2H_5OH_0 + NaOH_{(sq)}$$

## ب) تكوين الأستر ،

تتفاعل الكحولات مع الأحماض العضوية لتكوين الأسترات وفي هذا التفاعل تنفصل من جزىء الكحول ذرة هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل ومن جزىء الحمض تنفصل مجموعة هيدروكسيل.

وأمكن إثبات ذلك عندما عولج الكحول الإيثيلي المحتوى على نظير الأكسجين الثقيل « (Olb) بحمض الإيثانويك الذي يحتوى على الأكسجين العادى (Olb) فوجد أن أكسجين الماء الثاتج أكسجين عادى .

$$CH_{3}$$
  $CO$   $OH+H$   $OC_{2}H_{5(\ell)}$   $CH_{3(eq)}$   $CH_{3(eq)}$   $CH_{3(eq)}$   $COOC_{2}H_{5}+H_{2}O_{(\ell)}$   $CH_{3(eq)}$   $CH_{3(eq)}$   $CH_{3(eq)}$   $CH_{3(eq)}$   $CH_{3(eq)}$ 

وتفاعل تكوين الأستر تفاعل منعكس لذا يضاف حمض الكبريتيك المركز لمنع التفاعل العكسى وبذلك يستمر تكوين الأستر (وسندرس الاسترات بشيّ من التفصيل لاحقًا).

# (٢- تفاعلات خاصة بمجموعة الهيدروكسيل:

نظرا لاحتواء الكحولات على مجموعة الهيدروكسيل فأنها تتفاعل مع الأحماض الهالوجينية (HX).

فيتفاعل الإيثانول مع حمض الهيدروكلوريك المركز الذى يضاف إليه كلوريد الخارصين كعامل حفر مكونا كلوريد الإيثيل .

$$C_2H_5OH_{(i)} + HCI_{(i)} \xrightarrow{ZnCl_2} C_2H_5CI_{(aq)} + H_2O_{(i)}$$

تدريب ، كيف تحول كلوريد الإيثيل إلى الإيثانول والعكس ؟





# · (-c- oh) (المجموعة الكاربينول -٣)

تتأكسد الكحولات بالعوامل المؤكسدة مثل ثانى كرومات البوتاسيوم أو برمنجنات البوتاسيوم المحمضتين بحمض الكبريتيك المركز وتختلف نواتج الأكسدة تبعا لنوع الكحول.

ويتركز فعل العامل المؤكسد على ذرات الهيدروجين المتصلة بمجموعة الكاربينول ويحولها إلى مجموعتى هيدروكسيل بذرة كربون واحدة يكون المركب الناتج غير ثابت وسرعان ما يفقد جزئ ماء ويتحول إلى مركب ثابت.

# i - أكسدة الكحولات الأولية :

تتأكسد الكحولات الأولية على خطوتين لأن مجموعة الكاربينول تكون متصلة بذرتى هيدروجين فعندما تتأكسد ذرة الهيدروجين الأولى يتكون الألدهيد وعندما تتأكسد ذرة الهيدروجين الثانية أيضا يتكون الحمض - فالإيثانول يتأكسد أولا إلى الأسيتالدهيد ثم إلى حمض الإيثانويك .

تدريب عملى ، ضع في أنبوبة اختبار ml 3 من الإيثانول ثم أضف إليها كمية مماثلة من

$$\begin{array}{c} H \\ CH_3 \overset{!}{C} - OH \overset{!}{H} \end{array} = \begin{bmatrix} OH \\ CH_3 \overset{!}{C} - OH \\ H \end{bmatrix} \xrightarrow{-H_2O} \begin{array}{c} -H_2O \\ -H_3 \overset{!}{C} = O \\ H \end{array} = \begin{bmatrix} CH_3 \overset{!}{C} = O \\ H \end{array} = \begin{bmatrix} OH \\ CH_3 \overset{!}{C} = O \\ H \end{array}$$
 $\begin{array}{c} -H_2O \\ -H_3 \overset{!}{C} = O \\ -H_3 \overset{!}{C} = O \end{array} = \begin{bmatrix} OH \\ -H_2O \end{array}$ 
 $\begin{array}{c} -H_2O \\ -H_3 \overset{!}{C} = O \end{array} = \begin{bmatrix} OH \\ -H_2O \end{array} = \begin{bmatrix} OH \\ -H_2O$ 

وظهور رائحة الخل (حمض الإيثانويك). أما إذا استخدمت برمنجنات البوتاسيوم المحمضة كمادة مؤكسدة تلاحظ زوال لونها البنفسجي.

يستخدم هذا التفاعل للكشف عن تعاطى السانقين للكحولات حيث يسمح لهم بنفخ بالون من خلال أنبوبة بها مادة السليكاجل مشبعة بثانى كرومات البوتاسيوم الحمضة بحمض



الكبريتيك ثم تترك البالونة ليخرج منها زفير السائق فإذا كان السائق مخموراً تغير لون ثانى كرومات البوتاسيوم داخل الأنبوبة من اللون البرتقالي إلى اللون الأخضر.



الكشف عن تعاطى السائقين للكحوليات شكل (٥ - ١١)

## ب- أكسدة الكحولات الثانوية ،

حيث أن مجموعة الكاربينول في الكحولات الثانوية تتصل بذرة هيدروجين واحدة فتتم الأكسدة في خطوة واحدة وذلك بنفس الطريقة السابقة ويتكون الكيتون فمثلا يتأكسد الكحول الأيزوبروبيلي إلى الأسيتون(البروبانون).

$$\begin{array}{c} H \\ CH_{\overline{3}}C-OH_{(\ell)} \\ CH_{\overline{3}} \\ \end{array} = \begin{bmatrix} OH \\ CH_{\overline{3}} \\ C-OH \\ CH_{\overline{3}} \\ \end{bmatrix} \xrightarrow{-H_2O} \begin{array}{c} CH_3 \\ C=Q_{\ell} \\ CH_3 \\ CH_3 \\ \end{array}$$

## ج- أكسدة الكحولات الثالثية ،

حيث أن مجموعة الكاربينول لا تتصل بذرات هيدروجين لذا فهي لا تتأكسد تحت هذه الظروف.

# إن تفاعلات خاصة بجزئ الكحول كله :)

تتفاعل الكحولات مع حمض الكبريتيك المركز ويتوقف ناتج التفاعل على عدد جزيئات الكحول ودرجة الحرارة فعندما تكون الحرارة 180°C ينتزع جزىء ماء من كل جزىء واحد من الكحول.

$$H - C - C - OH \xrightarrow{H_0 SO_4 Cone} H = C + H_2 O_{(v)}$$



#### ملحوظة

إذا كانت الحرارة °140 فإن حمض الكبريتيك المركز ينتزع جزىء ماء من كل جزيئين من الكحول .

$$C_2H_5OH$$
  $H_2SO_4Conc.$   $C_2H_5-O-C_2H_{\S_0}+H_2O_{(v)}$   $C_2H_5OH_{(f)}$   $C_2H_5OH_{(f)}$   $C_2H_5OH_{(f)}$ 

## الأهمية الاقتصادية للكحول الإيثيلي:

- ١- كمذيب للمركبات العضوية مثل الزيوت والدهون وفى الصناعات الكيميائية مثل
   صناعة الأدوية والطلاء والورنيش .
- ٢- يستخدم في محاليل تعقيم الفم والأسنان عن طريق المضمضة كمادة مطهرة وذلك
   لقدرته على قتل الميكروبات .
- ٣- يستخدم الإيثانول في صناعة الروانح العطرية والمشروبات الكحولية ويجب أن ننوه هنا إلى خطورة تناول المشروبات الكحولية لما لها من أضرار فتاكة على صحة الإنسان مثل تليف الكبد وسرطان المعدة والمرىء.
  - ٤- يخلط مع الجازولين ويستخدم كوقود للسيارات في بعض البلدان مثل البرازيل.
- ٥- يدخل في تكوين الكحول المحول (85% إيثانول + 5% ميثانول + 1% إضافات + لون % 9
   ورائحة وماء) الذي يستخدم كوقود منزلي وفي بعض الصناعات الكيميائية .
  - ٦- تملأ به الترمومترات التي تقيس درجات الحرارة المنخفضة حتى ℃50 وذلك
     لانخفاض درجة تجمده ( ℃110.5 ) .

الكحولات ثنائية الهيدروكسيل ا

- ١- يستخدم في مبردات السيارات في المناطق الباردة كمادة مانعة للتجمد.
- ٢- نظرا للزوجته الشديدة يستخدم في سوائل الفرامل الهيدروليكية وأحبار الأقلام
   الجافة وأحبار الطباعة .
- ٣- يحضر منه بوليمر بولى إيثيلين جليكول (PEG) الذى يدخل فى تحضير ألياف
   الداكرون وأفلام التصوير وأشرطة التسجيل .

- ١- يستخدم كمادة مرطبة للجلد في مستحضرات التجميل والكريمات.
  - ٢- يدخل في صناعة النسيج لأنه يكسب الأقمشة المرونة والنعومة .
- ٢ تجرى عليه عملية النيترة بواسطة خليط من حمضى الكبريتيك والنيتريك
   المركزين لتحضير مفرقعات النيتر وجليسرين (ثلاثي نترات الجلسرين).

كما يستخدم النيتر وجليسرين أيضاً لتوسيع الشرايين في علاج الأزمات القلبية .

# المركبات عديدة الهيدروكسيل الم

تعتبر الكربوهيدرات مواد الدهيدية أو كيتونية عديدة الهيدروكسيل أى أنها تحتوى على أكثر من مجموعة كيتون مثال ذلك سكر الجلوكوز أو سكر الفركتوز 66H12O6.





# প্রভারের ক্রিয়ের

# Phenols الفينولات

الفينولات مركبات هيدروكسيلية أروماتية تتصل فيها مجموعة هيدروكسيل أو أكثر مباشرة بذرات كربون حلقة البنزين .

وسنتناول بالدراسة الغينول كمثال لهذه المجموعة.

#### الفينول ( حمض الكربوليك ) С6He-OH

الفينول مركب عضوى له أهمية صناعية كبيرة لاستخدامه كمادة أولية في تحضير كثير من المنتجات مثل البوليمرات والأصباغ والمطهرات ومستحضرات السلسليك (كالأسبرين) وحمض البكريك .

# طرق الحصول على الفينول:

١ - من التقطير التجزيئي لقطران الفحم .

٢ - من المركبات الهالوجينية الأروماتية بتحليلها مائيا وذلك بتسخينها مع هيدروكسيد
 الصوديوم في درجة حرارة مرتفعة 300°C وضغط عال 300 atm .

# الخواص الفيزيائية،

الفينول مادة صلبة كاوية للجلد لها رائحة مميزة - ينصهر عند 43°C شحيح الذوبان في الماء ويزداد ذوبانه في الماء برفع درجة الحرارة حتى يمتزج به نماما عند 65°C.

# الخواص الكيميانية :

#### ١ - حامضية القينول مقارنة بالكحول ١

من المعروف أن الخاصية الحامضية ترجع إلى وجود أيون الهيدروجين الموجب ، ويتبين من الجدول التالى أن كلا من الكحول والفينول يتفاعل مع الفلزات القوية مثل الصوديوم ويخرج الهيدروجين ، ويرجع ذلك إلى قطبية الرابطة (H-O) وتزداد هذه الخاصية في الفينولات والدليل على ذلك أنها تتفاعل مع القلويات مثل الصودا الكاوية لأن حلقة البنزين في الفينولات تزيد من طول الرابطة بين H-O وتضعفها فيسهل إنفصال أيون الهيدروجين لذا يعتبر الفينول حمض ويسمى بحمض الكربوليك.

الفينول ОН—	R-OH الكحول	r.
ONa + H <sub>2</sub>	RONa + H <sub>2</sub>	أ - مع الصوديوم
ONa + H <sub>2</sub> O	لا يتفاعل	ب-مع هيدر وكسيد الصوديوم

# ٢ - تفاعل الفيتول مع الأحماض الهالوجينية مقارنة بالكحول:

تؤثر حلقة البنزين على الرابطة بين ذرة كربون حلقة البنزين في الفينول وذرة أكسجين مجموعة الهيدروكسيل فتقصر هذه الرابطة وتزداد قوة . لذا لا يمكن نزع مجموعة الهيدروكسيل من الفينولات بتفاعلها مع الأحماض وذلك عكس الكحولات .

О)—он	الكعول	
الفينول لا يحدث تفاعل لقوة الرابطة	R-OH + HCℓ RCl + H <sub>0</sub> O	HCl مع
<ul> <li>د پخت ندی نوه ار بعه</li> <li>بین الأکسجین و حلقة البنزین</li> </ul>		



# ٧- نيترة الفيتول ا

يتفاعل الفينول مع حمض النيتريك المركز في وجود حمض الكبريتيك المركز مكونا ثلاثى نيترو الفينول ويسمى تجاريا بحمض البكريك وهو مادة متفجرة - كما يستخدم كمادة مطهرة لعلاج الحروق وهو يصبغ الجلد باللون الأصفر ولا تسهل إزالته ويبقى عدة أيام إلى أن تتجدد طبقة الجلد الخارجية (البشرة).

تعني بهروم حسنن بكريك

يتفاعل الفور مالدهيد مع الفينول وذلك بخلطهما في وسط حمضى أو قاعدى ويكونان . معا بوليمر مشترك Copolymer ثم تجرى عملية بلمرة بالتكاثف ليتكون بوليمر الباكليت .

بوليمرات التكاشف ، هي بوليمرات مشتركة تنتج عادة من ارتباط نوعين من المونمر ويخرج جزىء صغير مثل جزىء الماء .

وتتم أول هذه الخطوات بتفاعل جزىء من الفورمالدهيد مع جزيئين من الفينول ويخرج جزئ ماء - ثم ترتبط جزيئات البوليمر المشترك بالتتابع إلى أن يتكون بوليمر شبكى

والباكليت هو من أنواع البلاستيك الشبكى الذي يتحمل الحرارة وتكمن أهميته في مقاومته للكهرباء فهو عازل جيد يستعمل في عمل الأدوات الكهربائية وطفايات السجائر ولونه بنى قاتم .

# الكشف عن الفيتول ا

- عند إضافة قطرات من محلول كلوريد الحديد (III) إلى محلول الفينول في الماء يتكون
   لون بنفسجي .
  - ٢ عند إضافة ماء البروم إلى محلول الفينول في الماء يتكون راسب أبيض.





# SULTA SURIEM

# تقويم الكحولات والفينولات

#### ١ - أكتب نبذة مختصرة عن كل مما يأتي :

أ - حامضية الكحولات والفينولات ب - الكحول المحول

ج - تفاعل تكوين الأستر د - استخدامات الإيثانول

ه - ثلاثي نترات الجليسرول و - حمض البكريك

#### ٢ - اختر من العمود (ب) ما يتناسب مع العمود (أ):

(ب)	(i)
١ - بيروجالول	١ - كحول ثلاثي الهيدروكسيل
۲ - سورپیتول	۲ - کحول څالثي
٣ - هيئول .	٣ - كحول ثنائي الهيدر وكسيل
ا - حمض بكريك	t - گجول ثانوی
٥ - چليسرول	٥ - ١ - ٤ كالاشي هيدروكسي بنزين
٦- ايزويروبيلي	٦ - حمض الكربوليك
۷ - ایثیلین جلیکول	٧- څلائي نيتروهينول
۸ - 2 مثیل - 2 بروبانول	

#### ٣ - كيف تجرى التجارب التالية موضحاً إجابتك بالمعادلات ،

أ- تكوين اسيتات الإيثيل ب- أكسدة الإيثانول

ج- تحضير ايثوكسيد الصوديوم

١٠ ما تأثير المواد التالية على الإيثانول :

أ- فلز الصوديوم ب- كلوريد الهيدروجين

ج- حمض الكروميك الساخن د- حمض الكبريتيك المركز

٥ - ما تأثير المواد التالية على الفينول :

أ- الصوديوم ب- الصودا الكاوية

ج- حمض النيتريك المركز د- الفور مالدهيد

### ٦ - كيف تجرى التحويلات التالية مبيناً شروط التفاعل :

أ - المنتجات البترولية كبيرة السلسلة إلى إيثانول.

- ب الإيثانول إلى بروميد الإيثيل والعكس .
  - ج الإيثيلين إلى إيثانول والعكس .
  - د كحول إيزوبروبيلي إلى أسيتون .
    - ه الكلوروبنزين إلى فينول.
    - و الفينول إلى بنزين والعكس.

#### ٧ - أكتب الصيغ البنائية للمركبات التالية ثم سمها التسمية الصحيحة :

- ١ ١ بروبانول
- ٢ 2 ميثيل 3 بيوتانول
- ٢ 3 بيوتانول
- ١.١ ١٠٠ ثنائي ميثيل ١٠٠ بيوتانول

## ٨- رتب الكحولات الأتية ترتيبا تصاعديا حسب درجة غليانها - علل اجابتك ؟

الجليسرول - الايثانول - الايثيلين جليكول - السوربيتول

1- СН <sub>7</sub> -СН <sub>7</sub> -ОН	2- CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -OH	3- СН,-СН-ОН СН,
4- СН <sub>2</sub> -СН-ОН СН <sub>3</sub> СН <sub>3</sub>	5- CH <sub>3</sub> -CH-CH <sub>2</sub> -OH CH <sub>3</sub>	сн, сн, с—он сн,

## اختر من الجدول السابق كل الإجابات الصحيحة لكل سؤال مما يأتي :

- ١ الكحولات الثانوية .
- ٢ المركبات التي لا تتأكسد باستخدام العوامل المؤكسدة المعتادة .
  - ٣ المركبات التي تتأكسد إلى كيتونات .
- المركبات التي تعطى إيثرات عند تفاعلها مع حمض الكبريتيك عند ℃140.







الأحماض الكربوكسيلية هي أكثر المواد العضوية حامضية ، إلا أنها ليست أحماضاً قوية مثل الأحماض غير العضوية كأحماض الهيدروكلوريك والكبريتيك والنيتريك وتكون الأحماض الكربوكسيلية مجموعة متجانسة من المركبات العضوية وتتميز بوجود مجموعة أو أكثر من مجموعات الكربوكسيل (COOH-)


وقد تتصل مجموعة الكربوكسيل بمجموعة الكيل لتكون الأحماض الأليفاتية . وإذا اتصلت مجموعة الكربوكسيل بحلقة بنزين مباشرة يتكون حمض أروماتي .

ويطلق على الأحماض الأليفاتية المشبعة أحادية الكربوكسيل - الأحماض الدهنية .

نظراً لأن عدداً كبيراً من هذه الأحماض يوجد في الدهون على هيئة استرات مع الجليسرين .

مجموعة الكربوكسيل المميزة للأحماض العضوية مجموعة مركبة من مجموعتي
الكربونيل (C = 0) والهيدروكسيل (OH)

# أنواع الأحماض الكربوكسيلية:



#### التسمية الشائعة :

تسمى الأحماض الكربوكسيلية عادة بأسمائها الشائعة المشتقة من الأسم اللاتينى أو الإغريقى للمصدر الذى حضرت منه . فمثلاً اشتق أسم حمض الفورميك من أسم النمل الأحمر (Formica) لأن الحمض حضر أول مرة من تقطير النمل المطحون وحمض الأستيك أو الخليك من الخل (Acetum) وحمض البيوتيريك من الزبدة (Butyrum) وحمض البالميتك من زيت النخيل (Palm Oil)

# التسمية تبعا للأيوباك:

بالرغم من أن التسمية الشائعة للأحماض هي الأكثر استخداماً عن بقية جميع المركبات العضوية الأخرى إلا أنه عند تسمية الحمض تبعا للأيوباك يشتق اسم الحمض من الألكان المقابل الذي يحتوى على نفس عدد ذرات الكربون بإضافة المقطع (ويك) إلى نهاية أسم الالكان.



# 2012 LTG

ويوضح الجدول التالى بعض الأحماض الكربوكسيلية وأسمائها الشائعة وأسمائها تبعا لنظام الأيوباك ،

اسم الحمض تبعاً للأيوباك	الألكان المقابل الذي فيه نفس عدد ذرات الكربون	اسم الحمض تبعاً لمصدره	الصيفة
حمض ميثانويك	الميثان	حمض الفورميك النمل (Formica)	нсоон
حمض ايثانويك	الايثان	حمض الأستيك الخل (Acetum)	СН3СООН
حمض بيوتانويك	البيوتان	حمض البيوتيريك الزبدة (Butter)	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> COOH
هكساد يكانويك	هکسا دیکان به ۱۵ ذرة کربون	حمض البالمتيك زيت النخيل (Palm Oil)	C <sub>15</sub> H <sub>31</sub> COOH

وسنأخذ حمض الاستيك كمثال للأحماض الأليفاتية أحادية الكربوكسيل ونتعرف على طرق تحضير حمض الأستيك في الصناعة :

#### ١ - الطريقة الحيوية ،

يحضر حمض الأستيك ( الخل ) في مصر بأكسدة المحاليل الكحولية المخففة بواسطة أكسجين الهواء في وجود البكتريا التي تعرف ببكتريا الخل .

#### ٢ - تحضير و من الاستبلين ١

يحضر حمض الأستيك في الصناعة على نطاق واسع بالهيدرة الحفزية للأستيلين فينتج الأسيتالدهيد الذي يتأكسد بدوره إلى الحمض بسهولة .

$$HC \equiv CH_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \xrightarrow{H_2SO_4(40\%)} CH_3^-C = O_{(\ell)} \xrightarrow{[O]} CH_3^-C = O_{(\ell)}$$
 استيلين

#### الخواص العامة للأحماض الأليفاتية :

# الخواص الفيزيائية ،

تتدرج الخواص الفيزيائية للأحماض العضوية بزيادة الكتلة الذرية . فالأحماض الأربعة الأولى منها سوائل كاوية لها رائحة نفاذة تامة الذوبان في الماء . أما الأعضاء التالية فسوائل زيتية القوام كريهة الرائحة شحيحة الذوبان في الماء ثم بزيادة الكتل الجزيئية نجد أحماضاً صلبة عديمة الرائحة وغير قابلة للذوبان في الماء . وعند مقارنة درجات غليان الأحماض الكربوكسيلية بدرجات غليان الكحولات التي تتساوى معها في عدد ذرات الكربون أوالكتلة الجزيئية نجد أن درجة غليان الأحماض العضوية أعلى، ويعزى هذا إلى أن الرابطة الهيدروجينية في الأحماض تعمل على تجميع الجزيئات في تجمعات ، فيرتبط جزئ الحمض مع جزئ حمض آخر برابطتين هيدروجينيتين .

درجة الغليان	الكتلة الجزيئية	الكحول	درجة الغليان	الكتلة الجزيئية	الحمض
78°C	46	الإيثانول	100°C	46	الفورميك
98°C	60	البروبانول	118°C	60	الأستيك

## الخواص الكيميائية ،

#### ١ - كواص تعزى إلى أيون الهيدار وجين :

#### الخاصية الحامضية :

تظهر الخاصية الحامضية في الأحماض الكربوكسيلية في تفاعلها مع الفلزات (التي تسبق الهيدروجين في السلسة الكهروكيميائية) والأكاسيد والهيدروكسيدات وأملاح الكربونات والبيكربونات لتكوين الأملاح العضوية.





# ٢ - خواس تعزى إلى مجموعة الهيدروكسيل :

تكوين الاسترات:

تتفاعل الأحماض العضوية مع الكحولات لتكوين الأستر والماء .

$$O$$
 $R-C_{+}^{+}OH + H_{+}^{+}OR \xrightarrow{H_{2}SO_{4}} R-C_{-}OR + H_{2}O$ 

#### ٣ - خواص تعزى إلى مجموعة الكربوكسيل -

تختزل الأحماض الكربوكسيلية بواسطة الهيدروجين في وجود عامل حفز مثل كرومات النحاس عند درجة 200°C ، ويمكن تحضير الإيثانول من حمض الأستيك بهذه الطريقة . ويعتبر هذا التفاعل عكس تفاعل أكسدة الكحولات إلى أحماض .

$$CH_{3}^{O}C - OH_{(sq)}^{+} + 2H_{2} \frac{C_{11}C_{12}Q_{4}}{200'c} CH_{3}CH_{2}OH_{(v)}^{+} + H_{2}O_{(v)}^{-}$$

## الكشف عن حمض الأستيك ،

#### ١ - كشف الحامضية ١

عند إضافة الحمض إلى ملح كربونات أو بيكربونات صوديوم يحدث فوران ويتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير .

## ٧ - كشف تكوين الاستر (الأسترة) ،

تتفاعل الأحماض مع الكحولات لتكوين الاسترات الميزة برائحتها الذكية ( روائح الأنواع مختلفة من الزهور أو الفواكه تبعا لنوع الكحول والحمض).

# الأحماض الكربوكسيلية الأروماتية 🗡

الأحماض الأروماتية هي مركبات تحتوى على مجموعة كربوكسيل أو أكثر متصلة مباشرة بحلقة بنزين ويمثل حامض البنزويك الأحماض الأروماتية أحادية الكربوكسيل (أحادية القاعدية) ومن أمثلة الأحماض الثنائية الكربوكسيل ( ثنائية القاعدية ) حامض الفثاليك .

ويمكن تحضير حامض البنزويك بأكسدة الطولوين باستخدام المواد المؤكسدة المناسبة ، فمثلاً يحضر تجارياً بأكسدة الطولوين بالهواء الجوى عند درجة الحرارة 00°C وفي وجود خامس أكسيد الفاناديوم .

والأحماض الأروماتية عامة أقوى قليلاً من الأحماض الأليفاتية وأقل ذوباناً في الماء وأقل تطايراً، وتفاعلات مجموعة الكربوكسيل تشبه تلك الموجودة في الأحماض الأليفاتية ويتمثل ذلك في تكوين أملاح مع الفلزات أو هيدروكسيداتها أو كربوناتها وتكوين استرات مع الكحولات.



MORRAL PR MANIA PR

# (الأحماض العضوية في حياتنا :

#### ١ - حمض الفورميك H-COOH

هو الحمض الذي يفرزه النمل الأحمر دفاعاً عن نفسه ويستخدم في صناعة الصبغات والمبيدات الحشرية والعطور وفي العقاقير والبلاستيك .

#### Y - حمض الاستيك CH3COOH

حمض الاستيك النقى \$100 نفاذ الرائحة يتجمد عند \$16° على هيئة بلورات شفافة تشبه الثلج لذا يسمى حمض الخليك الثلجى ويستخدم حمض الخليك المخفف \$4 على هيئة الخل في المنازل ويعتبر مادة أولية هامة في تحضير الكثير من المركبات العضوية مثل الحرير الصناعي والصبغات والمبيدات الحشرية - والإضافات الغذائية .



وهو شحيح الذوبان في الماء لذا يحول إلى ملحه الصوديومي والبوتاسيومي ليكون قابلاً للذوبان في الماء ويسهل امتصاصه بالجسم . وتستخدم بنزوات الصوديوم 0.1% في معظم الأغذية المحفوظة كمادة حافظة لأنها تمنع نمو الفطريات على هذه الأغذية .

يوجد في الموالح مثل الليمون %5.7 والبرتقال %1 وهو يمنع نمو البكتريا على الأغذية لأنه يقلل من الرقم الهيدروجيني (pH) وله استخدامات صناعية كثيرة ويضاف إلى الفاكهة المجمدة ليحافظ على لونها وطعمها .

يوجد في اللبن نتيجة لفعل الإنزيمات التي تفرزها بعض أنواع البكتريا على سكر



اللبن (اللاكتوز) . كما يتولد في الجسم نتيجة للمجهود الشاق ويسبب تقلصاً في العضلات .

#### ٦ - حمض الاسكوربيك فيتامين جـ (C)

وهو من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بكميات قليلة ويوجد في الحمضيات ( الموالح ) والفواكهة والخضراوات مثل الفلفل الأخضر .

وهو يتحلل بالحرارة وفعل الهواء ويؤدى نقصه إلى تدهور بعض الوظائف الحيوية في الجسم وإلى الاصابة بمرض الاسقرابوط ، والذي من أعراضه نزيف اللثة وتورم المفاصل.

تصنع منه كثير من مستحضرات التجميل الخاصة بالجلد الإعطائه النعومة أو للحماية من أشعة الشمس وفي القضاء على الثأليل الجلدية وحب الشباب، كما يستخدم أيضاً في صناعة الإسبرين.

#### A - الأحماض الأمينية : Amino acids

تعرف الأحماض الأمينية بأنها مشتقات أمينية للأحماض العضوية ، وأبسط أنواع الأحماض 
NH2CH2COOH الأمينيسة هو حمض الجلايسين ويسمى أيضا بحمض الأمينواستيك 
ويتكون نتيجة لإحلال مجموعة أمينو ( NH2 -) محل ذرة هيدروجين من مجموعة الألكيل 
الموجودة في جزىء حمض الأستيك .

والأحماض الأمينية الموجودة في الطبيعة متعددة ولكن يوجد منها عشرون حمضا فقط في البروتينات الطبيعية وتتميز الأحماض الأمينية الموجودة في البروتينات بأنها جميعا من نوع الألفا أمينو أي أن مجموعة الأمينو تكون متصلة بذرة الكربون ألفا (α) وهي التي تلي مجموعة الكربوكسيل مباشرة .

وتعتبر البروتينات بوليمرات للأحماض الأمينية -





# تقويم الأحماض العضوية

### ١- أي من المركبات الأتية يعتبر حمضا كربوكسيليا ؟

## ٢ - أكتب الصبغ البنائية للمواد التي لها الصبغة الكيميائية الأتية ،

- ا حمض أروماتي ثنائي الكربوكسيل . C8H6O4
- $C_7H_6O_3$  حمض أروماتي به مجموعتي كربوكسيل وهيدروكسيل ۲
  - ۲ حمض أليفاتي ثنائي الكربوكسيل 4- حمض
    - 4 أثير اليفاتي C4H10O
  - ٥ ثلاثة كحولات لهم الصيفة الجزيئية كحولات لهم الصيفة الجزيئية

#### ٣ - أكتب الصيغ الكيميائية للأحماض التالية ،

- ١ حمض الفورميك .
- ٢ حمض الاستيك .
- ٣ حمض البنزويك .
- ٤ حمض السلسليك .
- ٥ 2,2 كثاني ميثيل حمض البيوتانويك
- ٦.2 ثنائى كلورو حمض الهكساديكانويك .
  - ٧ 4.2 ثنائي كلورو حمض البنزويك .

#### الباب الخامس: الكيمياء العضوية

#### أكتب الصيفة البنائية للحمض الناتج من أكسدة ما يأتى :

1-CH<sub>3</sub>OH

2- CH7CHO

3- CH<sub>3</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> OH

## ٥ - اكتب أسماء المركبات الآتية ثم وضح كيف تحضر كل منها بطريقةالتعادل ،

1- CH<sub>3</sub>COOK

3- C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>COONa

2- (HCOO)2Ca

4- CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-COONa

- 7

حمض فورمیك حمض ساسلیك	حمض إيثانويك	حمض اكساليك
حمض سلسليك	حمض بيوتريك	حمض بنزويك

## من الجدول السابق أذكر ما يأتي :

- ١ حمض أحادى الكربوكسيل .
- ٢ حمض ثنائي الكربوكسيل .
- ٣ حمض عدد ذرات الكربون فيه تساوى عدد مجموعات الكربوكسيل.
  - ٤ حمض يحتوى على مجموعتين وظيفيتين .





الاسترات هي نواتج إتحاد الأحماض الكربوكسيلية مع الكحولات ، ويمثل ذلك بالمعادلة العامة .

$$R-C-OH+H$$
 OR  $R-C-OR+H_2O$  استر کمول حاسض

وتنتشر الإسترات بكثرة في الطبيعة فهي توجد في كل من المواد النباتية والحيوانية وكثير من الإسترات يتميز برائحة ذكية وهي التي تمد الفواكة والأزهار والزيوت العطرية برائحتها والنكهة الخاصة بها . وقد حضرت إسترات عضوية عديدة لإنتاج العطور والنكهات تجاريا وتستخدم إما بمفردها أو ممزوجة بمركبات طبيعية ، وتقل رائحة الإسترات تدريجيا بارتفاع الكتل الجزيئية للكحولات والأحماض المستخدمة في تكوينها كما تتغير طبيعة الأستر من سائل ذي رائحة ذكية إلى جسم صلب شمعي عديم الرائحة تقريبا ٠٠٠ والشموع التي يمثلها شمع النحل ما هي إلا إسترات ذات كتل جزيئية مرتفعة، والزيوت والدهون هي استرات مشتقة من الجليسرين وهو كحول ثلاثي الهيدروكسيل مع أحماض دهنية عالية .

ويسمى الاستر باسم الشق الحامضى وأسم الألكيل من الكحول ويتضح ذلك من الأمثلة الأتية :

والطريقة المباشرة لتحضير الإستر هي بتفاعل الحامض الكربوكسيلي مع الكحول فمثلاً يتكون أسيتات الإيثيل بتفاعل حامض الأستيك مع كحول الإيثيلي:

ولكن نظراً لأن هذا التفاعل انعكاسي حيث يتحلل الأستر مانياً إلى الحامض والكحول فإنه



يفضل استخدام مادة نازعة للماء مثل حامض الكبريتيك المركز أو غاز كلوريد الهيدروجين الجاف للتخلص من الماء الناتج.

# الخواص الفيزيائية :

الاسترات معظمها سوائل - تقل درجة غليانها كثيراً عن درجات غليان الأحماض أو الكحولات المتساوية معها في الكتلة الجزيئية وذلك لعدم احتوائها على مجموعة الهيدروكسيل القطبية الموجودة في كل من الكحولات والأحماض التي تتسبب في ربط جزيئاتها معا بالروابط الهيدروجيئية.

الاستر	الكحــول	الحمض		الكتلة الجزيئية	
нсоосн <sub>3</sub>	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH	сн <sub>3</sub> соон		60	
31.8°C	97.8°C	118°C	درجة الغليان		
СН <sub>3</sub> СООН <sub>3</sub>	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> OH	C <sub>2</sub> H <sub>E</sub> COOH			
اسیتات میثیل	بيوتانول	بروبيونيك		74	
57°C	118°C	141°C	درجة الغليان		

# الخواص الكيميائية:

التحلل الماني ، ينتج من التحلل الماني للإستر كحول وحامض أو بعبارة أخرى فإن هذا
 التفاعل عكس عملية الأسترة السابقة .

$$R-C-OR + H_2O \longrightarrow R-C-OH + ROH$$

أ - ويمكن إتمام هذا التحلل المائي باستخدام حامض معدني مخفف كعامل مساعد ويسمى
 ( التحلل المائي الحمضي ) .

$$H_3C - C - OC_2H_{\frac{5}{2}(t)} + H_2O_{(t)} - H^{\frac{1}{t}} \rightarrow CH_3COOH_{(sq)} + C_2H_5OH_{(t)}$$



## MENERAL MENORS

ب ـ وكذلك يمكن إجراء التحلل المائى بالتسخين مع قلوى مائى حيث يتكون الكحول وملح الحامض ويسمى (التحلل المائى القاعدى) أو التصبن (حيث أن الصابون هو أملاح الصوديوم لأحماض كربوكسيلية عالية).

$$CH_3COOC_2H_{5(\ell)} + NaOH_{(aq)} \xrightarrow{\Delta} CH_3COONa_{(aq)} + C_2H_5OH_{(\ell)}$$
 $C_6H_5COOC_2H_{5(\ell)} + NaOH_{(aq)} \xrightarrow{\Delta} C_6H_5COONa_{(aq)} + C_2H_5OH_{(\ell)}$ 
 $C_6H_5COOC_2H_{5(\ell)} + NaOH_{(aq)} \xrightarrow{\Delta} C_6H_5COONa_{(aq)} + C_2H_5OH_{(\ell)}$ 

التحلل بالأمونيا ، تتفاعل الأسترات مع الأمونيا لتكون آميد الحامض والكحول (التحلل النشادري):

$$CH_3^{\circ}C - OC_2H_{5(r)} + NH_{3(g)}$$
  $CH_3^{\circ}C - NH_{2(r)} + C_2H_5OH_{(r)}$ 
 $CH_3^{\circ}C - NH_{2(r)} + C_2H_5OH_{(r)}$ 

# الاسترات في حياتنا

#### ١ - الاسترات كمكسيات طعم ورائحة :

تتميز الاسترات بروائح ذكية جعلت منها مواد مهمة في كثير من الصناعات الغذائية كمكسبات طعم ورائحة ويبين الجدول التالي بعض هذه الاسترات الشائعة الاستخدام:



الرائحة	الصيغة الكيميانية	الاستر
الكريز	H-C-O-CH <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub>	فورمات الأيزوبيوتيل
الكمثرى	сн₃–с−о− сн,	اسيتات البروبيل
الشمش	H—C-O— CH <sub>2</sub> —CH <sub>5</sub>	الفور مات البتزيل
الأناناس	CH <sub>3</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -C-O-CH <sub>3</sub>	بيوتاتوات الميثيل
التفاح	н —С—о—ұн,	طورمات البروبيل
اللوز	CH <sub>I</sub> -C-O-ÇH	اسيتات البنتيل

(للإطلاع فقط)

#### ٢ - الاسترات كدهون وزيوت :

الزيوت والدهون عبارة عن استرات ناتجة من تفاعل الجليسرول مع الأحماض العضوية لذا تسمى جزيئاتها بثلاثى الجلسريد triglyceride لأن كل جزىء منها يتكون من تفاعل جزىء واحد من الجليسرين (كحول ثلاثى الهيدروكسيل) مع ثلاثة جزيئات من الأحماض الدهنية التي قد تكون من نوع واحد ولكن غائباً ما تكون مختلفة وقد تكون السلسلة الكربونية لهذه الأحماض طويلة أو قصيرة مشبعة أو غير مشبعة .



MORNEY PE MONTE

ملحوظة : التحلل المائى للدهن أو الزيت (استر ثلاثى الجليسريد) في وجود مادة قلوية قوية مثل NaOH أو KOH تسمى بعملية التصبن وهي الأساس الصناعي لتحضير كل من الجليسرين والصابون .

#### ٣ - الاسترات كبوليمرات (البولي استر):

البولى استرات هي بوليمرات تنتج من عملية تكاثف مشتركة لمونومرين أحداهما لجزئ ثنائي الحامضية والأخر كحول ثنائي الهيدروكسيل .

وأشهر أنواع البولى استرأت المعروفة هو نسيج الداكرون الذى يصنع بأسترة حمض التير فثاليك والاثيلين جليكول.

وتستمر عملية التكاثف كيميانيا بأن يهاجم الكحول طرف الجزىء من ناحية الحمض أو يهاجم الحمض طرف الجزىء من ناحية الكحول وبتكرار عملية التكاثف يتكون جزىء طويل جداً يسمى البولى استر ونظراً لخمول الداكرون تصنع منه أنابيب الاستبدال الشرايين التالفة ، كما تصنع منه صمامات القلب الصناعية .

#### ٤ - الاسترات كعقاقير طبية :

تستخدم الاسترات العضوية في عمل كثير من العقاقير وأشهرها وأبسطها هو الأسبرين وزيت المروخ (الذي يستخدم كدهان موضعي حيث يمتص عن طريق الجلد لتخفيف الألام الروماتيزمية). والحمض العضوى المستخدم فى تحضير هذين العقارين هو حمض السلسليك الذى يحتوى على مجموعتى الكربوكسيل والهيدروكسيل ويمكنه أن يتفاعل كحمض أو كحول (هينول) ويتبين ذلك من التفاعلات التالية :

يعتبر الأسبرين من أهم العقاقير التي تخفف آلام الصداع وتخفض الحرارة - كما يقلل تجلط الدم فيمنع حدوث الأزمات القلبية والمادة الفعالة في الأسبرين هي حمض السلسليك إلا أن إضافة مجموعة الاستيل إليه (-CH3CO) تجعله عديم الطعم تقريباً وتقلل من حموضته .

ويتحلل الأسبرين في الجسم لينتج حمض السلسليك وحمض الأستيك.

وهى أحماضاً تسبب تهيجاً لجدار المعدة وقد تسبب قرحة للمعدة - لذا ينصح الأطباء بتفتيت حبة الأسبرين قبل بلعها أو أخذها مذابة هى الماء . وهناك أنواع من الأسبرين تكون مختلطة بمادة قلوية مثل هيدروكسيد الألومنيوم لتعادل الحموضة الناتجة .



# BULLE MAINS

# حتقويم الأسترات

(1)

الاسبرين	(COO) <sub>2</sub> Ca	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> COOCH <sub>3</sub>
CH <sub>3</sub> COOC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	فيتامين ج	الداكرون

من الجدول السابق حدد ما يلي:

- ١ الاسترات .
- ٢ أحماض كربوكسيلية .
- ٣ الأستر الناتج من تفاعل حمض البنزويك مع الميثانول .
  - ٤ المركبين الايزوميرين .
- ٢ لماذا يقل ذوبان استر معين في الماء عن الحمض المقابل الذي به نفس عدد ذرات الكربون.
  - ٣ أكتب الأسماء الشائعة وبنظام الأيوباك للاسترات الأتية ،

- t

حمض ايثانويك	اسيتات صوديوم	اسيتات ميثيل
فورمات ايثيل	اسيتات بوتاسيوم	فورمات ميثيل



#### من الجدول السابق وضح ما يلي ،

١ - الاسترات .

٢ - أملاح الأحماض الكربوكسيلية .

٣ - المركبات المسماد بنظام الأيوباك .

٤ - المركبات التي توجد بها مشابهة جزيئية .

-0

О СН <sub>3</sub> -С-о-сн <sub>3</sub>	CH <sub>j</sub> -C-O Na <sup>+</sup>	СН <sub>ј</sub> -СН <sub>ј</sub> -СООН
CH3-C-CH3	сн <sub>2</sub> -с−он	CH3-C-O-C3H3

#### من الجدول السابق حدد ما يلي :

١ - المركبات التي تنتج عند تميؤها حمض الايثانويك

٢ - المركبات التي يستخدم حمض الايثانويك في تحضيرها .

٣ - المركبات التي تتفاعل مع محلول الصودا الكاوية .

٤ - المركبات التي تعطى فوران مع بيكربونات الصوديوم .

#### ٦ - ما الأسم الكيميائي لكل مما يأتي ا

١ - الأسبرين . ٢ - الزيوت والدهون .

٢- التطلون . ٢- التطلون .

PVC -1 TNT-0